

元代子部書二

元代史料叢刊編委會 主編

元代史料叢刊續編

泰山書社

元代子部書 二

元代史料叢刊編委會 主編

元代史料叢刊續編

黃山書社

海藏老人此事難知藥目錄

濟生拔粹卷第九

大羌活湯

兩感

九味羌活湯

汗

白虎湯

涼膈散

梔子豉湯

吐

大承氣湯

下

小承氣湯

調胃承氣湯

大柴胡湯

小柴胡湯

和

一物黃連瀉心湯

甘桔湯

四逆散

心悸

正陽散

陰證

廻陽丹

麻黃獨活防風湯

瘧

桂枝川芎防風湯

瘧

桂枝芍藥防已湯

防風當歸散

小柴胡防風湯

附子散

陰瘧

桂心白朮湯

附子防風散

八物白朮散

括萎桂枝湯

桂枝葛根瓜蒌湯

金匱葛根湯

新產血瘕方

神朮湯

加減

加減白朮湯

發黃諸方

茵陳蒿湯

黃

麻黃連翹赤小豆湯

梔子蘗皮湯

犀角地黄湯

畜血

雲歧犀角地黄湯

黃芩芍藥湯

桃仁承氣湯

仲景抵當湯

生地黃丸

四君子湯

霍亂

建中木瓜柴胡湯

四君子芍藥良薑湯

建中附子當歸湯

傷寒辨

表之表麻黃湯

表之裏下劑

裏之表麻黃附子細辛湯

裏之裏下劑

白朮湯

羌活散

石膏湯

芍藥散

柴胡散

黃耆湯

川芎湯

蒼朮石膏湯濕濕

桔梗湯渴

大神朮湯

瘧疾諸方

六經瘧

五藏瘧

小便不利莖中痛

調脉湯陽明少陽

葛根柴胡湯陽明少陽

薄荷湯陽明

防風湯陽明

六物麻黃湯太陽陽明

七物柴胡湯太陽陽明

發表湯太陽

五積散

傷冷病

人參湯

汗後心煩

麥門冬湯

效血

葛根湯

乾嘔

茵陳大黃湯

發黃

麥門冬茯苓飲子

恍惚

犀角湯

怔忡

六神湯

虛羸

茯苓丸

弱

防風湯

痺

阿膠湯

利血

海藏老人此事難知藥目錄

濟生拔粹卷第九

海藏老人此事難知

解利兩感神方太羗活湯

天之邪氣感則害人五藏以是知內外兩感府藏俱病欲表之則有裏欲下之則有表表裏既不能一治故云兩感者不治然所稟有虛實所感有淺深虛而感之深者必死實而感之淺者猶或可治治之而不救者有矣未有不治而獲生者也余嘗用此間有生者十得二三故立此方以待好生之君子用之

羗活

獨活

防已

防風

黃芩

黃連

蒼朮製

白朮

甘草炒

川芎

細辛

各參分

知母

生地黃

各當兩

右咬咀每服秤半兩水二大盞煎至一盞半去滓得清藥一大盞熱飲之不解再服三四解之亦可病愈則止若有餘證

並依仲景隨經法

辨陰陽二證

陰證身靜重語無聲氣難布息目睛不了了鼻中呼不出吸不入往來口與鼻中氣冷水漿不入大小便不禁面上惡寒有如刀刮

陽證身動輕語有聲目睛了了鼻中呼吸出入能往而能來口與鼻中氣皆熱

身表涼知在陰經也名曰陰證身表熱知在陽經也名曰陽證傷風鼻中氣出麝合口不開肺氣通于天也

傷食口無味液不納鼻息氣勻脾氣通于地也

外傷一身盡熱先太陽也從外而之內者先無形也

內傷手足不和兩脇俱熱如火先少陽也從內而之外者先有

形也

內外俱傷

人迎氣口俱盛或舉按皆實大表發熱而惡寒腹不

和而口液此內外俱傷也

凡診則先捫手心背手心熱則內傷手背熱則外傷次以脉別之

太陽證

太陽證頭項痛腰脊強發熱惡寒無汗脉尺寸俱浮而緊是病發於陽陽者衛也麻黃湯主之是陽經衛藥也開湊理使陽氣伸泄此藥爲衛實也

太陽證頭項痛腰脊強發熱惡風自汗脉尺寸俱浮緩者是榮也桂枝湯主之是陰經榮藥也閉衛氣使陰氣不泄此藥爲衛虛則設也

傷寒見風脉傷風見寒脉二證大青龍湯主之易老用桂枝麻黃各半湯后改用九味羌活湯

發熱惡寒自汗脉緩發熱惡風無汗脉緩此二證易老元用桂枝二麻黃一湯后亦改用九味羌活湯無論有汗無汗悉宜服之

易老解利法九味羌活湯

經云有汗不得服麻黃無汗不得服桂枝若差則其變不可勝言故立此法使不犯二陽禁忌解表神方

羌活壹兩半治太陽支節痛君主之藥也然非無為主也却乱反正之主也故大無不通小無不入關節痛非此無不治

防風壹兩半治一身盡痛卒伍卑下之職一聽君命將令而行隨所使所引而至

蒼朮壹兩半別有雄壯上行之氣能除濕下安太陰使邪

氣不內傳之于足太陰脾

細辛

伍分

治足少陰腎苦頭痛

川芎

壹兩

治厥陰頭痛在腦

白芷

壹兩

治陽明頭痛在額

生地黄

壹兩

治少陰心熱在內

黃芩

壹兩

治太陰肺熱在胃

甘草

壹兩

能緩裏急調和諸藥故有國老之稱

已上九味雖爲一方然亦不可執執中無權猶執一也當視其經絡前後左右之不同從其多少大小輕重之不一增損用之其効如神咬咀水煎服若急汗熱服以羹投之若緩汗溫服而不用湯投之也

脉浮而不解者先急後緩

脉沉而不解者先緩後急

九味羌活湯不獨解利治雜病有神中風行經者加附子中風秘澀者加大黃中風并二者合而成痺等證各隨十二經上下內外寒熱溫涼四時六氣加減補瀉用之煉蜜作丸亦可加生地黃各半治兩感傷寒如神用豆淋酒煎治破傷風

太陽證誤汗誤下誤利小便諸變

太陽病下之其脉促不結膏此爲欲解也

脉浮者必結胸

脉緊者必咽痛

脉弦者必兩脇拘急

脉細數者頭痛不止

脉沉緊者必欲嘔

脉沉滑者脅熱痢

脉浮滑者必下血

太陽病反下之因而腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯
太陽病下之太實痛者陽明胃也桂枝加大黃湯

太陽入本熱而渴小便或利或不利宜五苓散此太陽入本
下藥也當服不服必就陽明燥火戊胃發黃故有調胃承
氣證不當服而服小便強利津液重亡是爲犯本而成血
證輕則桃仁承氣湯重則抵當湯

陽明證誤汗誤利小便諸變

陽明證若發汗利小便竭其津液則生畜血證

發汗多畜血上焦爲衄利小便多畜血下焦爲發狂

身熱目痛鼻乾惡執自汗脉尺寸浮長**白虎湯**主之

石膏

肆分辛寒入肺

知母

壹分半苦寒入腎

甘草

壹分炙

粳米

壹合半二味之甘居中挽二藥上下不相離同煎煩熱

右麤散五錢匕水一盞半煎至八分米熟爲度主滓溫服

自汗大出身表如冰脉疾而細小及瘧疾但寒不熱者**白虎加**

桂湯主之

石膏

肆兩

知母

叁兩

甘草

壹兩

粳米

貳合

官桂

壹兩半

右鹿末同前煎服

如中暑自汗微惡寒者亦宜服之

老幼虛人傷寒五六日昏胃譫語小便或淋或澀或煩而不得眠白虎加梔子湯主之 白虎湯內加梔子一錢半 煎服

同前

辛苦之人動而傷暑身熱脉洪大火勝傷氣也白虎加人參湯

主之

大渴者

依前白虎湯內加人參一錢半

煎服同前

安閑之人靜而傷暑惡寒脉沉疾不渴濕勝傷形也白虎加蒼

朮湯主之依前白虎湯內加蒼朮一錢半

煎服同前

涼膈散

治上焦熱甚陽明少陽氣中之血藥也

山梔子仁

壹兩

連翹

黃芩

薄荷

各壹兩半

大黃

半兩

芒硝

半兩

去六經中熱減大黃硝加桔梗甘草

各半兩一法加防風

右爲麤末每服一兩水二盞同竹葉七片煎至一盞去滓入

蜜少許食後服 加生姜煎亦得

治肺金邪熱咳嗽有痰者加半夏

涼膈與四物湯各半服能益血泄熱名雙和散

錢氏去連翹加藿香石膏爲瀉黃散

梔子豉湯

煩者氣也燥者血也氣主肺血主腎煩燥者懊懣不

得眠也

肥梔子

拾个擘碎以治肺煩

香豉

肆合以治腎燥

分作二服每服五錢水二盞煎至八分去滓溫服得快吐止

後服

如少氣虛滿者加甘草一兩

如嘔噦者加生姜橘皮

如下後腹滿而煩梔子厚朴枳實湯

如下後身熱微煩梔子甘草乾姜湯

如有宿食而煩梔子大黃湯

陽明發瘧有三

下之早而發

失下而發

胃熱胃爛而發

大抵戊助少陰心火入于手太陰肺也

陽證陰證皆有瘧論在略列內元戎內附

白虎湯

瀉心湯

調胃承氣湯選而用之

太陽陽明大承氣湯

少陽陽明小承氣湯

正陽陽明調胃

承氣湯

大承氣湯

治大實大滿大滯則胃腹脹滿狀若合瓦大實則不

大便也痞滿燥實四證備則用之雜病則進退用之

大黃酒浸去皮半兩治不大便地道不通酒上行引大黃

至顛而下

厚朴姜製壹兩治腹脇腹脹滿

枳實麩炒伍分治心下痞按之良久氣散痛緩此并主心

下滿乃肝之氣盛也

芒硝半兩治腹中轉而失氣內有燥屎味辛寒燥以潤之

芒硝味辛以潤腎燥今人不用辛字只用鹹字鹹能

軟堅

右剉如麻豆大以水二大盞先煮厚朴枳實至一大盞下大黃煮至六分去滓內硝煎一二沸溫服利止後服

小承氣湯痞實滿可服腹中無轉失氣

大黃半兩或壹兩不用酒浸厚朴製伍分枳實參分炒