

元代子部書 三

元代史料叢刊編委會 主編

元代史料叢刊續編

泰山書社

元代子部書 三

元代史料叢刊編委會 主編

元代史料叢刊續編

泰山書社

活法機要藥目錄 濟生拔粹卷第十七

六 泄瀉門

黃芩芍藥湯

大黃湯

芍藥湯

白朮黃耆湯

防風芍藥湯

白朮芍藥湯

蒼朮芍藥湯

呵子散

漿水散

黃連湯

芍藥黃連湯

導氣湯

加減平胃散

地榆芍藥湯

六 厲風證

樺皮散

二聖散

六 破傷風證

羌活防風湯

白朮防風湯

芎黃湯

大芎黃湯

羌活湯

防風湯

蜈蚣散

左龍丸

羌活湯

養血當歸地黃湯

頭風證

消風散

泄青丸

雷頭風證

升麻湯

胎產證

黃龍湯

二黃散

半夏湯

增損柴胡湯

秦朮湯

荊芥散

防風湯

三分散

血風湯

血運血結四物湯

沒藥散

加減四物湯

四物湯

紅花散崩

當歸散

惡物不下

生地黃散

吐血

麥門冬飲子

衄血

帶下證

苦練丸

衛生湯

大頭風證

黃芩黃連甘草湯

黑白散

瘧證

桂枝羌活湯

麻黃羌活湯

麻黃桂枝湯

桂枝黃芩湯

熱證

地黃丸

防風當歸飲子

金花丸

涼膈散

當歸承氣湯

牛黃膏熱入血室

白虎湯

眼證

散熱飲子

地黃湯

四物龍膽湯

點眼藥

洗眼藥

嚙藥

消渴證

黃連膏

八味丸

腫脹證

水腫方

瘡瘍證

內疎黃連湯

內托復煎散

當歸黃耆湯

內消升麻湯

復元通氣散

五香湯

赤芍藥散

桃紅散

冰霜散

火燒

乳香散

杖瘡

五黃散

杖瘡

花藥石散

截疳散

生肌散

平肌散

碧霞挺子

卷之十九

二

用藥加減例

迴瘡金銀花散

雄黃散

瘰癧證

桑椹膏

連翹湯

嬰麥飲子

咳嗽證

利膈丸

欬氣丸

虛損證

四君子湯

和血八物湯

十全散

牛膝丸

黑地黃丸

八味丸

地黃丸

吐證

桔梗湯

木香散

厚朴丸

心痛證

金鈴子散

煮黃丸

厚朴丸

藁本湯

木附湯

痢證

酒煮當歸丸

苦練丸

活法機要藥目錄

濟生拔粹卷第十七

活法機要

東垣

與察古家珍及劉守真病機保命大同而小異

泄痢證

臟腑泄痢其證多種大抵從風濕熱也是知寒少熱多故曰暴泄非陰久泄非陽溲而便膿血知氣行而血止也宜大黃湯下之是爲重劑黃芩芍藥是爲輕劑治法宜補宜泄宜止宜止和則芍藥湯止則呵子湯有暴下無聲身冷自汗小便清利大便不禁氣難喘息脉微嘔吐急以重藥溫之漿水散是也後重則宜下腹痛則宜和身重者除濕脉弦者去風膿血稠粘以重藥竭之身冷自汗以毒藥溫之風邪內縮宜汗之驚澹爲痢當溫之在表者發之在裏者下之在上者湧之在下者竭之身表熱者內疎之小便澀者分利之盛者和之去者送之過者止之除濕則白朮茯苓安脾則芍藥桂破血則

黃連當歸宣通其氣則檳榔木香如泄痢而嘔上焦則生姜橘皮中焦則芍藥當歸桂茯苓下焦則治以輕熱甚以重熱藥若四肢懶倦小便少或不利大便走沉困飲食減宜調胃去濕白朮茯苓為藥二味水煎服如發熱惡寒腹不痛加黃芩為主如未見膿而惡寒乃太陰欲傳少陰也加黃連為主桂枝佐之如腹痛甚者加當歸倍芍藥如見血加黃連為主桂當歸佐之如煩燥或先便白膿後血或發熱或惡寒非黃連不止上部血也如惡寒脈沉或白腰痛或血臍下痛非黃芩不能止此中部血也如惡寒脈沉先血後便非地榆不能止下部血也唯脈浮大者不可下

黃芩為藥湯

方在寶鑑泄痢條下

大黃湯

治泄痢久不愈膿血稠粘裏急後重日夜無度久不愈

者

大黃 一兩

右剉細好酒二大盞同浸半日許煎至一盞半去大黃不用將酒分二服頓服之如未止再服以利爲度復服芍藥湯和之痢止再服黃芩芍藥湯和之以徹其毒也

芍藥湯

方在寶鑑內痢疾條下

白朮黃耆湯

服前藥痢疾雖除更宜此和之

白朮

一兩

黃耆

比參分

甘草

參分

一方無黃耆用黃芩半兩

右咬咀均作三服水煎服清

防風芍藥湯

治泄痢飧泄身熱脉弦腹痛而渴及頭痛微汗

防風

芍藥

黃芩

已上各壹兩

右咬咀每服半兩或一兩水煎

白朮芍藥湯

治太陰脾經受濕水泄注下体重微滿困弱無力

不欲飲食暴洩無數水穀不化宜此和之

白朮

芍藥

甘草

右剉每服一兩水煎

蒼朮芍藥湯

治痢疾痛甚者

蒼朮

二兩

芍藥

一兩

黃芩

桂枝

右剉每服一兩水煎

呵子散

如腹痛漸已泄下微少宜止之

呵子皮

一兩生熟各半

木香

半兩

黃連

三分

炙甘草

各三分

右爲細末每服二錢以白朮芍藥湯調下如止之不已宜歸

而送之也

呵子散內加厚朴一兩竭其邪氣也

漿水散

治暴泄如水周身汗出身上盡冷脉微而弱氣少不能

語甚者加吐此謂急病

半夏

貳兩

附子

半兩

乾生薑

炙甘草 桂 各伍分

良姜

貳分半

右爲細末每服三五錢漿水一盞煎至半和滓熱服

黃連湯

治大便後下血腹中不痛者謂之濕毒下血

黃連

當歸

各半兩

炙甘草

貳分半

右咬咀每服五錢水煎

芍藥黃連湯

治大便後下血腹中痛者謂之熱毒下血

芍藥

黃連

當歸

各半兩

大黃

壹分

淡味桂 半兩

炙甘草

貳分

右咬咀每服五錢水煎如痛甚者調木香檳榔末一錢服之

導氣湯

治下痢膿血裏急後重日夜無度

芍藥

壹兩

當歸

伍分

大黃

貳分

黃連

壹分

黃芩 貳分半

木香

檳榔各壹分

右爲末每服五錢水煎

加減平胃散

方在室鑑內泄痢條下

地榆芍藥湯

治泄痢膿血乃至脫肛

蒼朮

捌兩

地榆

貳兩

卷柏

參兩

芍藥

參兩

右咬咀每服一兩水煎病退止

五泄之病胃小腸大瘕三證皆以清涼飲子主之其泄自止厥陰證加甘草以緩之少陰證裏急後重故加大黃又有太陰陽明二證當進退大承氣湯主之太陰證不能食也當先補而後泄之乃進藥法也先前厚朴半兩製水煎二三服後未已謂有宿食不消又加枳實二錢同煎二三服泄又未已如稍進食尚有熱毒又加大黃二錢推過泄止住藥如泄未止

爲腸胃有久塵垢滑粘加芒硝半合宿垢去盡則愈也陽明證能食是也當先泄而後補謂退藥法也先用大承氣湯五錢水煎服如利過泄未止去芒硝後稍熱退減大黃一半再煎兩服如熱氣雖已其人必腹滿又減去大黃去枳實厚朴湯又煎二兩服如腹滿退泄亦自愈後服厚朴湯數服則已

癰風證

癰風者榮氣熱附其氣不清鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰風寒客於脉而不去故名癰風又曰脉風俗曰癰治法刺肌肉百日汗出百日凡二百日鬚眉生而止先搗皮散從少至多服五七日灸承漿穴七壯灸瘡愈再灸再愈三灸之後服二聖散泄熱祛血之風邪戒房室二年病愈

拜皮散

治肺臟風毒遍身瘡疥及癰疹瘙癢成瘡面上風刺粉

刺

樺皮

肆兩

荊芥穗

貳兩

杏仁

貳兩

去水壹半

已來

放

令乾

用

炙甘草

半兩

枳殼

肆兩

去穢

用炭火燒

欲灰於濕席上令乾

右件除杏仁外餘藥爲末將杏子另研與諸藥和勻磁合內放之每服三錢食後溫水調下

聖散

治大風癘疾將皂角刺一二斤燒灰研細煎大黃半兩

調下一錢早服樺皮散中煎升麻湯下瀉青丸晚服二聖散

此數等之藥皆爲緩疎泄血中之風熱也

七聖丸七宣丸皆治風壅邪熱潤利大腸中風風癘癘風大

便秘澁皆可服之

破傷風證

夫風者百病之始也清淨則湊理閉拒雖有大風奇毒弗能爲