

外科濟世經驗心法奇方

二

外科濟世經驗心法奇方

二

白龍骨

白蘇

乳香

沒藥

右為末。搽之。

洗。癰疽法。

腫時用紫葛。天蕎麥。悉冬藤。金絲草。冬苣荬。煎湯洗漬。右白芷。甘草。羌活。黃芩。露蜂房。赤芍藥。當歸。先將猪前蹄一隻。煮汁去油。花取清汁煎藥。去渣。澀洗。以絹拭之。

凡灸法。一切癰疽。始發。即以艾灸之。其法男左女右。以篾一根。前齋中指端。移至手腕橫紋。四寸。截斷為准。却以竹一根。兩頭開起。令病人騎之。兩足不着地。挺身正坐。將前篾植於竹上。以正頭。植脊骨中。盡處各開一寸。名騎竹馬法。灸七壯。灸畢。宜服乳香。菴菴粉。托裡散。所以防火氣之入心。其方用真菴豆。粉。與乳

香為末。冷水調下。

治騎馬癰

大粉草帶節四兩。長流水一碗。以甘草碎水盡焙為末。入皂莢灰少許。作四服湯調。頓服效。

治附骨疽

熱在血分之極。初覺先以青皮甘草節服之。次破當養血。以人參黃連茯苓各二錢。瓜蒌子四十八粒。作二貼。入竹瀝熱飲之。

三生散 治漫腫光色附骨疽如神

露蜂房 頭髮燒存性 蛇蛻等分

右為末。每服三錢。酒調下。

可久疽

取烏青雞卵。以上等雌黃。實之。鹽泥固濟。火煨通紅。取出。上出火毒。去泥。用骨研細。飯丸如粟大。以紙捲送入孔中。藏而更用膏貼。或治痔漏亦妙。

乳癰結核

於初起時。便須忍痛。搓令稍軟。吮令汗透。自可消散。失此不治。必成癰癤。以艾灸兩三壯于腫處。其效尤捷。不可服用針刀。

治乳癰未潰散

甘草節 瓜蒌仁 金銀花 當歸 沒藥 青皮

皂角刺 青橘葉

右咀片。水一鍾。酒半鍾。同煎一鍾。空心服。已潰。用參芪等歸白芍。青皮。瓜蒌。甘草節煎服。

治乳癰化熱毒消惡腫結核有奇功。

用蒲公英。金銀花煎以少酒佐之。服後即欲睡。是其功也。及覺而病安矣。

凡乳癰發痛者生於心。一俗呼吹奶是也。吹者風也。風熱結房之間。血脈凝注。久而不聚。潰腐為膿。

宜用益元散。生姜湯調下。冷服。或新汲水時時呷之。勿輒素夜。可三五十吹自解矣。或煎解毒湯頓服之。

治婦人乳岩久不愈者。癰起門積。遂成隱核。不痛不痒。年久方陷。下名曰乳岩。此極難愈。

用華皮油。胡椒燒灰存性。入枯礬。輕粉。少許。香油塗敷。

子星

貝母

連翹

甘草節

水蓼仁

右各一兩水煎入酒服

治乳癰痛

艾葉一錢 甘艸三錢 當歸三錢

右水煎入酒少許熱服

祝由科

治乳癰呪法

呪曰 謹請東方護司族吹妳是灰妳子

右用之時當先問病人曰甚病。人答曰吹妳取此氣一口。但吹在兩手坎字文上。用大柵指緊捏定面北立。一氣念七遍。吹在北方如此者三遍。若作法時以左右二婦人面病人立於病乳上痛處一二百數如此亦三次則愈

肺癰咳唾膿血其脈數實或口中咳胸中隱痛脈反覺滑者為肺癰先以小青龍湯一貼解表之邪氣然後以葶藶大棗瀉肺湯葶藶湯隨症用之以取膿此治腫瘍之例也小青龍湯凡肺癰已破入風者不治或用太乙膏丸服以搜風湯吐之治吐膿血如肺癰狀口臭他方不應者宜消風散米湯飲下兩服

除根

葶藶大棗瀉肺湯 治肺喘不得卧

右以水三盞入棗煎至一盞去棗入葶藶又煎服

葶藶湯 治咳而微熱心煩胸中錯雜

桃仁

五十箇 去皮

薏苡仁

蘆葦葉

二斤 切

水

各半

右水煎服

黃芪湯

合歡樹皮一掌大。以水三鍾。煎至一半。作二服。

腸癰大腸有痰積。死血流注。作濕熱。積治近肛門。破入風者難治。千金方。謂其病小腹重強。按則痛。小便似淋。時汗出。復惡寒。身皮甲錯。腹皮急如腫。脈數者。微有膿也。或云洪數已有膿。脈若遲緊者。未有膿。甚者腹脹大。轉側有水聲。或繞臍生瘡。或膿自臍出。或大便膿血。此其証也。又云。脈遲緊則為瘰癧。血下則安。治法。桃仁承氣湯。加連翹。秦艽。入風者加防風。

蠟礬丸 治腸癰最效

灸法。曲兩肘。正肘頭。骨灸百壯。下膿而安。

囊癰者。濕熱下注也。仲膿者。膿盡自安。不藥可也。太乙膏可貼。

之

腎癰腎瘻。小腹之後在下。此陰中之陰也。道遠位僻。雖曰多血。然氣運不到。血亦罕來。中年後尤慮此。纔有腫痛。參之脈證。但見虛弱。便與滋補血氣。可保終吉。凡癰先發為腫。氣血鬱積。蒸肉為膿。故其痛多者。瘡之時也。膿潰之後。腫退肌寬。必漸減而反痛者。此為虛。宜用亦有穢氣所觸。宜和解如風寒逼者。宜溫散。

治便毒已結成膿

天黃

連翹

各半

枳實

二錢

厚朴

甘草

各二錢

桃仁

二十粒

右加姜三片。分三服煎服。

消毒散 治便毒初發三四日可消

皂角刺 金銀花 甘草節 赤姜仁 防風 當歸

大黃 各等分

右以咀水酒各半煎食前溫服仍頻提掣頂中髮立效藥方。

治諸腫毒惡瘡

犬下頰骨 燒灰 生莞豆 一兩 白蔹 一兩

右為細末用白調糊用雞翎掃患處待乾再掃數十遍待乾再掃立效如瘡破者無鮮者用椿白皮煎湯洗淨拭乾將赤石脂并石青磁為末各一兩散上瘡患處所則上有效。

神仙太乙膏

治癰疽及一切瘡毒不問年月深淺已未成膿者並治之如發

背先以溫水洗淨。軟帛拭乾。用排帛攤貼之。更用冷水送下。血氣不通。溫酒下。赤白帶。當歸酒下。咳嗽及喉閉。纏喉風。並用新綿裹置口中。含化。下一切風赤眼。捏作小餅貼太陽穴。更以山梔子湯下。打撲傷損。外貼。內服。橘皮湯下。腰膝痛者。患處貼之。鹽湯下。唾血者。桑白皮湯下。以蛤粉為衣。其膏可收。十餘年不壞。愈久愈烈。又治瘰癧。瘰癧並用鹽湯洗貼。酒下一丸。婦人經脈不通。單湯下。一切疥癩。用麻油煎。取出少許。和膏塗之。虎犬蛇蝎。湯刀斧傷者。皆可用。內服外貼。

白芷

當歸

玄參

赤芍藥

肉桂

大黃

生地黄

各一兩

右為粗片。用麻油二斤。入銅鍋內煎至黑。濾去渣。入黃丹十二

西。可煎滴水。檢軟硬得中。即成膏矣。

製丹法。黃丹先炒紫色。傾入缸內。用滾水一桶泡之。再汲涼水。滿缸。用棒常攪。浸一宿。去水再炒。如前二次方研務極細。可用陶器庵曰。予常用治瘡毒。并內癰。有奇效。忽一婦。月經不行。腹結塊作痛。貼之。經行。痛止。後隨前云。治證用之。無有不效。愈知此方之妙也。楊梅瘡毒潰爛者尤效。

麒麟竭膏

此方原高麗傳來神效無比

木鱉子

知母

當歸

五倍子

細辛

白芷

各已上

兩俱切咀
同作一處

血竭

三錢

槐條

柳條

各二七條長一寸
許同煎併一處

輕粉

滴乳香

沒藥

各半

雄黃

四錢

當門子

二錢

血竭

等六味各

向末和
作一處

瀝青

為末二兩已上
二味併一處

松香

淨末
十兩

一方用山茨菰紅芽大戟十金子各半兩

右用真香油三兩半。同前八味入鍋。以文武火煎。不在手用棍
條二莖。攪令焦色。即用綿濾出渣。再將油入鍋。先下松香。濕青
末。不住手攪。如沸溢。即取下火。攪之。再上火。約一茶傾。滴水成
珠。不軟不硬。即取下火。將次六味徐徐而下。速速攪令極勻。凝
則再上火。勿令再沸。傾出水盆中。半日後。以手搏之。漸至柔和。
揉止。番覆如金絲之狀。再入水煎之。如前揉扯。春夏頻換水。暑
急用。亦浸一兩晝。多浸愈妙。治一切癰瘡。五發毒瘡。生者貼之。
即散。熟者即穿。逐敗生肌。首尾皆可。一切疔腫結核。並貼患處。
其膿瘡。先用藥汁白礬入湯。用鷄翎洗淨。以牛旁子葉。或金剛
藤葉。先貼瘡半日。取盡惡水。然後貼此膏。刻日安痊。一切腎股

黃濕痒痛等瘡。並洗淨梔乾貼患處。一切打撲傷損。雖肺氣喘
等病。俱貼患處。頭疼貼太陽。赤眼貼眼胞。魚尾際暴傷風冷嗽
貼脊心。牙疼刮藥塞牙縫。面腫者再貼面。小兒疳痢疔疾。用手
丸如菴豆大。米飲三二十丸。一切風寒溫痺。臂腿痛。俱貼患處。
無不有效。

大黑虎膏 治癰疽發背。橫跌損傷。折骨疔瘡。並皆治之。

白芷 大黃 黃連 白蘇 白芨 黃芩

黃栢 羌活 木鱉子 金毛狗脊 杏仁

當歸 芍藥 川芎 肉蓯蓉 生薑 前胡

肉桂 柴胡 荆芥穗 黃芪 連翹 防風

草麻子 各一兩 乳香 沒藥 血竭 各一兩 樟腦

血餘面四香油斤三飛丹斤一麝香半柳槐枝各二

右乳香沒藥血竭樟腦麝香研細末。飛丹另炒。研細聽用。餘藥剉碎。并槐柳枝入油熬煎黑色。以括為度。住火瀝渣。入飛丹用文武火熬。以槐柳枝不住手攪之。黑色滴水。和軟。不斷不黏。住火入乳香沒藥血竭三味。次入樟腦麝香二味。攪勻。於磁器收貯攤貼。

呼膿長肉膏 專治癰疽發背疔瘡等毒。已破出膿者。用油紙攤貼。如膿多用絹楷淨。將此膏於火邊略烘。再貼。第三次不用。另換一箇再貼。待瘡勢將收口。量瘡大小貼之。

麻油三斤用純柳槐枝髮一團入油熬黃柏

大黃 黃芩 白芷 杏仁 防風 荆芥

羌活

獨活

連翹

山梔

各一兩

當歸

黃芪

黃連

各一兩半

赤芍藥

地黃

白朮

青藤

金銀花

各八錢

煎法。通以前藥入油內。用文武火煎熬。待諸藥紫黑色為度。在

火爐去粗其油存鍋內。用黃丹八兩。先用水淘過炒熟。黃蠟五

兩。煙青二兩。同煎。至油滾漸干。和之。滴入水中。看軟硬。得所不

粘手為度。方加乳香沒藥輕粉血竭。冬春宜軟。秋夏宜硬。

雲母膏 治一切瘡腫折傷等病

蜀椒

開口者去目炒

白芷

沒藥

赤芍藥

肉桂

當歸

鹽花

麒麟竭

葛蒲

黃芪

白朮

芎藭

龍胆

草胆草

木香

白蘇

防風

外科