

錦方實驗錄

江西省中醫藥研究所編

江西人民出版社

錦方實驗錄

江西省中醫藥研究所編

江西人民出版社

內 容 提 要

我省在党的中医政策光輝照耀下，开展了羣众性采風献宝运动，共收集了几十万个中医秘方，有的是祖傳的、秘傳的，有的是經献方人在临床上屢試屢驗的。本書就是精选整理了其中附有治驗的255方，按科別、病种汇编成書，以供临床参考用。

錦方实验录

江西省中医葯研究所編

*

江西人民出版社出版

(南昌市三緯路11号)

(江西省書刊出版業營業許可証出字第一号)

江西印刷公司印刷 江西省新华書店发行

*

書号：02096

开本：787×1092 1/32 • 印張：47/16 • 字數：99,000

1960年12月第一版

1960年12月第一版第一次印刷

印数：1—10,000

統一書号：T14110•41

定价：(11)六角五分

前 言

几年来，我省在党的中医政策光辉照耀下，开展了群众性采风献宝运动，收集了几十万个中医秘验方，其中有的是祖传、秘传，或经献方人在临床上屡试屡验的，特别是大跃进以来，各地先后编出了数以百计的中医验方集，有的地区还在进一步搜集整理与推广应用。这对继承和发扬祖国医学遗产，保障人民健康起了重要作用。

本所在省卫生厅直接领导下，负责收集秘验方的编审工作。目前对于收集材料，已经整理完毕，为了便于推广使用，初步精选了附有治验的255方，按科别、病种汇编为“锦方实验录”，以供临床参考，并希继续观察实验研究，交流经验。

由于我们水平有限，时间短促，虽在方后酌加按语，这也只是提出我们的初步意见，不一定完全正确，错误之处，敬希批评指正。

江西省中医药研究所

1960年5月

目 录

一、內科.....	(1)
傳染病.....	(1)
寄生虫病.....	(15)
呼吸系統疾病.....	(32)
循环系統疾病.....	(43)
血液、造血系統疾病.....	(44)
消化系統疾病.....	(48)
泌尿、生殖系統疾病.....	(62)
內分泌、新陳代謝疾病.....	(70)
运动系統疾病.....	(71)
精神、神經系統疾病.....	(73)
其它.....	(85)
二、外科.....	(89)
感染.....	(89)
外伤.....	(92)
头頸部.....	(94)
胸腹部.....	(96)
肛門.....	(102)
四肢.....	(103)
其它.....	(104)
三、皮膚性病科.....	(105)

四、妇产科.....	(113)
五、小儿科.....	(124)
六、五官科.....	(130)
七、方剂.....	(133)

一、內 科

傳 染 病

主 治 流行性腦脊髓膜炎。

处 方 菊花一錢，連召一錢，羚羊三分，鉤藤一錢，秦朮一錢，菖蒲一錢，鬱金一錢，川連六分，玄明粉一錢五分，
(冲服)番瀉叶一錢，桑枝尺許。

服 法 水煎服。

治 驗 罗××，男，四岁，患腦膜炎。中医所謂太陽陽明合病，風溫鬱遏于內，久則化火，偶感时气即发，風乘火勢，火借風威，以致变象甚速。用針刺两少商、百会、風府、風池、大椎、肺俞、肝俞、脾俞、委中、合谷、曲池、人中、至阴、湧泉等穴，針畢再吹臥龙丹少許入鼻，頃許病症見輕減，再給內服上药，下黑便而愈。

按：此例敘症过簡，根据針刺穴位，每次并非全用，系选用数穴，及用臥龙丹吹鼻来推测，病人必有昏迷，牙关緊閉情况，神志轉清后，尚有高热，角弓反張，抽風，腹脹便秘等症狀，所以接用內服方。

(南昌县蓮塘 罗潤清)

主治 腦脊髓膜炎。

處方 羚羊角五分，另煎沖。玄參三錢，菊花二錢，川貝錢半，連召二錢，生地三錢，梔仁二錢，花粉二錢，桑葉一錢，勾藤錢半，絲瓜絡錢半。

用法 水煎服。

治驗 尹××，男孩，年五歲，患流行性腦膜炎，延余診時已七、八日，壯熱不退，頭仰項強，手足抽搐，神昏譫語，痰鳴氣急，自汗口渴，脈數舌紅，舌苔黃，將上方除生地加甘草六分，服二劑熱退，諸症減輕。宗前方去梔子、桑葉、絲瓜絡，加生地三錢，麥冬二錢，服二劑後，每天仍發熱一次，頭項略強，渴飲不多，脈細數，舌苔黃薄，用清燥養陰藥而愈。

(永新縣 羅儒亮)

主治 腦脊髓膜炎。

處方 勾藤、銀花、連翹各五錢，牛蒡、桑葉各三錢，炒枝子、蟬蛻、竹叶各二錢，黃芩、鬱金各一錢五分，姜蚕、通草各一錢，薄荷八分。

服法 另用生蘆根三兩，先煎水去渣，再以此水煎上藥，紫金錠一條磨汁兌服。

加減法 人事不省的病者，加石菖蒲一錢，天竺黃三錢。煩躁、舌赤、譫語的病者，加犀角五分磨汁，麥冬五錢。舌如湯泡的病者，加生地、元參各五錢。手足抽搐，牙關緊閉的病者，加羚羊角五分磨汁，丹皮三錢。大便結的病者，加大黃、芒硝各二錢。

治 驗 (一)賴××，男，四十五岁，农民。患病四天，余診时，見患者神智昏沉，不食不睡，頻頻欲飲，飲亦不多，体溫38°C，脉弦，每分鐘八十次，面色黯滯，当时不能决断，因坐待片刻，忽聞錯語，乃重檢查，按其头部，叫痛，后腦部痛加重，頸項强直，不能俯屈及轉側乃風溫犯腦用上方加麦冬五錢，囑在下午和夜間进服二剂，次日病已減輕，囑再服四剂（一日二剂），复診时前症均愈。

(二)1957年11月間本县总社干部黃××，男，三十六岁，头晕痛，后腦較重，脉搏浮大而濡，投以銀翘散加味，服之未效，經他医投以补中益气湯，夜半头痛如刺，后腦尤甚，大便秘結，脉搏洪大，体溫不增加，当时先用硫苦三十克，化水頓服，并煎服上方，日夜四剂，逐漸減輕，迄服八剂，头痛痊愈。

按：此方辛涼清热息風，一般用于溫病发痧，方中紫金錠，有解毒通窍等作用。

（銅鼓永宁人民医院 王康凡）

主 治 流行性腦脊髓膜炎。

处 方 生石膏二两，知母三錢，黃芩三錢，黃連三錢，龙胆草末五分（冲服），生地黄五分，淨銀花三錢，菊花三錢，元參五錢，連召四錢，双勾藤五錢，石菖蒲五分，天竺黃二錢，川貝母二錢，殭蚕三錢。

服 法 上方用水煎服。高热神昏时，加服安宮牛黃丸。高热抽搐时，加服紫雪丹。嘔逆胸悶时，酌加服紫金錠磨研冲服。

治 驗 章舜口，男，十五岁，新余县农場干部。患头痛嘔逆，高热昏迷，輾轉反側，煩躁不安，顏面潮紅，眼結膜充血，瞳孔散大，对光反应迟鈍，頸項强直，二便失禁，脉数，巴彬奇氏征(+)，克匿格氏(+)，欧本海氏(+)，服上药二剂，体温由40°C降至正常，脑症状消失，住院一周，痊愈出院。

按：本方从清瘟败毒饮化裁而出，惟清瘟败毒重用生地、犀角，并有丹皮赤芍等血分药，适应于发斑吐血等症。本方加用勾藤、竺黄、石菖蒲、僵蚕、胆草等，适应于昏迷发痉，这是善用成方的好例子。

(新余县医院中医门诊部)

主 治 化膿性脑脊髓膜炎。

处 方 清瘟败毒饮：

生石膏二两，生地黄五钱，犀角一钱，川连二钱，栀子二钱，黄芩三钱，知母二钱，连翘二钱，丹皮三钱，竹叶二钱。

服 法 水煎服，再用紫金錠二条磨服，皂凡一钱，研末吹两鼻孔内。

治 驗 江天山，男，三十岁，新钢工人，1958年12月20日急诊入院。患者头痛剧烈，大声惊叫，神志不清，眼結膜充血，張目不瞑，赤身裸体，頸項强直，四肢厥冷，脉搏沉細数，昼夜不得安宁，用皂凡吹鼻内约半小时，鼻流血水，繼流膿样液体，叫号稍止，再进紫金錠，二小，人事安静，連服煎药二天，神志清楚痊愈。

按：此例症狀，即中醫所謂“厥深熱深”，如屬寒厥，即不宜此方。

(新余縣醫院中醫門診部)

主治 腦炎後遺症。

處方 肉桂一錢半，生地黄四錢，麥冬三錢，遠志二錢，粵皮二錢，巴戟二錢，石斛二錢，菖蒲一錢，薄荷五分，五味子五分。

服法 水煎服。

治驗 曾來賓，男性，四歲，由腦炎後，口啞不能說話，足軟不能行走，用本方十劑而愈。另有孫常僚，男孩，症狀相同，亦用此法治愈。

(泰和縣澄江鎮中醫院)

主治 腦膜炎後遺症。

處方 生地黄四錢，黑元參四錢，何首烏三錢，甘枸杞三錢，杭麥冬三錢，敗龜板四錢，胖大海二錢，蟬蛻一錢，杭菊花二錢，荷瓜萼殼三錢，石膏蒲一錢，木蝴蝶一錢。

服法 水煎過溢，趁熱加入鷄子黃(去白)二枚，攪勻服用。

治驗 1959年1月26日，新余珠珊鄉人余××，十三歲。頭痛劇烈，嘔吐，抽搐，頸項強直，神志不清，呈昏迷狀態，經用西藥治療好轉，但四天不語，手脚拘急，不能握筆和步行，服上方二劑能笑，三劑能講話，四劑四肢活動，共服十劑能步行出院。

(新余縣醫院中醫門診部)

主治 乙型腦炎。

處方 龍胆瀉肝湯加減：龍胆草三錢，石決明五錢，金銀花一錢五分，淡竹葉一錢五分，石膏三錢，連翹二錢。

服法 水煎服。

治驗 患者舒××，男性，十三歲。本年5月間患乙型腦炎，給服上方一劑後，病勢減輕，復診照原方續服二劑痊愈。

按：治驗敘述太簡，此方適用於腦炎高熱，抽風等症。

（南昌縣幽蘭 劉人駿）

主治 乙型腦炎後遺症。

取穴 主穴：曲池、合谷、足三里、環跳、風池、風府。

配穴：水溝、承漿、委中、命門、崑崙、百會、內關、外關、大沖、大椎、后谿、湧泉、心俞、肝俞、身柱。

手法 上穴位交換使用，每日針刺一次。

治驗 徐××，女，四歲，住江紡廠托兒所。患右下肢痙攣，上肢向後彎曲不前，左上肢強直，右手指緊握，項背拘急，胸炎後遺症，針灸八十次以上症狀大部消失，聾啞症狀亦有好轉，現能叫媽媽爸爸，吃飯等語言。

（南昌市東湖區醫院 譚坤貞）

主治 乙型腦炎後遺症。

取穴 主穴：曲池、合谷、中瀆、環跳、崑崙、委中、陽陵、風市。

配穴：絕骨、手三里、肩髃、足三里、天井、大陵。

手 法 初时，間日一次，后二、三天一次，上穴輪流使用，穴位均取患側穴，并速刺进針。

处 方 白芍三錢，丹皮一錢半，生地二錢，麦冬二錢，天麻一錢半，枸杞二錢，刺蒺藜、当归各一錢半，冰糖三錢，桑枝二錢，黃芪三錢。

服 法 水煎，每日服一剂。

(南昌县卫生院 王友仁 胡义太)

主 治 腮腺炎。

处 方 牛蒡子三錢，金銀花三錢，北連召三錢，野菊花五錢，粉甘草一錢。

制 法 以水三百毫升煎至一百毫升，渣再如前煎法。

服 法 每日一剂，分二次服。

治 驗 徐××，男，六岁，左側耳乳突部至下顎骨处腫脹，且有发热，經服此方四剂而愈。

附 記 我們曾用此方治疗二十余例，均取得显著疗效，一般仅服藥三至五剂就可痊愈。

(江西省榮譽軍人疗养院 郑亞仙 甘融和)

主 治 黃疸病，面目一身尽黃，口苦，小便深黃如濃茶，湿熱甚重者。

处 方 生蒲公英二兩，生車前草二兩。

制 服 法 將上藥洗淨，待水干搗爛，用布絞取汁，另用溫開水冲服白明矾末二分，約半小時到一小時，再服此藥汁，每日一剂。

治 驗 1947年有一农民陈××，患黄疸，一身面目黄如橘子色，四肢倦怠无力，无热，口苦，小便如浓茶色，皆以此方连服七日痊愈。

(赣州市中医药研究所 陆剑虚)

主 治 傳染性肝炎。

处 方 茵陈二十两，山枝子十两，淮山药十两，蔗糖六两。

制 法 先将茵陈、枝子、山药加七倍水煎一小时，过滤，再加水五倍煎一小时，去渣，并加以挤压，将以上两次煎液合并浓煎（至每十毫升内含茵陈一钱，枝子五分，淮山五分为度），加入蔗糖再煎数沸，待冷装瓶备用。

服 法 十岁以上每次十五至二十毫升，十岁以下十至十五毫升，五岁以下五至十毫升，每日服三次。

加减法 发热者加黄柏、龙胆草。腹泻者加茯苓、猪苓、泽泻。

治 驗 甘××，男性，六岁。一月前，高热三天，经对症处理热退后患儿日见消瘦，食欲不振，软弱无力，每天腹泻五、六次，大便呈白色，小便检验尿胆克、尿胆素(+)。肝功能检查，脑磷脂(+)。经服上药六天，症状消失，食欲增进。

附 記 我院曾用本方在肝炎流行期间，经治二十余例，疗效甚佳。一般服药五、六天，临床症状消失，尤其是食欲增进为显著。据统计疗效达80%以上。

(江西省荣誉军人疗养院 甘融和 郭翰英)

主治 肺热喘咳鼻衄。

处方 麻黄錢半，杏仁四錢，生石膏八錢，生甘草錢半，魚腥草汁一杯（用魚腥草之新鮮者洗淨晾干水氣，搗搗用布濾取汁）。

制服法 淨水煎麻黃、杏仁、生甘草、生石膏四味藥，用約一碗半水煎成半碗，濾去渣再兌魚腥草汁沖服。

治 驗 刘××，年四岁，贛县儲潭人。患肺脹咳喘气急，体温40°C，唇瓣环青，周身捫之灼手，头有汗，指（趾）稍凉，乃用上方头煎分三次，二煎分二次服，每隔四小时服一次，二剂热退喘平，后用清养肺阴药收功。

（贛州市中医药研究所 陆剑庭）

主治 阿米巴痢疾。

处方 白头翁，川黄连，川黄柏，北秦皮，黑地榆，广木香，全当归，生白芍，粉甘草，鞣澄茄，鸭蛋子。

服法 水煎服。

治 驗 患者呂×英，女，年三十五岁，住賽城湖垦殖場第二分場。

主診：腹瀉排紅白冻便，日夜約二十余次，里急后重，曾在門診服磺胺藥未效。入院檢查：心肺正常，腹部膨大（怀孕已九个月），肝脾（一），儿头在骨盆可聞及胎心音，腹部无明显压痛，以往身体健康，无痢疾病史。化驗：大便涂片，紅白色粘液包裹（+），蛔虫（+）。血象：紅血球3,080,000，血色素64%，白血球总数10,500，中性73%，酸性3%，单核2%，淋巴22%。

診斷：阿米巴痢疾。

中醫診察：患者发病已十余日，初起发寒发热，繼而下痢赤白，便次頻繁，約十来分鐘一次，里急后重，精神軟弱，食慾不振，怀孕已九个月，脉象弦緩，舌質紅苔薄黃。

治療經過：根据本病見証，系属湿熱下痢，气滯血凝之候，且患者怀孕，更宜照护胎兒，乃仿仲景熱痢下重者白头翁湯主之的經驗，处以白头翁湯加芍藥、当归等以清湿熱，調和气血并照顧胎兒，投藥三剂病勢日漸減輕，再服数剂痊愈出院。

(九江市第二人民醫院)

主治 痢疾。

处方 快痢湯：

厚朴二錢，木香一錢，杏仁三錢，桔梗一錢五分，薄荷一錢，防風二錢，黃連一錢，山查三錢，建神曲二錢，甘草五分，青皮二錢。

服法 水煎服。

治療 (一)周生君，男，二十岁，腹痛下痢，日夜十数次，体溫、脉搏均正常，服本方三剂后痊愈。

(二)糜美英，女，四十三岁，腹痛，里急后重，下痢无度，服本方三剂后痊愈。

(新余县中医院 敖保世)

主治 紅白痢疾。

处 方 当归三錢，白芍三錢，条芩錢半，銀花二錢，枳壳錢半，檳榔錢半，蘿蔔子錢半，滑石二錢，川木香半錢，甘草一錢。

服 法 水煎服。

治 驗 譚某，女性，二十九岁。先患腹痛泄瀉，經治无效，而轉成痢疾，紅白相兼，里急后重，四肢关节紅肿，痛連腰部，寸步难移，服前方十余剂，痢止肿消，諸病漸除，再进扶元之剂恢复健康。

(宜春卫生院 楊觉愚)

主 治 赤痢。

处 方 白芍二錢，归尾一錢，条芩一錢，黃連一錢，木香一錢，茯苓八分，檳榔八分，枳壳八分，滑石一錢，車前仁八分，花粉一錢。

服 法 水煎服。

治 驗 患者刁群牙，男性，二岁，住下浦乡街嘴口，患赤痢甚危，經服此方两剂痊愈。

(宜春县 袁文兴)

主 治 痢疾。

处 方 馬齿苋(五星草)

制 法 晒干焙燥研末。

服 法 每服三錢、四錢，日服两次、三次，赤痢加紅糖，白痢加白糖，赤白痢用紅白糖各半，开水調服。

禁 忌 生冷，魚腥，葷膩。