

本草綱目

卷二十八

菜之三

蔬菜類十一種

茄開寶

苦茄拾遺

壺盧日華

苦瓠本經

敗瓢綱目

冬瓜本經

南瓜綱目

越瓜開寶

瓠拾遺

胡瓜嘉祐

絲瓜綱目

羅勒附

天附

苦瓜救荒

右附方舊二十五新一百零八

菜之四

水菜類六種

紫菜食療

石蓴拾遺

石花菜食鑑

鹿角菜食性

龍鬚菜綱目

睡菜綱目

菜之五

芝桶類一十五種

芝本經

木耳本經

杉菌圖經

阜角蕈綱目

香蕈日用

葛花菜綱目

天花蕈日用

磨

菰蕈綱目

鷄棲綱目

舵菜綱目

土菌拾遺

鬼蓋附

竹蓀食療

蘿蔔本經

地耳別格附

錄
石耳日用

右附方舊七新二十六

瓦致諸榮

香薷	紫蘇	蘇	紫苑	蒼术	防風	苗
苗	諸葵	葵	薊菜	酸模	菖蒲	牛膝苗
車前	布苗	草	蘆笋	地蔴	牛蒡	青葙
蕪荑	豆芽	昆布	茭笋	蓼	苦菜	苗
豆莢	枸杞	豆莢	蓼芽	海藻	海苔	薄荷
豆腐	阜英	豆腐	海藻	王瓜	王瓜	龍葵
榆芽	苗	榆芽	王瓜	百部	羊蹄	韭
槿芽	榆	槿芽	百部	蘿蔔	蒲	蘭
梭筍	加	梭筍	蘿蔔	蘿蔔	蘿蔔	甘藍

菜之三

茄宋關物寶

釋名落蘇拾崑崙瓜。御醫草籠甲。頌曰：「自也。」按段成式云：「茄音加本草華之名，今呼落蘇，名義未詳。」五代賄子錄作醜蔬，蓋以其味如醜也。於王隱君養生主論用乾茄，諱名草薑，通蓋以鼈甲能治寒熱，茄亦能治寒熱，故爾。又王隱君生曰：「茄子處處有之，其類有數種：紫茄、黃茄。南北通有。白茄者水茄，惟北土有之，入藥多用。黃茄者，其餘惟可作菜茹爾。江南一種藤茄作蔓生，皮薄似蘆，亦不間中藥。」宋瘦曰：「新用黃茄，久則變色，宜急用。」

羅國出一種茄形如雞子淡光微紫色蒂長味甘中中國已遍有之一時珍曰一茄種宜於九月霜降後植如蠅頭者其葉大如掌自夏至秋開花五瓣相連如蠅頭時收取洗淨曝乾至二月下種移栽株高二三尺葉大如掌其莖有圓如括樓者長四五寸者有青茄紫茄白茄黃蘇頌曰黃茄爲一種未深究也王楨農書云一種渤海茄一種勃海茄形長味甘可止白色而堅實一種番茄白而扁甘肥不澀生熟可食一種紫茄色紫蒂長味甘一種水茄形長味甘可止渴洪齊隨種番茄云浙西常茄皆皮紫其白者爲水茄江西常茄皆皮白其紫者爲水茄亦一異也劉恂嶺表錄云交嶺茄樹經冬不凋有二三年漸成大樹者其實如瓜也茄葉摘布路上以灰圍之則子必繁謂之嫁茄

也。

【主治】寒熱五臟勞。孟治溫疾傳尸勞氣。醋摩傳腫毒。大明老裂者燒灰治乳裂。蠶散血止痛消腫寬腸。

珍時

【發明】宗奭曰一蔬圃中惟此無益。開寶本草並無主治。止說損人後人雖有處治之法。終與正烏可忽也。震亨曰一茄屬土。故甘而喜降。大腸易動者忌之。老實治乳頭裂。茄根煮湯潰凍瘡折蒂燒灰治口瘡。俱獲奇效。皆甘以緩火之意也。時珍曰一段成式西陽雜俎言。茄厚腸胃。動氣發疾。蓋不知茄之性滑。不厚腸胃也。

附方

【附方】舊五婦人血黃服二錢。溫酒調下。摘玄方。每腸風下血。經霜茄子竹刀切陰乾爲末。每日空心溫酒服二錢七分。靈苑方。久患下血。大茄種三枚。每用一枚。溼紙包煨熟。安瓶內以無灰酒一升半沃之。蠟紙封閉。三日去茄。暖飲。普濟方。腹內癰癥。陳少許脂調貼之。壽域方。卵癰偏墜。茄懸雙蒂。上抱於房門上。出入用眼視之。茄蒂所患亦癒。蘿蔔乾亦保矣。松石保壽堂方。大風熱痰。用黃老子五十斤切洗。以水五斗煮取濃汁。濾去滓。更入麝砂末同丸如梧子大。每日用硫米酒送下三十丸。近暮再服。一月乃瘳。男稠老子。大經本草。破壞青腫。時溫酒調服。二錢匕。一夜消盡。無痕迹也。勝金。腰脚拘攣。腰腳風血積冷筋骨。驗子得茄子。女所子。大食已多。及臘時酒下。三十九丸。甚效。此方出江南人傳。出入苦參末同丸梧子。經本草。腰脚拘攣急。拘掣疼痛者。取新瓦焙研爲末。欲臥墜損跌撲散血止痛。老黃茄子極大者切片。如一指厚。新瓦焙研爲末。欲臥墜損跌撲散血止痛。老茄子重。乃下消石兩重。如此鋪令盡。以不津器。至正鋪茄子一出。去紙兩重。日中曝之。逐日如此。至半二紙子。驗子得茄子。女所子。大食已多。及臘時酒下。三十九丸。甚效。此方出江南人傳。出入苦參末同丸梧子。經本草。腰脚拘攣急。拘掣疼痛者。取新瓦焙研爲末。欲臥墜損跌撲散血止痛。老黃茄子極大者切片。如一指厚。新瓦焙研爲末。欲臥墜損跌撲散血止痛。老茄子重。乃下消石兩重。如此。以不津器。至正鋪茄子一出。去紙兩重。日中曝之。逐日如此。至匙三數百。空月層枚密去。腹度飲茄。封蒂之。安人通用。皆經本草。破壞青腫。時溫酒調服。二錢匕。一夜消盡。無痕迹也。勝金。腰脚拘攣急。拘掣疼痛者。取新瓦焙研爲末。欲臥墜損跌撲散血止痛。老黃茄子極大者切片。如一指厚。新瓦焙研爲末。欲臥墜損跌撲散血止痛。老茄子重。乃下消石兩重。如此。以不津器。至正鋪茄子一出。去紙兩重。日中曝之。逐日如此。至日爛開瓶傾出。則痛止而愈矣。若膏中久乾硬。卽以飯欽化動用膏。乃可用。圖經本草。調發背惡。

瘡 用上方以酒服半匙。更以膏塗瘡口。四圍碗形合于瘡上。即消也。如已出膜似瘡乾便瘥。其有根本在膚者亦可內消。同上。

熱毒瘡腫 瓜子形合于瘡上。即消也。如已出膜似瘡總錄。牙齒腫痛。擦立效。海上名方。蟲牙疼痛之效。摘玄方。喉瘻腫痛。嚙汁。或醬茄細嚼。德生堂方。

婦人乳裂 秋月冷茄子裂開者。陰乾燒存性研末水調塗補遺方。

蒂 【主治】燒灰米飲服二錢。治腸風下血不止。及血痔。吳瑞燒灰。治口齒瘡齧。生切擦癩風時。

【發明】 時珍曰：治癩風用茄蒂。紫癩用紫茄蒂。亦各從其類耳。

【附方】 一、風蛀牙痛。未等分日用之。仁存方。

花 【主治】金瘡牙痛時。

【附方】 一、牙痛。秋茄花乾之。旋燒研末水調塗止。海上名方。

根及枯莖葉 【主治】凍瘡破裂者。湯漬之良。寶散血消腫。治血淋下血。血痢陰挺。齒齶口蕈。時珍。

【附方】 八、**血淋疼痛**。茄葉蒸乾爲末。每服二錢。溫酒或米飲下。久痢不止。等分爲燒灰。石水服之。簡便單方。女陰挺出。茄根入內。性爲未。末油調在絃上。捲之。以茄母燒灰飛鹽等分。爲沙糖皮。行走者。九月收茄根。以搗汁。頻灌之。陳海樹燒灰。名方傳之。牙痛取牙。每用點牙。卽落真妙。鮑氏方。夏月趾腫不能行走者。逐日煎湯洗之。逐日煎湯洗之。

壺盧華

【集解】生嶺南樹小有刺

子主治醋摩塗癰腫根亦可作湯浴又主瘴氣藥

【釋名】瓠瓜文匏瓜之俗作葫蘆者非矣葫乃蓀名蘆乃葦屬也此物各象其形又可爲酒飯之器因可以浮水也。如泡如漂也。凡蓏屬皆得稱瓜故曰瓠瓜匏瓜古人壺瓠匏三名皆可通稱初無分別故瓠音壺又音護瓠瓢也陶隱居本草作瓠瓢云是瓠類也許愼說文云瓠匏也又云瓠瓢也匏大腹云長瓠也。如越瓜機詩尾如壺瓠也。又云瓠首如瓠也。又云瓠尾如瓠也。不復分之條細腰者爲瓠音護瓠也。莊子云有五石之腹者爲瓠。今人所謂荼酒瓢者迥異於古以蒲蘆今參詳瓠無柄而圓大形扁者爲匏。匏大腹云長柄者爲瓠。瓠書所言其字皆當與壺同音而後世以郭義同恭而廣志謂之子皮之約性短以爲瓠也。

【集解】所以弘景曰「瓠與冬瓜氣類同輩又有瓠瓢亦是瓠類小者名瓢食之乃勝瓠此等皆利水道形則異瓠形似越瓜長尺餘尾相似夏中便熟秋末便枯瓠瓢形不似大小非一夏末始實秋中方珍曰「長瓠懸瓠」同輩蘇氏言瓠與瓠瓢全非類例皆未可憑數種並以正二月下種生苗引蔓延緣其葉似瓠葉采之烹之五六月開白花結實白色大小長短爲各似與時熟有種色瓠中之子齒列而長謂之瓠屢竊謂壺匏之屬既可烹曬又可爲器大者可爲鹽器小者可爲各以要舟可以浮水爲塗可利溥矣。」

瓠瓠氣味甘平滑無毒恭曰甘冷多食令人吐利而扁鵲曰患脚氣虛脈冷氣者食之永不除也

【主治】消渴惡瘡。鼻口中肉爛痛。利水道。弘毅。消熱服丹石人宜之。孟除煩治心熱。利小腸潤心肺。治石淋。大明。

【發明】「時珍曰」按名醫錄云。浙人食匏多吐瀉。謂之發。暴蓋此物以暑月壅成故也。惟與香菜同食。則可免。

【附方】新一。腹脹黃腫。用亞腰壺盧速子燒存性。每服一個。食前溫酒。下不飲酒者。自湯下十餘日見效。簡便方。

葉氣味甘平無毒。

【主治】爲茹耐飢。思逸。

蔓鬚花【主治】解毒。時珍。

【附方】新一。預解胎毒。七八月或三伏日或中秋日。剪壺盧髮如環子脚者。陰乾於除冬煎湯浴。小兒則可免出痘。唐瑤經驗方。

子【主治】齒斷或腫或露。齒搖疼痛。用八兩同牛膝四兩。每服五錢。煎水含漱。日三四次。御藥院方。

苦瓠本經
苦瓠下品。

【釋名】苦匏。國語。苦壺盧。

【集解】「別錄曰」苦瓠生晉地。弘景曰。今瓠忽有苦者。如膽不可食。非別生一種也。又有瓠用無所主。亦不堪啖。瓠與瓠瓢原種各別。非甘者變爲苦也。保昇曰。瓠即匏也。有甘苦二種。亦有所見。未可知也。瓠壺同音。陶氏以瓠作謾。音釋之所以不穩也。應劭風俗通云。燒穰可以殺瓠。或云畜瓠而之音。說甘藥瓢。

家不燒纓種瓜之家不焚漆物性相畏也。蘇恭言服苦瓠過分吐利不止者以
蒸穢灰汁解之。蓋取乎此凡用苦瓠須細理。疊淨無羣翳者乃佳不爾有毒。

瓢及子氣味】苦寒有毒。

【主治】大水。面目四肢浮腫。下水令人吐。利石淋。吐呀嗽。囊結症疎痰飲。又煮汁瀆陰。療小便不通。

恭煎汁滴鼻中出黃水去傷冷鼻塞黃疽。器吐蠶蟲。明治癰疽惡瘡疥癬。齷齒有蟲齷者又可制汞。時

【附方】舊八新

急黃病。苦瓠一枚。開孔以水煮之。攪取陳藏器黃疽腫滿。合浸之一時。取兩酸棗大納兩鼻中。半錢日一服。十日愈。然有吐者當詳之。傷寒類要。大水脹滿。頭面洪大。用瑩淨好苦瓠白瓢捻如

出水一斗。二日水自出。不^止大便乃瘳。二年內忌鹹物。

○聖惠用苦瓠蘿一兩。微炒爲末。每日粥飲服一錢。通身水腫。小豆大每服五丸。日三水下止。○又丸當豆

十用苦瓠膜五分。大棗七枚。擣丸一服。丸如人行

日三水下止。水盡洪腫。苦瓠蘿一枚。水二升。煮至一升。煎至可丸。如小豆大每飲下十丸。又丸當豆

一個。燒爲未。每冷水服。

並聖濟總錄。小兒閃癖。取苦瓠未破者。煮令熱解。風痰頭痛。苦瓠膜取汁。以葦管灌氣上衝腦門。須臾惡涎流下。其病

立愈。除根勿以昏遲爲疑。乾者浸汁亦效。

其鼻窒氣塞。苦瓠子爲末。醇酒浸之。聖惠方。眼目昏暗。月七日。少少點之。

同七日。取苦瓠白瓢絞汁一合。納酢二升。古金一千。

弩肉。醫小處。鋸斷內空一小孔。如眼孔大。遇有此緊

同微火煎。減半日取苦瓠白瓢絞汁一合。納酢二升。古金一千。

弩肉。醫小處。鋸斷內空一小孔。如眼孔大。遇有此緊

同微火煎。減半日取苦瓠白瓢絞汁一合。納酢二升。古金一千。

弩肉。醫小處。鋸斷內空一小孔。如眼孔大。遇有此緊

同微火煎。減半日取苦瓠白瓢絞汁一合。納酢二升。古金一千。

弩肉。醫小處。鋸斷內空一小孔。如眼孔大。遇有此緊

同微火煎。減半日取苦瓠白瓢絞汁一合。納酢二升。古金一千。

弩肉。醫小處。鋸斷內空一小孔。如眼孔大。遇有此緊

靈者各穿一孔如指大湯煮十數沸取一竹筒長一尺一頭注瘡孔上冷則易之用遍乃止千金方藥龍湯先煮後洗
瓠子孔中一頭注瘡孔上冷則易之用遍乃止千金方藥龍湯先煮後洗
良方捕下部懸瘻不老人生在架上而苦者切片華水調藥煎末一盤服之微利後卻用一灸炎塗蠻蠻片腦末
玄方下部懸瘻不老人生在架上而苦者切片華水調藥煎末一盤服之微利後卻用一灸炎塗蠻蠻片腦末
方卒中蠱毒或吐血或下血皆如爛脣者苦瓠子一枚水二升煮一升服之取吐神驗立死胎不下苦瓠子苦丁香等分入麝香
鈴海熱酒下。時耳出膿濕淨吹入半字日二次爲末以絲先鼻中瘻肉少許爲末紙撲點之聖惠方

花【主治】一切瘻瘍。霜後收曝研末傅之。珍

敗
瓢
目
上

【集解】藥亦時用之。時珍曰：「瓢乃匏壺，破開爲之者，當以苦瓠者爲佳。年久者尤妙。」

【氣味】苦平無毒。

【主治】消脹殺蟲。治痔漏下血，崩中帶下，赤白。

附方 新 中滿鼓脹用三五年陳壺盧瓢一個以燒米一斗作酒待熱以瓢於炭火上蒸熟入瓶候冷飲之。下血敗氣燒存性等分研末每服三錢酒下神效。心溫酒服二錢簡便方。發物生冷。腦漏流涕。破瓢白雞冠花白螺殼各燒存性等分。海上方。連藥搗成餅貼在項門上以熨斗熨之以愈爲度。孫氏集效方。大便祕。灸艾連藥搗成餅貼在項門上以熨斗熨之以愈爲度。

瘤癰。用長柄茶壺盧燒存性研末搽之。以消爲度。一府校老嫗右腋生一瘤。漸長至尺許。瀕湖集簡方。湯火傷灼壺
瘡。其狀如長瓠子。久而潰爛。一方士教以此法用之。遂出水消盡而愈。

盧瓢燒傳

冬瓜本經

【校正】今併入白瓜子。

【釋名】白瓜。水芝。同上。地芝。廣雅○「志曰」冬瓜經霜後皮上白如粉塗。其子亦白。故名白冬瓜。三月種之。若十月種者。結瓜肥好。乃勝春種。則冬瓜之名或又以此也。別錄曰。冬瓜原附於本經。瓜子之下。宋開寶本草。加作白瓜子。復分白冬瓜爲別錄。一種。遂致諸註辯說紛紛。今併爲一本。

【集解】蔓下大者如斗。而更長。皮厚而有毛。初生正青綠。經霜則白。頃人多藏蓄。圍圃中。作菜果。入生熟。須霜後取。置之經年。破出核。洗燥。乃播取仁。用之亦堪。單作服餌。時珍曰。冬瓜三月生苗。引蔓葉圓而有尖莖。葉皆有刺毛。六七月開黃花。結實大者徑尺餘。長三四尺。嫩時綠色有毛。老則蒼色。粉其皮堅厚。其肉肥白。其瓢謂之瓜練。白虛如絮。可以浣練衣服。其子謂之瓜犀。在瓢中成列。霜後取。蓋兼蔬果之用。凡收瓜忌酒漆麝香及糯米觸之必爛。

弘景曰

利。

白冬瓜

【氣味】甘微寒無毒。一弘景曰。冷利。

【主治】小腹水脹利小便。止渴。銚汁服。止消渴煩悶。解毒。最益氣耐老。除心胸滿。去頭面熱。孟消熱毒。癰腫切片。摩痈子甚良。明大利大小腸。壓丹石毒。蘇。

【發明】一。旣曰。熟者食之佳。冷者食之瘦人。煮食脾五臟爲其下氣故也。欲得體瘦輕健者。則可長食之。若要肥。則勿食也。一。宗奭曰。凡患食背及一切癰疽者。削一大塊。置瘡上。熱則易之。分散熱毒氣甚良。一。靈亨曰。冬瓜性走而急。惡者忌之。孫真人言。九月勿食。令人反胃。須被霜食之。乃佳。○一。旣曰。一。取瓜一顆。和桐葉與豬食之。陰一冬更不要與諸物食。自然不饑。長三四倍也。

【附方】新六積熱消渴。白瓜去皮每食後啜三二枚削皮埋溼地中一日取出。清水日飲之或燒熟絞汁飲之。聖濟開總消渴骨蒸。大冬瓜一枚去瓢入黃連末填滿安鑑內待瓜消盡產後渴。口舌乾燥用冬瓜一枚黃土泥厚五寸燒熟絞汁飲亦治傷寒病渴。古今錄驗。小兒渴利。冬瓜汁飲千金。小兒脅病水三升煎湯浴之。千金方兩。嬰孩寒熱冬瓜炮熟絞汁。神效無比。兵部手集。冬瓜不拘多少任意啜之。十種水氣。赤小豆填滿用大冬瓜一枚切蓋去瓢以飲子母祕錄。水病危急。冬瓜不拘多少任意啜之。十種水氣。赤小豆填滿用大冬瓜一枚切蓋去瓢以飲。日乾用糯米兩大糲入瓜內煨至火盡取出切片同豆煆乾爲末。水糊丸發背欲死。冬瓜截去頭合梧子大每服七十九丸煎冬瓜子湯下日三服。小便利爲度。楊氏家藏方。馬汗入瘡。乾冬瓜燒研。食魚中毒。冬瓜汁飲之。小品方面黑。更合之。瓜未盡。瘡已小愈。乃用膏貼之。肘後方。痔瘡腫痛。冬瓜煎湯洗之。袖珍方。馬汗入瘡。乾冬瓜燒研。食魚中毒。冬瓜汁飲之。聖濟總錄。

令白冬瓜一個竹刀去皮切片酒一升半水一升煮。

瓜練瓜。氣味。甘平無毒。

【主治】令人悅澤好顏色。益氣不飢。久服輕身耐老。本除煩溼不樂。可作面脂。別去皮膚風及黑點潤。

【主治】絞汁服止煩躁熱渴利小腸治五淋壓丹石毒。權洗面澡身去黓黯令人悅澤白皙時。

【附方】新二消渴煩亂。冬瓜瓤乾者一兩。聖濟方水煎飲。聖濟總錄。

白瓜子仁。別錄曰。冬瓜。正誤。恭曰。此甘瓜也。甘字似白字。人誤寫耳。當改從甘字。志曰。

有者白二種。其子色黃。主療與冬瓜全異。但冬瓜經霜有白衣其子亦白白之號。因斯而得名。諸方惟用冬瓜子。不見用甘瓜子者。蘇說不可憑也。

【氣味】甘平無毒。

【主治】別錄曰。

令人悅澤好顏色。益氣不飢。久服輕身耐老。本除煩溼不樂。可作面脂。別去皮膚風及黑點潤。

飢膚明治腸癰時

珍

【發明】頌曰

冬瓜仁亦堪單作服餌。又研末作湯飲及作面脂。卽瓜瓣也亦堪作澡豆。宗奭曰。服食方亦稀用之。

【附方】舊二

服食法。取冬瓜仁七升以絹袋盛投三沸湯中。須臾取曝乾。加此三度。又與清苦酒瀆之。

【附方】新五

服食法。二宿曝乾爲末。日服方寸匕。令人肥悅。明目延年不老。又法。取子三五升去皮。丸空心日服三十丸。令人補肝明目。治男子五勞七傷。明目用冬。悅澤面容。白瓜仁五兩。桃花四兩。楊皮二兩。爲末。食後飲服。

白淨如玉。

孟蹠食療。外臺祕要。不瘥者。瓜子未溫酒消渴不止。用乾冬瓜仁炒爲末。每空心服。

方寸匕。日服。

白五十日。手足俱白。一方有橘皮。欲紅加桃花。三十日面多年損傷服之。孫真人方。

白。五十七日。

手足俱白。一方有橘皮。欲紅加桃花。三十日面多年損傷服之。孫真人方。

瓜子麥蘖各二兩。水煎飲之。

冬。男子白濁。陳冬瓜仁炒爲末。每空心服五錢。救急易方。女子白帶。方同。

瓜苗葉俱治冬黃連。

各二兩。水煎飲之。

冬。男子白濁。

陳冬瓜仁炒爲末。每空心服五錢。救急易方。女子白帶。方同。

瓜皮

【主治】可作丸服。亦入面脂。主驢馬汗入瘡腫痛陰乾爲末。塗之。又主折傷損痛。

【附方】新

跌撲傷損。用乾冬瓜皮一兩。眞牛皮膠一兩。剉入鍋內炒存性。研末。每服五錢。好。

一錢。皮燒研酒服。

冬瓜皮。生生編。

【附方】新

積熱瀉痢。冬瓜葉嫩心拖麪煎。海上名方。

【附方】新

積熱瀉痢。冬瓜葉嫩心拖麪煎。

【附方】新

燒灰。可出繡線。煎湯洗黑癩并瘡疥。明擣汁服。解木耳毒。煎水洗脫肛。燒灰可淬銅鐵伏砒。

石。時珍。

【附方】新

燒灰。可出繡線。煎湯洗黑癩并瘡疥。明擣汁服。解木耳毒。煎水洗脫肛。燒灰可淬銅鐵伏砒。

南瓜。目。

【集解】引時珍曰：「南瓜可種出南番，轉入閩浙。今燕京諸處亦有之矣。二月下種，宜沙沃地。四月生葉，八九苗。霜收置暖處，可留至春。其子如冬瓜子，其肉厚色黃，不可生食。惟去皮瓢，淪食，味如山藥。同豬肉煮食，經年不壞。」

【氣味】甘溫無毒。一名蜜柑。

【主治】補中益氣。

越瓜宋開

【釋名】稍瓜。食菜瓜。俗名稍瓜。南人呼以地名也。

【集解】引藏器曰：「越瓜生越中，大者色正白。越人當果食之，亦可糟藏。」時珍曰：「越瓜南北皆有。」

【瓠子】一種長者，至二尺許，俗呼羊角瓜。其子狀如胡瓜子，大如麥粒。其瓜生食可充果，蔬薦，或加糖醋藏浸，皆宜。亦可作菹。

【氣味】甘寒，無毒。小兒天行病後，多冷中動氣，令人心痛，臍下癥結發諸瘡，又不得與牛乳、酪及鮭同食。時珍曰：「按蕭子真云：菜瓜能暗人耳目，觀鰐馬食之，卽眼爛可知矣。」

【主治】利腸胃，止煩渴。利小便，去煩熱，解酒毒，宣洩熱氣，燒灰傅口吻瘡，及陰莖熱瘡，和飯作餚。久食益腸胃。

胡瓜宋嘉祐

【釋名】黃瓜。〔按杜寶拾遺錄云隋大業四年避諱改呼黃瓜至今因之。〕時珍曰：「張騫使西域得種，故名胡瓜。土生卽此誤矣。王瓜也。見草部。」

【集解】時珍曰：「胡瓜處處有之。正二月下種，三月生苗，引蔓至老，則黃赤色，其子與菜瓜子同一種。五月種者，霜時結瓜，白色而短，並生熟可食，兼蔬蓏之用。」槽醬不及菜瓜也。

【氣味】甘寒，有小毒。〔說曰：「不可多食。動寒熱，多瘧病。積癥熱，發疰氣，令人虛熱上逆，少氣，損陰血。」

【主治】清熱解渴，利水道原。

【附方】舊二、小兒熱痢，嫩黃瓜同蜜食十餘水，病肚脹，四肢浮腫，用胡瓜一個，破開連子，以醋煮一牛至爛空心，俱食之，須臾下水也。〔千金方：小兒出汗，香瓜丸用黃連、胡黃連、黃芩、川大黃、慢火煨熟，同炙柴胡、蘆薈、青皮等分爲末，用大黃瓜黃色七丸至十九丸，食後新水下，錢乙小兒方。〕每服二丸，大者五粒，小者三丸，日服二次。

〔方摘要〕

葉〔氣味〕苦平，有小毒。

〔主治〕小兒閃癖，一歲用一葉，生搊攪汁服，得吐下良藥。

根〔主治〕擣傅，狐刺毒腫，大風。

絲瓜

【釋名】天絲瓜。本天羅事類。

事合壁布瓜。同蠻瓜。本魚鱸。時珍曰。此瓜老則筋繩故有絲羅之名。

【集解】棚架其葉大如蜀葵而多丫尖。有細毛刺。取汁可染綠其莖。有棱。六七月開黃花。五出微似胡瓜。花蕊瓣俱黃。其瓜大寸許長一二尺。甚則三四尺深。綠色有鐵點。瓜頭如鼈首。嫩時去皮可烹可爆。惟可藉鞋履。濂盆器。故村人呼爲洗鍋羅瓜。內有隔子。在隔中狀如苦蕷子。黑色而扁。其花萼及嫩葉卷鬚皆可食也。

瓜【氣味】甘平無毒。老者入藥用。

【主治】痘瘡不快。枯者燒存性。入朱砂研末。蜜水調服。甚妙。亨養食除熱利腸。老者燒存性服去風化痰涼血解毒殺蟲。通經絡行血脉。下乳汁。治大小便下血。痔漏崩中。黃積痛。卵腫。血氣作痛。癰疽瘡腫。齒齦。痘疹胎毒。時暖胃補陽固氣和胎。生

【發明】穎曰絲瓜本草諸書無考。惟痘瘡及腳癰方中燒灰用之。亦取其性冷解毒耳。時珍曰。諸血病也。

【附方】新二痘瘡不快。初出或未出。多者令少。少者令稀。老絲瓜近癰疽不斂。瘡口太深。用絲瓜搗成糊。指方風熱腮腫。絲瓜燒存性研末。肺熱面瘡。等分油調搽。摘玄方玉蘆瘡。潰子未頻搽之。丹溪方坐板瘡疥。絲瓜皮搗乾爲末。燒酒天泡溼瘡。絲瓜汁調辰星。手足凍瘡。豬脂塗之。海上方肛門酒痔。存性和臘研。絲瓜燒

未敷酒服二錢。痔漏脫肛。絲瓜燒灰。多年石灰雄黃各五錢爲末。以豬膽雞腸風下血。霜後乾絲瓜燒性爲末。空心酒服存。天絲瓜一名蠻瓜。一名天羅。一名許叔微本事方。下血危篤。不可救者。絲瓜卽天羅一個燒存。普濟花酒病便血。腹如魚膾或鹽湯服。奇效良方。經驗良方。血崩不止。鹽酒或鹽湯服。老絲瓜燒灰。櫻榔燒灰等分。經脈不通。乾絲瓜末用白鵝血調成餅。日乾研末。每服二錢。海上名方。乳汁不通。絲瓜連子燒存。性研酒服一二錢。被覆取汗。助通。簡便單方。乾血氣痛。婦人不行血氣者。用絲瓜一小錢。熱酒調下。甚者不過三服即消。小腸氣痛。達摩衡心連帶老絲瓜燒存。性研末。每服三錢。熟酒調下。甚者不過三服即消。神方。腰痛不止。天羅布瓜子仁炒魚搗酒。架上初結者。留下待瓜結盡葉落取下燒存。性爲末。燒蜜調成膏。腰痛不止。天羅布瓜子仁炒魚搗酒。早晚好酒服一匙。如在左睡在右睡。劉松石保壽堂方。喉閉腫痛。灌之。普濟卒然中風。防風荆芥一兩升麻半兩薑三片水一錢煎半錢。以絲瓜子研末。每晚好酒服一丸。瓜燒存化下。未藥生妙用丸彈子。風蟲牙痛。經霜乾絲瓜燒存。性指方。風氣牙痛者用此大效。瘧止。天羅卽絲瓜燒存化下。未藥生妙用丸彈子。風蟲牙痛。經霜乾絲瓜燒存。性指方。風氣牙痛者用此大效。瘧能去風。惟蛀牙不效。天羅卽生絲瓜一個擦鹽火燒存性研末。頻擦涎盛卽愈。食積黃疸。絲瓜連子燒存。性爲末。每服二錢。因麩得病。麩湯下。因酒得病。小兒浮腫。天羅燈草葱白等分煎濃溫酒。衛生易簡方。小兒浮腫。汁服并洗之。普濟方。水蘆腹脹。翦巴豆去皮一枚。同炒豆黃去豆。以瓜同陳倉米再炒。去瓜研米爲末糊丸梧子大。每服百丸。白湯下。蓋米收胃氣。巴豆逐水絲瓜象人脈絡。借其氣以引之也。此乃元時杭州名醫宋會之之方。鮮于樞鉤玄。

葉【主治】癰瘡。頻接摻之。療癰疽。丁腫卵癰。時。

【附方】新蟲癰。清晨采露水絲瓜葉七片。逐片擦下。如神。忌雞魚發物。攝生衆妙方。陰子偏墜。絲瓜葉燒存性三錢。雞子殼燒生蛆。頭皮內時有蛆出。以刀切破擠絲瓜葉。湯火傷灼。絲瓜葉研入辰粉一錢。蜜調搽之。生蛆者撻傅。一日即好也。海上升名方。魚臍疔瘡。

絲瓜葉卽處貼左腋右手貼右腋也。連矣。如潮熱亦用此法。卻令人抱住危氏得教方。刀瘡神藥。古石灰新石灰下作餅陰乾爲末擦之。止血定痛生肌。各神等散手。

傳侍御蘇海峯所

董炳集驗方

藤根氣味葉同

【主治】齒齦脳漏殺蟲解毒。時珍。

【附方】
一、新預解痘毒。一人知溫浴小兒身面上下以去胎毒。永不岀痘。縱出亦少也。
二、半煎湯。母父只令

瘡久潰大涼卽愈。應驗方。喉風腫痛浸飲之。海上名方。腦崩流汁。腦砂有蟲食腦中也。用絲瓜藤

近根三五尺燒存性。每服一錢。牙宣露痛。海上升妙方。用絲瓜藤陰乾。臨時火燉燈心性研搽即止。

吐其痛立咽喉骨鯁。七月以七日取絲瓜根降火燉燈心性研搽即止。

住其痛立咽喉骨鯁。二錢以原餌物煮湯服之。筆峯雜興。腰痛不止。絲瓜根燒存性。每服二錢。神效甚捷。

【附錄】天羅勒。拾遺。不詳。又曰江生江南平地。主羅蠭。接碎博之。時珍曰。附之。

苦瓜
莖葉

【釋名】錦荔枝。荳蘼蒲萄。時珍曰。苦以實及莖葉相似。從名荔枝。

【集解】花實大如雛子。有皺紋似荔枝。時珍曰。苦瓜原出南番。今閩廣皆種之。五瓣有毛澤葉似野葡萄。莖蔓如蘿蔔卷葉並如荔枝殼狀。熟則黃色自裂。內有紅瓤。子如盤形結瓜長者四五寸短者二三寸。青色人上引黃