

藥性賦註解

欽定四庫全書
醫部全錄
卷之四
藥性賦註解

PDG

前言

这本「药性赋注解」，是济宁老中医孙馨亭先生所著，今夏卫生厅交给我班整理，遂由同学六人，组成整理组，用集体讨论，分工整理的方法进行研究整理的。

孙先生对药物的研究是很精湛的，在注解方面，多有独到之处。他对药理学的工作，是有一定贡献的，但在文字方面和内容上略欠完备，这就是我们进行整理的重点。

药性赋一书，是学习中医的基础读物之一，尤其中医带徒弟时，更为需要。注者于每味药物之下，加以注解，说明其治疗某种疾病的原理。使学者很清楚的掌握这些药物的药理和疗效，这对初学者是有极大帮助的。

我们的整理工作，是在原注基础上加以整理的，为了保存原注的本来面目，未能改用语体文，但在个别词句上作了修改。在内容上也有所芟薙和补充，如犀角注解即删去了大部分而补充了附方用量等。

由于我们受到水平的限制，很难做到完美无缺。希望医务界同仁们提出批评和指正，使我们的研究整理工作得以改进和提高。

山东省中医研究班

一九五六年十月

目 录

前 言

寒性药赋.....一

热性药赋.....二九

温性药赋.....五二

平性药赋.....七六

附 录

十八反歌.....一〇三

十九畏歌.....一〇三

六陈歌.....一〇四

妊娠服药禁忌歌.....一〇四

寒性藥賦

諸藥賦性此類最寒

犀角解乎心熱

【注解】心熱者，邪熱入心，而現神昏譫語，煩亂不寧是也。犀角味苦酸咸，性寒泄。功能清熱涼血，故有解除心熱之效。古說妊婦忌用。

【附方】治小兒風熱驚癇：犀角磨水服之立效，為末亦可。

【用量】二分——六分。

羚羊清乎肺肝

【注解】肝熱則抽搐，肺氣逆則心胸煩悶。羚羊角味咸苦，性微寒。功能清肝下氣，故皆治之。肝經無熱者忌用。

【附方】噎食不通：羚羊角研細末飲服。

【用量】三分——一錢，研末或磨汁用。

澤瀉利水通淋而補陰不足

【注解】澤瀉甘淡微寒，有利水之功，故能通淋，但滲利太過，未免傷陰。俗謂補真陰之不足，大謬，古說多服令人目昏，可征也。世人只知有利水之功，不知有傷陰之害，恣意用之，往往誤人。余治一人患白濁，以澤瀉為主，佐以其他瀉水之品，不數劑，腰腿疼痛，不能起牀，足為前車之鑒！

【附方】治水濕腫脹：白朮、澤瀉，各一兩，為末或丸服，每次三錢，茯苓湯下，以愈為度。

【用量】一錢半——四錢。

海藻散癭破氣而治疝何難

【注解】癭瘤多因痰凝火結；疝氣卵腫，亦有濕熱壅滯而成者。海藻味咸性寒，有泄熱、散結、化痰、利水之效，故癭瘤疝氣，并皆治之；惟須多服久服，方能見功。虛寒之病忌用。

【附方】（1）一人患火疝，用海藻二兩、木通一兩、大麦芽一兩炒黑，水煎服，一服立消。

（2）一人患癭腫，用海藻一斤，酒三斤，浸七日飲之；酒盡，將渣曝干為末，每服三錢，仍用上法浸酒飲之，其渣仍為末服，至癭腫消淨為度。

（3）一人患蛇盤瘰癧，海藻蕎面炒、僵蚕炒等分為末，白梅湯和丸如梧桐子大，每服六十丸，瘰癧消盡為度。

【用量】一錢半——四錢。

聞之菊花能明目而清頭風

【注解】目為肝竅，肝經有熱，則目昏不明，或紅腫疼痛。菊花甘苦微寒，能清肝熱，故目病之因于肝熱者，用之皆效。若目昏原于肝經血少，腎水不足者，非兼補血補精之藥不可，只用菊花清之，斷不能效。偏正頭痛，謂之頭風，乃肝經風

熱上冲所致。菊花不惟清肝，且疏風熱，所以頭風服菊花立愈。

【用量】一錢——三錢。

射干療咽閉而消癰毒

【注解】咽屬胃，喉屬肺，肺胃之火上冲，則咽喉腫閉。射干苦寒，能清肺胃之火。肺胃之火清，則咽喉不腫，而自不閉矣。癰毒，亦火毒之盛也。射干能瀉實火，火降則血散腫消，而癰毒自愈。唯實火宜之，虛者大忌。

【用量】五分——一錢半。

薏苡理脚氣而除風濕

【注解】脚氣乃濕熱之病。薏苡甘淡微寒，能清濕熱。濕熱去，則脚氣自愈。所謂風濕者，指久風濕痺、筋急拘攣而言。其治宜緩而不驟，故方家舍白朮之苦燥，而取薏苡之甘淡也。妊婦忌用，恐傷胎。

【附方】治消渴飲水：薏苡煮粥食之，并飲其湯。

【用量】三錢——六錢。

藕节消瘀血而止吐衄

【注解】吐血、衄血，大都血热所致。藕节化瘀血而清血热，故治吐血、衄血最为相宜。盖止血之法有三：化瘀清热一也，攻下二也，斂滯三也。但老弱者不任攻下，有瘀者最忌斂滯。惟化瘀清热一法，既不伤正，又不留邪，最属稳妥。切勿因其易得而忽之。

【附方】（1）一男子患血淋，痛胀欲死，以藕汁调发炭服之，每服三钱，三日而愈。

（2）一人患痢，百治不效，用鲜藕节捣烂，热酒调下，数服遂愈。

【用量】三枚——五枚。

瓜蒌子下气润肺喘兮又且宽中

【注解】喘促胸闷，多由肺受火逼，因而痰涎壅塞，肺窍不利。用瓜蒌子之苦寒润下，以荡滌胸中郁热，使痰气下降，而喘促胸闷自除。惟瀉泄者忌之。

【附方】治乳汁不下：瓜蒌子炒香，酒服三钱。

【用量】二钱——四钱。

車前子止瀉利小便今尤能明目

【注解】車前子甘寒，清肺肝而滲膀胱濕熱。凡瀉利暴作，小水不通之由于暑濕者，目暗瀉痛之因于濕熱者，皆有捷效。但氣虛下陷及真陰不足者，則宜慎用。

【附方】治石淋痛甚：用車前子二兩絹袋盛，以水煎服。

【用量】一錢——三錢。

是以黃柏瘡用

【注解】諸痛痒瘡，皆氣血凝滯，火毒薰蒸之為患。黃柏苦寒，清火解毒，故治瘡極驗。對於下部濕熱，陰陽蝕瘡，其效尤捷。但苦寒傷胃，陰瘡或瘡毒潰后，切勿妄投。

【用量】一錢——三錢。

兜鈴嗽医

【注解】馬兜鈴，苦辛寒泄，能去肺中濕熱，故治肺熱咳嗽，痰結喘促。若肺寒咳

嗽，服之必增重，慎之。

【用量】一錢——三錢。

地骨皮有退熱除蒸之效

【注解】骨蒸潮熱，皆由陰虛。地骨皮甘淡微寒，補陰涼血，故有退熱除蒸之效。但脾胃虛寒者禁用。

【用量】一錢半——三錢。

薄荷葉宜消風清腫之施

【注解】薄荷辛涼，散風而消腫，所以癰疹瘙癢、瘡疥腫毒皆治之。但虛人不宜多服，以其發汗疏表故也。

【用量】內服七分——一錢半。內服煮時宜后加；外用需搗爛局部罨敷。

寬中下氣枳殼緩而枳實速也

【注解】凡胸腹脹滿，由於熱結氣滯者，必須破之以寒泄之品。枳殼、枳實皆性寒

而有寬中下氣之功，故為消除脹滿之要藥。但枳壳力小，枳實力大。枳壳寬腸胃，枳實利胸膈，二者稍有不同。若脹滿之因于脾虛或中寒者，大非所宜。

【用量】枳壳一錢半——三錢。枳實一錢——一錢半。

療肌解表干葛先而柴胡次之

【注解】葛根、柴胡同屬發表升散之藥，然其性能大異，如：葛根甘平微辛，柴胡苦平微寒；葛根開腠理、發汗解肌，柴胡散郁結、和解表里；葛根升發脾胃，柴胡宣暢氣血；葛根治胃氣不能敷布之嘔，柴胡治上焦不通之嘔；葛根入陽明胃經，治項背強急，柴胡入少陽胆經，主胸脇滿痛等是也。今人一遇風寒外感，輒麻桂柴葛，參然并陳，可謂無的放矢。

【用量】葛根一錢半——三錢。柴胡八分——一錢半。

百部治肺熱咳嗽可止

【注解】百部甘苦微寒，潤肺而且開泄降氣，宜于肺熱癆瘵喘嗽；此外尚有殺蟲之功。但脾胃虛寒，大便瀉瀉者忌用。

【用量】一錢半——三錢。

梔子涼心腎鼻衄最宜

【注解】梔子苦寒，瀉心肺邪熱，治心中煩悶，熱厥心痛，復達下焦，治濕熱郁結之淋閉、黃疸、疝氣等症。妙黑止鼻衄甚驗。惟損伐胃氣，虛者忌之。

【用量】一錢半——三錢。

玄參治結熱毒癰清利咽膈

【注解】玄參苦咸微寒，潤下軟堅而清浮游之火。凡癰毒、瘰癧、咽喉腫痛之原于陰虛火動者皆效。脾虛瀉泄者忌用。

【用量】二錢——三錢。

升麻消風熱腫毒發散瘡瘍

【注解】腫毒瘡瘍之由于風熱郁閉者，非借升麻之甘辛微苦，升提發散不愈。但陰虛火動及痘疹見点后，慎勿妄投。

【用量】五分——一錢半。

嘗聞膩粉抑肺而斂肛門

【注解】膩粉即輕粉，辛涼而燥，有毒。外用治療瘰、癰毒、疥癬諸瘡；內服痰、消積驅蟲；并為梅毒之專藥。惟毒性太烈，若用之失宜，或服之過劑，往往祛筋骨拘攣，牙齒脫落，甚至有口舌腫閉而死者，用之當慎！

【用量】多為外用。內服入丸散劑，大人一日七厘，數次分服，小兒依年齡遞減。

金箔鎮心而安魂魄

【注解】金箔辛平有毒，其性重墜，故能鎮心肝，安魂魄，治驚癇風熱肝胆之病。若神魂不安之由心氣虛，并无實熱惊邪者，當以補心安神為治，非金箔所能定也。

【用量】三分——五分

茵陳主黃疸而利水

【注解】黃疸，多因熱郁濕停。茵陳苦平微寒，解郁熱，泄停濕。功能蕩滌腸胃，

外达皮毛，故为医治黄疸之要药。然黄疸有阴黄阳黄之别，阴黄须与温经药并用；若发黄由于蓄血而非湿热者禁之。

【用量】普通量一錢半——四錢。大量五錢——一兩。

瞿麥治热淋之有血

【注解】热淋，系由湿热壅滯而成。瞿麥苦辛寒泄，逐热利窍，而行停水，故治热淋最效；且本品兼破血之功，则热淋而又下血者亦宜。但妊娠或产后，小水不利及老弱气化不行，而为癃闭澀少者，皆忌之。

【用量】一錢半——三錢；最大量可用至一兩甚至二兩。

朴硝通大腸破血而止痰癖

【注解】朴硝，辛苦大寒。功能瀉熱、潤燥、消積、軟堅。凡大便閉塞、留血、停痰之由于邪熱壅結者，非此不能開泄。若病非實熱，或熱結不堅者，慎勿用此削伐之品，孕婦亦忌之。

【用量】三錢——五錢。

石膏治頭痛解肌而消煩渴

【注解】石膏，辛甘大寒，体重而降，耑清阳明燥热。凡头痛由于胃热上冲，肌肉壮热由于胃热熏蒸，烦渴由于热燥津液者，皆石膏所主。但血虚胃弱及病邪未入阳明者忌用。

【用量】五錢——二兩为煎剂。

前胡除内外之痰实

【注解】前胡，苦辛微寒，性阴而降。功耑下气、散风、清肺、化痰，故治时气外感，内外俱热之痰实喘嗽最宜。若内无实热，外无感邪；气不归元，胸胁逆满者，切忌。

【用量】一錢五分——三錢。

滑石利六腑之滯結

【注解】滑石，甘寒滲淡，通六腑九窍津液，而利滯結，行积滯，下垢膩，逐湿

熱，分水道；宜于中暑積熱，嘔吐煩渴，黃疸，水腫，熱痢，水瀉，淋閉等症。脾虛下陷及滑精者忌之。

【用量】一錢半——三錢，水飛用。

天門冬、止咳、補血、潤而潤肝心

【注解】天門冬，甘柔養心而潤肝，苦寒降火而清肺，滋腎潤燥，補血益精，治骨蒸勞熱，肺痿消渴，痿厥嗜臥，足下熱痛。但脾胃虛而瀉泄者，忌用。

【用量】一錢五分——三錢。

麥門冬、清心、解煩、渴而除肺熱

【注解】麥門冬，甘平微寒，沖和而淡，能清心潤肺，養胃生津，消痰止嗽，瀉熱除煩。惟脾陽不振者，須佐以健脾藥始妥。

【用量】一錢半——三錢。

又聞治虛煩除噦嘔須用竹茹

【注解】嘔噦，多屬胃熱；虛煩，亦胃中客熱所致。竹茹甘而微寒，甘能安中，而煩自寧；寒能解熱，而嘔自止。无胃熱者忌之。

【附方】余治胃熱嘔吐，用竹茹、白芍、川楝子、代赭石，每应手輒效。

【用量】二錢——三錢。

通秘結導瘀血必資大黃

【注解】大黃，大苦大寒，蕩滌腸胃，推陳致新，達下焦而入血分，故能除實熱燥結，下有形積滯。但年老久病及亡血之后大便秘結者，宜補血潤燥，切不可誤投大黃。

【用量】緩下一錢半——三錢，為泡浸劑其力尤勝。

宣黃連治冷熱之痢又厚腸胃而止瀉

【注解】黃連苦寒，所主皆熱郁濕積之症，如：暑熱泄瀉、下痢膿血，皆熱積于腸間，須以黃連之苦燥泄降以利導之；若冷熱錯雜之泄痢，更宜溫藥相助為治。至于厚腸胃之說，則不可拘。總之，此等寒降之品，慎勿過量；虛弱體質尤宜慎用。