

常用中药制剂与成药

上海第一医学院
附属第一医院药剂科編



上海科学技术出版社

88-4
15

內 容 提 要

本书內容分为二大部分。制剂部分，有煎剂、合剂、酏剂、搽剂、油剂、膏剂、膏药、散剂、丸剂、胶丸、片剂十一項，計 68 方，其中多秘傳效方及經驗良方；成药則是中医历代傳下来的成方，有丸剂、散剂、膏剂、胶剂、茶曲五項，选录 134 方；都是上海第一医学院附属第一医院所經常应用的。

本书每方下都載有药味、剂量、制法、适应、服法或用法等項，切于实用。其中适应一項，多記入該院中西医师密切配合而获得的临床疗效，尤属可貴。

本书可供临床医师、医院药剂科工作者及医药实习人員作参考。

常用中药制剂与成药

上海第一医学院附属第一医院药剂科 編

*

上海科学技术出版社出版

(上海瑞金二路 450 号)

上海市书刊出版业营业許可証出 093 号

新华书店上海发行所发行 各地新华书店經售

上海市印刷五厂印刷

*

开本 787×1092 1/44 印张 1 32/44 字数 45,000

1961 年 8 月第 1 版 1961 年 8 月第 1 次印刷

印数 1—10,000

統一书号：14119·1002

定 价：(八) 0.15 元

814
486

前 言

在全国各医疗单位积极贯彻党的中医政策，西医学习中医的热潮中，我院通过学习，自 1958 年 12 月份起，各科都广泛应用中医各种防治疾病的方法，因而中药的使用也大为增加。

二年来，我院药剂科在配制中药的实际操作中，学到了不少有关中药方面的知识 and 经验。并了解中医治病虽以辨证论治，应用汤剂为主，但也常用制剂和成药。又鉴于初学中医的西医在临诊时对选用中药，往往缺乏准则。因此，我院药剂科认为有必要把常用的中药各种剂型汇编成册，供使用和配制中药的同志作参考。本册内容包括制剂和成药二个部分，均以剂型分类，一个剂型内如有内服、外用二类，则编排时均以内服为先，外用居后，方名则按笔划多少为序。

中药制剂，有中药剂型的丸散膏丹，也有西药剂型的酏剂、合剂、片剂等。为了配合临床需要，保证质量，供应及时，所用药剂皆由我院药剂科自行配制，已制成一百余种。方剂来源，有些是本院中医师的秘方；有些是前人或其他单位的验方；也有些是在本院应用过程中，作了某些修改的处方。现只将疗效比较显著的六十八种编入册内，为了便于查阅，将中西药剂型统一分类。

中药成药有各种丸散膏丹等，都是根据历代经验良方配成。由于流传已久，各家所述不一，因此不仅品种繁

多，且往往一方數名，或同一方名而組成成分不同，這給初學者在選用時帶來不少困難。為此，整理成藥部分，使之適合於臨床應用，是必要的。

本書所收的成藥，計一百三十四方，多系本院中醫師們常用的品種。現在市上成藥冊子雖多，各具特點，但往往常用品種或適應、服法部分不全。為了臨床醫師查閱方便起見，我們認為应当在每一成藥後加列適應症、服法（或用法）和一般劑量等。我們曾參考了許多文獻，並請我院中醫師蘇讀賢、鄧家祿等根據臨床經驗，做了必要的補充和修改。

我院廣泛應用中藥的時間尚短，配製藥劑的經驗也不多，就這樣編寫此冊，未免過早。但鑑於實際需要，故敢於此時匆促付印。內容不夠豐富是本冊缺點之一，其中欠妥甚或錯誤之處，亦所難免，希國內醫藥部門的前輩和同志們批評指教。

上海第一醫學院附屬第一醫院 李鴻儒

1960年12月

目 录

制 剂 部 分

煎 剂

止咳煎剂..... 1

馬齿莧煎剂..... 1

黃連煎剂..... 2

合 剂

复方止咳合剂..... 2

酊 剂

北五味子酊..... 2

土槿皮酊..... 3

朴骨脂酊..... 3

神經性皮炎酊..... 3

搽 剂

铁精搽剂..... 4

油 剂

玉糊浆..... 4

黃連油..... 5

碧玉油..... 5

膏 剂

慢性腎炎膏..... 5

三圣散糊膏..... 7

天南星糊膏..... 7

五石散糊膏..... 7

水晶膏..... 8

生肌玉紅膏..... 8

青蛤散糊膏..... 9

青黛軟膏..... 9

和营散膏..... 9

消瘀散糊膏..... 10

速愈濕疹膏..... 10

黃連潤肌膏..... 10

黃蜡冻疮药膏..... 11

瘋油膏..... 11

蓉浮軟膏..... 12

膏 药

丁桂散膏药..... 12

万通散膏药..... 12

平安散膏药..... 13

胃灵散膏药..... 13

散 剂

心脏病甲散	13
心脏病乙散	14
心脏病丙散	14
和营吉利散	15
預防麻疹散	15
續骨定痛散	15
二宝丹	16
九一丹	16
九轉散	16
去腐散	16
生肌八宝丹	17
生肌散	17
青宝散	17
青黛散	18
青露散	18
和营散	18
苯佐卡因去腐散	19
复方三七散	19
舒筋活血散	19
瘰癧散	19

丸 剂

大造丸	20
巴漆丸	20
定喘丸	21
青龙丸	21
砒矾丸	21
复方羊躑丸	22
复方治糜丸	22
黑大豆丸	22

胶 丸

白銀胶丸	23
乳沒胶丸	23

片 剂

三效片	23
小蘗片	24
止血片	24
半夏片	24
百合片	25
补肝片	25
舒肝片	25

成药部分

丸 剂

二至丸	27
二味黑錫丹	27

二陈丸	27
十灰丸	28
十全大补丸	28

十枣丸·····	28	玉屏风丸·····	38
七味都气丸·····	29	玉液金丹·····	38
八仙长寿丸·····	29	甘露消毒丹·····	39
八珍丸·····	29	左金丸·····	39
人参再造丸·····	29	龙胆泻肝丸·····	39
人参养荣丸·····	30	四君子丸·····	40
九制香附丸·····	31	戊己丸·····	40
三才封髓丸·····	31	白金丸·····	40
三封伐木丸·····	31	羊肝丸·····	40
三层茴香丸·····	31	耳聾左慈丸·····	41
大补阴丸·····	32	当归龙薈丸·····	41
大活絡丹·····	32	朱砂安神丸·····	41
小金丹·····	33	舟車丸·····	42
小儿回春丹·····	33	全鹿丸·····	42
小活絡丹·····	34	补中益气丸·····	43
六君子丸·····	34	补虚威喜丸·····	43
六味地黄丸·····	34	局方黑錫丹·····	43
六神丸·····	34	局方醒消丸·····	44
天王补心丹·····	35	杞菊地黄丸·····	44
木香檳榔丸·····	35	芋苳丸·····	44
太乙紫金錠(玉樞丹)·····	36	河車大造丸·····	44
内消瘰癧丸·····	36	附子理中丸·····	45
止痛良附丸·····	36	附桂八味丸·····	45
牛黄至宝丹·····	37	明目地黄丸·····	45
半貝丸·····	37	知柏八味丸·····	46
宁嗽丸·····	37	金匱肾气丸·····	46
归芍地黄丸·····	38	金匱鳖甲煎丸·····	46

金鎖固精丸	47
參苓白朮丸	47
濟生歸脾丸	47
濟生橘核丸	48
枳朮丸	48
枳實導滯丸	48
柏子養心丸	49
指迷茯苓丸	49
香砂六君丸	49
香砂枳朮丸	50
香連丸	50
保和丸	50
消痞阿魏丸	50
桑麻丸	51
鉄笛丸	51
脏連丸	51
清肝保腦丸	52
清濕二妙丸	52
控涎丹	52
逍遙丸	52
健步虎潛丸	53
越鞠丸	53
黃連阿膠丸	53
犀黃醒消丸	54
脾約麻仁丸	54
絳矾丸	54
磁朱丸	55

癰症鎖心丸	55
縮泉丸	55
礞石滾痰丸	55
藿香正氣丸	56
鸕鶿涎丸	56
散 劑	
川芎茶調散	56
六一散	57
傷科七厘散	57
鷄蘇散	57
益元散	57
碧玉散	58
黛蛤散	58
冰硼散	58
如意金黃散	58
青黛散	58
金鎖玉匙散	59
砒棗散	59
珠黃散	59
錫類散	59
膏劑、膠劑	
二仙膠	60
十全大補膏	60
天麥二冬膏	60
驢皮膠	61
龜版膠	61
兩儀膏	61

枇杷叶膏	61
虎骨胶	61
狗肾胶	62
益母膏	62
夏枯草膏	62
桑椹膏	62
党参膏	63
鹿角胶	63
雪梨膏	63
琼玉膏	63
黄芪膏	63
饴天胶	64

膳仙琼玉膏	64
鳖甲胶	64
阳和膏	64
宝珍膏	65
消痞狗皮膏	65
礞砂膏	66
茶 曲	
午时茶	66
六神曲	66
沉香曲	67
采芸曲	67
建神曲	68

制剂部分

煎 剂

止咳煎剂

【处方】 生半夏三錢，百部二錢，天将壳三只，款冬花三錢，南天竹二錢，麦冬三錢。

【制法】 取上药 30 剂，加水 6,000 毫升，煮沸半小时后，压榨过滤，得滤液(1)。再将残渣加水 3,000 毫升，煮沸半小时后，压榨过滤，得滤液(2)。将二次滤液合并，濃縮至 2,700 毫升，再加单糖浆 300 毫升，使全量成 3,000 毫升(即每剂为 100 毫升)。

【适应】 慢性咳嗽。

【服法】 每日一剂(100 毫升)，分二次服。

馬齿莧煎剂

【处方】 馬齿莧 2,000 克，水适量。

【制法】 1. 以干馬齿莧 2,000 克，加水 7 倍(14,000 毫升)，煮沸一小时，然后压榨过滤。
2. 残渣再用水 7,000 毫升，煮沸一小时，压榨过滤。前后两次滤液合并，直火濃縮至 2,000 毫升，加万分之四尼泊金为防腐剂。

【适应】 治菌痢及抗感染。

【服法】 內服每日三次，每次 20~40 毫升。

黃連煎劑

【處方】黃連 10 克，水適量。

【制法】黃連加水 300 毫升，煎煮半小時，用棉花過濾。
殘渣再用水 150~200 毫升，煮沸半小時過濾。
將先後濾液濃縮至 100 毫升即得。

【適應】洗滌創口，有抗菌作用。

【用法】洗滌患處。

合 劑

復方止咳合劑

【處方】遠志流浸膏 20.0 毫升，桔梗流浸膏 45.0 毫升，
百部流浸膏 35.0 毫升，甘草流浸膏 100.0 毫
升，鹽酸麻黃素 0.4 克，苯甲酸钠 1.0 克，50%
薄荷醇 0.2 毫升，氯化銨 20.0 克，糖精鈉 0.6
克，糖漿 200.0 毫升，水加至 1,000 毫升。

【制法】先將鹽酸麻黃素、苯甲酸钠、氯化銨、糖精鈉用
適量水溶解，加入各種流浸膏及糖漿混和，再加
薄荷醇攪勻，最後加水至 1,000 毫升即得。

【適應】咳嗽。

【服法】每日三至四次，每次 10 毫升。

酏 劑

北五味子酏

【處方】北五味子粉 40 克，50% 醇加至 100 毫升。

【制法】 北五味子去夹杂物，烘干，取 40 克磨碎，以 50% 醇 60 毫升浸于密闭容器内，经常振摇，浸渍日久较好。渗漉过滤，加适量醇使成全量即得。

【适应】 神经衰弱。

【服法】 每日服三次，每次服 2.0~2.5 毫升。

土槿皮酊

【处方】 土槿皮粉 200 克，水 350 毫升，醇加至 1,000 毫升。

【制法】 以土槿皮粉加醇 400 毫升，浸渍三四天，渗漉。渗出后，残渣用醇 200 毫升再渗漉。渗出后，残渣用醇 120 毫升及水 30 毫升之混合液再渗漉。另用压榨机将土槿皮残渣中之醇液压出过滤。先后四次滤液合并，加水 320 毫升及适量醇使成全量即得。

【适应】 治癣及神经性皮炎。

【用法】 外搽。

补骨脂酊

【处方】 补骨脂粉 30 克，60% 醇加至 100 毫升。

【制法】 将补骨脂粉浸于 60% 醇中约十天，取出过滤，轻轻压榨，约可得滤液 80 毫升。

【适应】 白癜风。

【用法】 搽白斑处，每日一至二次。

神经性皮炎酊

【处方】 斑蝥粉 54 克，蜈蚣粉 80 克，土槿皮粉 3,500

克，樟脑 120 克，薄荷 30 克，冰醋酸 400 毫升，水 5,000 毫升，醇 15,000 毫升。

【制法】 将冰醋酸与醇混合，加入斑蝥粉及蜈蚣粉，浸渍一小时。再加土槿皮粉，不时搅拌，浸一周后渗滤之。渗液加樟脑与薄荷，待溶解后过滤，得澄清液。另用压榨机将残渣压榨，榨出液过滤，滤液与上述母液合并，再加水搅匀即得。

【适应】 神经性皮炎。

【用法】 外搽。

搽 剂

铁精搽剂

【处方】 石硫黄三两，附子(去皮)一两，铁精一两，米醋加至十两。

【制法】 前三味研细混匀，用米醋浸七天后，即可使用。

【适应】 白癜风。

【用法】 外搽，用前摇匀。

油 剂

玉糊浆

【处方】 石灰水，麻油各等分。

【制法】 以生石灰放入水中溶解，取其澄清液，再行过滤，滤液密闭储存。临用时加麻油等分，边加边搅拌至成米泔样为止。

【适应】 适用于 I，II 度烧伤、烫伤。

【用法】 外敷伤处。

黄 連 油

【处方】 黃連一两，蓖麻油三两。

【制法】 將黃連研成細末，用蓖麻油逐漸加入調和即得。

【适应】 消炎，退肿，治湿疹等。

【用法】 外搽。

碧 玉 油

【处方】 川柏三两，紅枣(煨)三两，生油六两。

【制法】 前二药共研細末，用生油調勻即得。

【适应】 湿疹。

【用法】 外搽。

膏 剂

慢性腎炎膏(貴阳卢老太太秘方)

【处方】 黑白丑各二两一錢，紅糖四两，老姜一斤，大棗二两。

【制法】 1. 黑白丑經選擇后，炒熟至有爆裂声（炒至裂开），此时白丑由白色变为土紅色，黑丑由黑色轉为灰黑色，切开黑白丑，中心均为黃色。
2. 將炒熟的黑白丑趁热研成細粉，过篩。由于黑白丑系含脂性，必要时再炒再研再篩。
3. 另將紅糖四两研細。
4. 老姜一斤洗淨，去皮，再洗，搗碎，用紗布挤出姜汁。

5. 將大棗洗淨，用大針將棗穿幾個空洞後，放在冷水中浸泡約半小時。再煮熟，去棗皮及棗核，然後將棗肉搗成糊泥狀。

6. 將研細的紅糖，棗泥，黑白丑粉加入姜汁中，調成稠糊狀，然後用蒸籠煮熟，約需一小時，在蒸的過程中，要予以攪勻，即成黑褐色膏狀。也可于干後製成丸劑。

【適應】 慢性腎炎；胃腸道功能紊亂（寒濕積等）；老年人便秘。

【服法】 上方一劑，分成等分，每日二至三次，于二日半內服完。晨六時服藥，八時進食；中午十二時服藥，下午二時進食；六時服藥，八時進食。

【附注】 1. 製藥的分量如下：

(1) 黑白丑四兩二錢，碾成最後細粉淨重約三兩二錢。

(2) 大棗二兩，煮熟，搗成棗泥約三兩五錢。

(3) 老姜一斤，擠出姜汁約 280 毫升。

2. 服藥一劑後，水腫即可消退。如腫退不淨，可適當加服半劑至一劑。

3. 飲食方面，宜忌油鹽三個月。

(1) 十天內僅可吃米、面、紅糖、蔥根和芝麻，但可多樣化以調味。

(2) 十天後可吃蚕豆、洋芋（煮熟去皮）、番茄、紅棗煮糯米稀飯。

(3) 一月後加食白菜、熟菜、棗、蘿卜、玉米。

(4) 四十天後加吃白糖。

(5) 八十天後可加食秋石。

(6)一百天后可吃熟盐，再十天后可吃生盐、鸡蛋。

(7)一百二十天后不必忌食。

三圣散糊膏

【处方】 芙蓉叶 900 克，赤豆 300 克，淀粉 100 克，蒸馏水适量，飴糖适量。

【制法】 上药研成细末，和匀。先以蒸馏水湿润，继加飴糖，调至适当稠度。

【适应】 应用于伤骨科退肿消炎及丹毒等。

【用法】 涂于布或纸上敷用。

【附注】 按上述三圣散的比例，约用蒸馏水 2,100 毫升及飴糖 2 斤。

天南星糊膏

【处方】 天南星细粉 50 克，甘油 10 毫升，4% 醋酸溶液加至 100 毫升，香精适量。

【制法】 将生天南星去皮晒干，研成极细粉末，称取 50 克，加甘油 10 毫升搅和。另将冰醋酸 4 毫升，加水至 100 毫升，搅匀，取适量（约 70 毫升）加入上药内，边加边搅，至成浓厚之糊膏。最后加香精适量。

【适应】 治青年期扁平疣。

【用法】 外敷。

五石散糊膏

【处方】 制甘石二两，煅石膏四钱半，枯矾二钱，东丹三

錢，輕粉一錢，生油二兩。

【制法】 上药研成細粉，用生油調勻即得。

【适应】 濕疹。

【用法】 外敷。

水晶膏

【处方】 熟石灰 19 克，糯米 3 克，面碱飽和液 100 毫升。

【制法】 面碱用开水飽和溶解(約成 25% 溶液)，加熱石灰，搗勻，用一层紗布過濾，濾液傾入一搪瓷盤內，然后将糯米撒于溶液中，以不重疊为宜，放置过夜，攪爛成透明糊狀物。

【适应】 鸡眼及掌蹠疣。

【用法】 先将患处消毒，后用小刀割去角质层，涂上水晶膏，稍干，再用橡皮膏貼上。周圍皮肤应先貼橡皮膏保护。

生肌玉紅膏

【处方】 白芷五錢，归身二兩，甘草一两二錢，紫草二錢，血竭四錢，輕粉四錢，白蜡一两，麻油一斤。

【制法】 先将白芷、归身、甘草、紫草四味，入麻油內浸三日，大勺內慢火熬微枯色，紗布濾清。將油复入勺內煎，傾入血竭，頻頻攪拌至血竭化尽为止。次下白蜡，微火化尽之，攪拌至成半固体狀，再加入輕粉，調勻即得。

【适应】 祛腐生肌收口。

【用法】 外敷。

【附注】 白蜡用量視天气冷热而增减。