



周 德 尚 编 写

进口药品手册

江西科学技术出版社

进口药品手册

周德尚 编写

江西科学技术出版社出版

(南昌市第四通路铁道东路)

江西省新华书店发行 南昌市印刷九厂印刷

开本787×1092 1/32 印张7.125 字数16.6万

1986年3月第1版 1986年3月第1次印刷

印数: 1—7,950

统一书号: 14425·12 定价: 0.96元

前 言

为了学习国外的先进技术，使之为我国人民防病治病服务，国家医药部门根据我国的具体情况，有选择地从日、美、英、法、德、瑞等国家以及香港地区进口了一些医用药品。可是，目前我国尚无一本较系统地介绍这类药品的书籍。编写这本手册，旨在给临床医师、药师、护士、医疗保健专业人员工作中参考。

本书精选出一百九十余种经临床验证，疗效确切的进口药品，并根据有关资料，对药品的名称、成分与作用、适应症、用法与用量、副作用、注意事项、贮存与规格等作了较详细的说明。

本书也是广大人民群众了解进口药品的一个知识窗口，为他们的防病治病，医疗保健提供可参考的资料。

由于编者水平有限，书中难免有不妥之处，希望广大读者提出宝贵意见。

本书在编写过程中，曾得到江西医学院第二附属医院药剂科潘玉如副主任和江西省医药贸易中心有关同志的大力支持，特此致谢。

编 者

一九八五年五月

目 录

一、抗抑郁药物

安拿芬尼..... (1)

路滴美..... (3)

二、镇静、安定、催眠药物

多利丹..... (6)

阿达林..... (7)

芬那露..... (7)

脑疗德..... (8)

环己烯巴比妥..... (9)

庚巴比妥..... (9)

甲哌氯丙嗪..... (10)

三、抗风湿、镇痛药物

拔怒风..... (13)

瑞培林..... (14)

灵加消..... (15)

费定..... (16)

痛热宁..... (17)

服他灵..... (17)

长效服他灵..... (19)

格里发那..... (20)

头痛丸..... (21)

优洛芬..... (21)

四、抗感冒、镇咳、平喘药物

咳快好	(22)
确理得	(22)
必嗽平	(23)
福录达明	(24)
确理得糖浆	(25)
克喘片／糖浆	(25)
苯噻片	(26)
阿斯维林	(28)

五、抗癫痫、精神病药物

痛可灵	(29)
叉癔宁	(30)
耐闷片／浓缩糖浆	(32)
神宁健	(33)
康维脑	(33)
哌棕酯	(34)
氯硝安定	(35)
欧司旁特	(35)
氟斯必灵	(36)
氯氮平	(37)

六、抗帕金森氏病药物

美多巴	(39)
森那特	(40)

七、中枢兴奋药物

利他林	(41)
美可灵	(42)

八、治溃疡病药物

达力康	(44)
-----	--------

安胃灵.....	(44)
乐得胃.....	(45)
服止宁.....	(46)
胃格乐.....	(47)
胃必治.....	(47)
正露丸.....	(48)
甲氰咪胍.....	(49)
蒙胃顿.....	(50)
太田胃片.....	(50)

九、治肝脏疾病药物

利肝素.....	(52)
肝托福仙LC	(52)
肝得治.....	(54)
治肝丸.....	(55)
复方保肝宁.....	(55)

十、血管扩张药及治心绞痛、抗心律失常药物

茚满西定.....	(57)
脉安定.....	(57)
利他脉.....	(58)
康格多.....	(59)
双苯苄胺.....	(59)
利其丁.....	(60)
护心贴片.....	(62)
乐彼素.....	(63)
缓律灵.....	(65)
异搏定.....	(65)
立格宁.....	(66)

心得静.....	(67)
潘生丁.....	(69)
心可定.....	(70)
可劳地.....	(71)
礼顿片.....	(71)
吗导敏.....	(72)
尼托罗.....	(73)
乙胺碘肤酮.....	(74)
慢心律.....	(75)
心得平.....	(76)
救心丸.....	(78)

十一 抗高血压、动脉硬化及降血脂药物

脉宁平.....	(79)
爱达芬.....	(80)
爱达芬·溢水驱.....	(81)
阿普利灵素.....	(82)
海固通—利血平.....	(83)
硝普钠.....	(84)
心得神.....	(86)
长效心得舒.....	(87)
喷他明.....	(88)
海特琴.....	(89)
爱道美.....	(91)
血脉宁.....	(92)
肉桂嗪.....	(92)
地洛特.....	(93)
长春胺.....	(94)

哈利多·····	(95)
脉通·····	(96)
纤维素溶解酵素剂·····	(96)
科利通脉·····	(97)
安妥明·····	(98)
稳脂胶囊·····	(99)
十二、利胆药物	
利胆素·····	(101)
利胆丸·····	(101)
十三、静脉营养剂和蛋白质补充药物	
18种氨基酸·····	(103)
25%正常人体血清白蛋白·····	(104)
人体丙种球蛋白·····	(108)
十四、泌尿系统药物	
消石素·····	(113)
消石灵·····	(113)
治平霉素·····	(114)
尿菌敌·····	(115)
普乐利·····	(116)
十五、抗过敏药物(抗组织胺药物)	
敌胺·····	(118)
抗敏胺·····	(119)
十六、抗结核、麻风病药物	
利福平·····	(121)
理本灵·····	(123)
十七、抗生素药物	
先锋必素·····	(125)

先锋霉素Ⅰ号	(127)
先锋霉素Ⅱ号	(128)
先锋霉素6号	(130)
先锋霉素7号	(131)
先锋唑啉	(133)
先锋呋肟	(134)
先锋羟苄唑	(135)
先锋美吩	(136)
羧苄青霉素钠	(138)
维多灵—S	(139)
氯唑西林	(140)
氨苄青霉素	(141)
卡达西林	(144)
氧哌嗪青霉素	(146)
呋脲苄青霉素	(147)
交沙霉素	(149)
磷霉素	(149)
美地加霉素	(151)
硫酸威斯他霉素	(152)
硫酸多粘菌素E	(153)
两性霉素B	(153)
氟胞嘧啶	(155)
硫酸多粘菌素B	(155)
妥布霉素	(157)
伟霸霉素	(159)
利福霉素SV	(160)
白霉素	(162)

乙酰螺旋霉素	(163)
十八、抗肿瘤药物	
“罗氏”疗治癌	(165)
顺式铂	(166)
丝裂霉素C	(167)
盐酸正定霉素	(169)
阿霉素	(170)
马尔法兰	(171)
抑乳癌	(172)
解肾腺瘤	(172)
依木兰	(173)
马兜铃酸	(174)
6-巯基嘌呤	(175)
十九、抗衰老药物	
“美达”维他命H ₃	(176)
防老丸	(177)
二十、凝血药物	
速血凝M	(179)
凝血质	(180)
二十一、抗凝血药物	
肝素	(181)
尿激酶	(182)
抗栓丸	(183)
二十二、降低血糖药物	
特泌胰	(185)
达安疗	(186)
克糖利	(187)

二十三、胃肠与血管解痉药物

新握克丁 (189)

握克丁D (190)

二十四、诊断用药

碘丙酯 (192)

代马克司 (193)

阿米配克 (193)

必洛波定 (194)

胆影葡胺 (195)

泛影葡胺 (196)

二十五、眼科用药物

地灵确超眼/耳悬液 (198)

眼圣眼药水 (198)

卡他林眼药水 (199)

谷胱甘肽眼药水 (199)

法可灵眼药水 (200)

嚟吗心安眼药水 (200)

杜米林眼药水 (201)

二十六、皮肤科用药物

优力斯—氢化可的松霜 (202)

乐沙灵 (202)

乐家美 (203)

外文索引 (205)

一、抗抑郁药物

【药物名称】安拿芬尼 (Anafranil)

【成分与作用】本品对抑郁症候群有综合性影响效能，对精神动态迟钝和存在性忧虑有特别作用。

【适应症】

1. 隐蔽性抑郁。
2. 内向性抑郁 (如阵发性和单纯性忧虑病、退化性抑郁) 。
3. 精神性抑郁 (神经性和反应性抑郁) 。
4. 功能性抑郁。
5. 精神分裂性或个性性格不良性抑郁。
6. 老年慢性病引起的抑郁。
7. 儿童脾气不良引起的抑郁。
8. 强迫观念及强迫行为症候群、恐怖症、慢性疼痛、夜尿 (如功能正常，5岁起仍遗尿者) 。

【用量与用法】

1. 口服：治疗开始时，每日1—2次，每次服10—20毫克。一星期后每日剂量逐渐提高至40—60毫克。较严重者，可适当增加用量。病况有显著好转时，改用维持量，通常为每日20—40毫克，分2次服。

2. 肌肉注射：治疗开始时，每日1—2次，每次25毫克，以后每日增加25毫克，直至病人每日用量为100—150毫克。见疗效后，逐步减少注射次数，转服片剂。

3. 静脉注射：每日1次，每次50毫克，加入5%葡萄糖注射液或灭菌生理盐水250—500毫升中，彻底混和，作静脉滴注。输液速度控制在每分钟40—60滴。应在上午给药。一般一星期内即有显著疗效。输液疗法结束后，应转用口服片剂。

老年病人：开始治疗时，每日服10毫克，在10天内逐步增加至每日30—50毫克，然后维持此用量，直至治疗终止。

儿童及少年：开始治疗时，每日服10毫克，10天内按不同年龄增加其每日剂量。5—8岁，增加至每日服20毫克。

8—14岁，增加至每日服20—50毫克。14岁以上每日服50毫克。

【副作用】治疗开始时，会引起一般自主神经反应，如出汗、口干、轻微震颤、眩晕、视觉不清或小便困难、体位性低血压等。当继续服本剂数天或用量减少后，这些症状会逐渐消失。

【注意事项】

1. 治疗期间不宜饮酒。

2. 静脉输液前，应测量血压。老年患者使用本剂前应作心电图检查，以观察心脏功能。

3. 驾驶员及怀孕首三个月妇女慎用。

4. 有惊厥倾向者（如癫痫、脑外伤）、心功能衰竭及心肌传导功能不良、小便困难（如患前列腺炎）者相对禁忌。

5. 5岁以上儿童及少年才可用本药治疗夜尿症。

【贮存与规格】

1. 片剂：25毫克，30片、200片、1000片装；10毫克，10片、30片、200片、1000片装。

2. 针剂：25毫克，2毫升×10支、2毫升×50支装。
密闭、避光保存。

【药品制造国】瑞士

【药物名称】路滴美 (Ludiomil)

【成分与作用】本品所含活素是一种新型的激发精神的化合物，即二丙苯二环辛二烯类化合物。用于抗抑郁或情绪不良症，作用迅速。睡眠不良者在第一天服后即见疗效。本品最适合于门诊病人使用。

【适应症】

1. 内向性抑郁。
2. 迟发性抑郁（衰退性抑郁）。
3. 定期及周期性抑郁。
4. 精神性抑郁（反应性及神经性抑郁）。
5. 身躯性抑郁（功能及症状性抑郁）。
6. 隐蔽性抑郁。
7. 绝经期抑郁。
8. 其它情绪不正常。
9. 以忧虑、烦躁不安、易怒为特征的情绪不良，特别是老年患者的精神淡漠状态。
10. 儿童及青少年精神性抑郁。

【用量与用法】

1. 非住院抑郁病人在开始治疗数星期内，每日3次，每次口服25毫克，或每日1次，每次口服75毫克，用量可根据临床病情需要作增减。当症状消失后，改用维持量，每日1次，每次口服25毫克。宜睡前服。

2. 严重性抑郁在开始治疗数星期内，每日口服50—150毫克，睡前服，用量可根据临床病情需要作增减。当症状消失后，改用维持量，每晚口服25毫克。如病情反复，则恢复原治疗量。如病人对口服抗抑郁药不敏感，可改用静脉滴注，每次1—2安瓿（25—50毫克）混合于5%葡萄糖注射液或灭菌生理盐水250—500毫升中，作缓慢滴注，滴注速度控制在每分钟40—60滴。需较大剂量时，如每次剂量75—150毫克，可混合于5%葡萄糖注射液或灭菌生理盐水500毫升中静脉缓慢滴注，滴速控制在每分钟45—60滴。通常经两星期治疗后，有显著疗效。两周后仍需继续治疗者，改用口服治疗。

3. 情绪不正常的老年病人、儿童在开始治疗时，每日1—2次，每次口服10毫克，亦可酌情逐渐增加至每日3次，每次口服10—25毫克。理想的用量是根据临床病情作增减。给药的方法，可采取增加晚上服量，减少日间服量，亦可作单剂每日1次服用。

【副作用】偶有一过性眩晕。常见口干、疲倦、药疹等，但一般不需停药。罕见低血压、心动过速、房室传导阻滞及回逆性T波。

【注意事项】

1. 严重肝、肾损害，白内障，前列腺炎患者慎用。
2. 需保持高度警觉职业者及怀孕首三个月孕妇慎用。
3. 老年患者治疗期间，应观察心脏功能，必要时，作心电图检查。体位性低血压者，应定期测量血压。
4. 本剂可减少或消除肾上腺素导激性阻滞剂的降压作用。若病人需要治疗高血压，应加服其他抗高血压药。
5. 本剂不宜与单胺氧化酶阻滞剂（MAO）合用。如

病人在服MAO 阻滞剂，应停用半个月后，才可服用路滴美。

6. 本剂与去甲肾上腺素或盐酸肾上腺素合用，可加强其对心血管的功效。

【贮存与规格】

1. 片剂：10毫克，50片、500片装。25毫克，30片、100片、1000片装。50毫克，30片、100片、1000片装。

75毫克，20片、100片、500片装。

2. 滴剂：浓度2%（1毫升溶液相等于20滴）50毫升，10支、100支装。

3. 针剂：每1毫升含25毫克，5支、50支装。

室温、密闭、避光、阴暗处保存。

【药品制造国】瑞士

二、镇静、安定、催眠药

【药物名称】多利丹 (Doriden)

【成分与作用】本品临床作用迅速，其安眠作用持续睡眠6—8小时。在治疗用量下，不会引起过度不良症状，催眠前期无兴奋作用，为治疗患脑血管硬化病人之良药。本品口服后，主要经肾脏代谢为非活性及无毒物质。

【适应症】主要治疗失眠症。

【用量与用法】

1. 成人：临睡前15—30分钟服1片，严重失眠可服2片。

2. 儿童：6岁以下儿童服1/2片，7—14岁儿童服1片。

【注意事项】

1. 本品不宜长期服用，滥用本药对一般患者不利。
2. 服药期间，不宜饮酒，因酒精能增进本剂的安眠作用。
3. 药物过量的解毒方法与其它安眠药的解毒方法相同。

【贮存与规格】片剂：250毫克，20片、100片装。
室温、密闭、避光、凉暗处保存。

【药品制造国】瑞士