

甘肅中藥手冊

甘肅省衛生廳編

甘肅中藥手冊

甘肅省衛生廳編

*

甘肅人民出版社出版

(蘭州市白銀路)

甘肅省書刊出版營業許可證出字第001号

甘肅日報社印刷印刷

甘肅省新華書店發行

*

開本:787×1092公厘1/22•3印張•70,000

1959年6月第一版 1959年6月第一次印刷

印數:1—6,085

*

統一書号:T14096•10

定 价:(3)0.37元

R2
11

前 言

在党的医藥衛生政策的光輝照耀下，~~中藥材的生產~~、經營工作有了極大的發展。為了繼承祖國醫藥遺產，開采自然寶藏，擴大經營品種，摸清省內藥材資源，統一商品規格，總結采集、加工經驗，鑑別品質優劣和為醫藥科學研究提供豐富資料，更好地為廣大人民群眾服務，近幾年來，在黨的領導下，我們曾多次組織藥材調查隊，深入藥材富饒的岷山山脈和著名的麥積山，以及白龍江、洮河流域地區，做了一系列的資源勘查工作，取得了一定的成績。

中藥材遍布我省遼闊的土地上，其產品之多，產量之大，居全國重要地位，尤以岷縣的當歸、鎡水的大黃、文縣的黨參，還有黃（紅）蓍、甘草、秦艽、羌活等均享有較高的國際聲譽。為使我省所產中藥材發揚光大，我們參考了本省有關歷史記載和資料，吸取了老藥農、藥工的寶貴經驗，經與實物標本核對後，編寫出“甘肅中藥手冊”，以供藥工人員學習參考。

由於我們經驗不多，水平有限，本書若有不妥之處，尚希讀者不吝賜教，以供再版時參考。

甘肅省衛生廳

1959年3月

內 容 提 要

本书是根据我区几年来药材资源的調查資料，結合广大农牧民的宝貴經驗，进行系統的整理編写成的。书中共收輯了中药材 264 种，包括植物药 213 种、动物药 41 种、矿物药 10 种。每种的品名、别名、蒙名以及来源、形态、产地、采收、加工、鉴别、用途、包装貯藏等都有具体、詳細的介紹。可供我区中药材生产和收购人員、中西药工作人員等学习参考之用。

前 言

内蒙古自治区地区辽阔，面积达140余万平方公里，约相当于全国总面积的七分之一。北接苏联和蒙古人民共和国；东靠黑龙江、吉林、辽宁三省；南连河北、山西、陕西三省及宁夏回族自治区；西南与甘肃省相接。区内有著名的大兴安岭森林、蒙古高原、鄂尔多斯高原。物产丰富，药材品种更是十分繁多，产量很大。

过去本区对于药材的利用很不够，有关药材的分布情况、形态、采收季节、加工方法、质量鉴别等知识，缺乏系统的整理与研究。因此对于药材生产进一步发展有一定的影响。

为了响应党和政府加强祖国医药的研究和整理的伟大号召，为了进一步开发内蒙古丰富的药材资源，促进药材生产，为我区以及全国人民身体健康服务，为社会主义建设事业大跃进服务，编写一本切合实际内容简明通俗的“内蒙古药材”是十分必要的。

根据中央的指示和群众的要求，我们从1959年9月开始编写这部稿子，在党的八届八中全会决议的号召和鼓舞下，依靠同志们的努力和有关单位的协作，只用二个月的时间就完成了。其中有植物药材213种，动物药41种，矿物药10种，共264种。为适合我区需要，每个品种都叙述了俗名、别名、来源形态、采收季节、产地、加工、鉴别、用途、包装贮藏等项，是一本适合于药材生产者使用的工具书。

初稿写完后，曾经内蒙古自治区卫生厅药政管理局、内蒙古中医研究所、呼和浩特市国药总店等单位经验丰富的老中医人员共同审稿，他们对此提出了很多宝贵的意见，特此表示感谢。

本书所列品种，基本上是根据三年来全区药用植物调查中所

目 錄

根及根莖類

大 黃	1	防 己	25
三 稜	3	防 風	26
山 藥	4	赤芍藥	27
天花粉	5	何首烏	28
天南星	6	岷貝母	29
天 麻	7	羌 活	31
木 通	8	知 母	32
半 夏	9	耳瑱石斛	33
玉 竹	10	獨 活	34
白鮮皮	11	青木香	35
甘 草	12	前 胡	36
甘 松	14	柴 胡	37
甘 遂	15	紅 薯	38
白 芷	16	威靈仙	39
白頭翁	16	狼 毒	40
白 芍	17	石菖蒲 (菖蒲)	41
白附子	19	商 陸	42
地 黃	20	秦 艽	43
地 榆	21	紫 草	45
合	22	黃 芩	46
	23	黃 薯	47
		黃 精	49
		當 歸	50

蒼朮	53	木瓜	75
党参	55	五味子	76
藁本	57	瓜蒌	77
鎖陽	58	萹蓄	78

莖叶及全草类

小薊	58	枳壳	81
大薊	59		
紫花地丁	60		

种子类

細辛	61	大麻仁	83
西茵陈	62	天仙子	83
通草	63	牛蒡子	84
麻黄	64	苦杏仁	85
透骨草	65	薤仁	86
荆芥	66	莱服子	87
胡蘆把	67	楮实子	87
紫苏	68	酸枣仁	88
澤蘭	69	郁李仁	89

花类

皮类

冬花	70	五加皮	90
忍冬花	71	丹皮	91
草紅花	72	杜仲	92
辛夷	73	秦皮	93

果实类

动物类

小茴香	74	五灵脂	94
-----	----	-----	----

五

西牛黃.....95 紫石英.....108

馬 寶.....96

鹿 茸.....97

豹 骨.....99

蟬 蛻.....100

刺猓皮.....101

蜂 蜜.....101

熊 胆.....102

麝 香.....105

礦物类

石 膏.....107

其他类

大 芸(肉蓯蓉).....109

五倍子.....110

冬虫夏草.....111

馬 勃.....111

銀 耳.....113

桑寄生.....114

猪 苓.....115

蒲 黃.....116


大 黃

產 地 本省大黃分家植和野生兩種，家植大黃分布于西禮、宕昌、龍登、文縣、華亭、岷縣、靜寧等地。野生大黃主要產區分布于武威、臨潭、德烏魯、永昌、古浪、天祝、臨夏、張掖等地，年產量約二百余万斤（產量數字系根據1957年藥材公司收購統計數），目前，家植地區正在繼續擴大种植面积。

產 季 大黃產季，概分为春秋兩季，但

春季挖大黃只限于野大黃，且地区亦不普遍，絕大多數是秋后挖掘。但無論家植和野生大黃一般均需在地下生長三年以上才能成長为根塊。如果年代不足，其品質低次，不能藥用。在春初挖大黃，应在莖叶尚未茂盛时，在秋后也应在莖叶衰落以后，否則，內心欠缺充實，而呈虛糠状态。

產地加工 藥農挖出大黃后，趁鮮去尽褐色粗栓皮，即可出售，但野生大黃多不去栓皮。收購單位將收到的鮮大黃，用繩穿成串，懸于屋檐下，使其透風变干。另一种



大 黃

1. 外形

2. 橫切面: a. 形成層, b. 韌皮部

c. 正常次生木質部

d. 髓 e. 星点。

方法是將鮮大黃勻攤在熏架上，下邊置以慢火（暗火，不顯焰），將其熏干，這種方法比較快些。干透的大黃就按自然形态分等，并用刀砍去稜角和根梢部分，放于木制的闊床內（每床可容二至三百斤），少加石渣，來回擺動，使其互相撞擊，變色澤為黃亮即為成品。如果加工箱大黃時，必須經人工砍制，使大黃均呈鷄蛋形或豎片狀，剔盡所有凹槽中的黑色，經過細致的闊磨，才合要求。

商品規格 大黃的商品規格：

1. 蛋吉大黃：系指個頭勻整形如鴨蛋者（多為人工砍制而成）。

2. 片吉大黃：系指將大黃切為豎形片者。

3. 中吉大黃：系指將長形大黃，橫切成段者。

4. 京吉大黃：系指較蛋吉大黃小而細長，砍去尖者（多用大黃根梢砍制）。

5. 蘇吉大黃：系指大黃根部，少加闊光，并具原形狀的楔狀形大黃。

6. 涼黃：系指祁連山所產不經任何加工程序的原皮大黃，形狀大小不一，均用毛繩成串。

7. 混包大黃：系指不單獨分開蛋、中、片、蘇吉的混裝大黃。其中包括蛋、中、片、蘇吉70%，水根黃30%。

8. 混裝箱大黃：系指砍工細致，經過几遍闊工的蛋、片、吉、混裝大黃。如果分等裝箱時，又以所裝的規格定名，如蛋吉箱黃、片吉箱黃等。

9. 庄浪大黃：系指產于庄浪等縣的家植大黃。未加工時形如棒杠，加工后如“子黃”。除上述規格外，尚有以產地划分規格的習慣，如以往將臨夏所產的大黃叫做“河州黃”；岷縣產者叫“岷黃”；文縣產者叫“文黃”；禮縣

產于銓水鎮者叫“銓水黃”等。

鑑別方法 無論何種規格的大黃，都以剝盡外皮，體質充實，個頭勻整，色澤黃亮，砸開後內碴具有紅白相間的硃砂點，似白粉上撒布紅色顆粒狀，無虛糠或鐵糠者為上品。此外“庄浪黃”雖然內碴很好，但紅色多於白色，略呈淡紫紅。外觀上有螺結紋，在應用時多限于牲畜用藥。“涼州大黃”外有粗皮，內剝極好，但產量很少，只供京津一帶配製成藥應用。

用 途 為苦味健胃藥及刺激性瀉下藥“傷寒論”中所列大小調胃承氣湯，均以此藥為主。大黃含有草酸成分，有收斂作用，因而能止瀉。

包 裝

1. 混包大黃：用麻布包裝，每件100斤，外扎麻繩，易于裝卸。

2. 箱大黃：用木箱裝，每件60斤，外扎麻繩。


三 稜

產 地 張掖，年產量1,500余斤。

產 季 春初未抽莖時挖出。

產地加工 砍去外皮，曬干即為成品。

商品規格 去盡外皮，色不暗灰，無土、



三 稜

1. 外形 2. 斷面

雜，无霉变者为合格。

鑑別方法 以色淡灰，質重，利口为灰白色，形小者为佳。

用 途 有通經、逐瘀、鎮痛等效用。

包 裝 用麻袋裝，每件100斤。

山 藥

產 地 山藥有山野自生和園圃种植二种。產于天水、兩当、徽成、武都及蘭州。年產量1万余斤。

產 季 產于秋后春前，于農曆臘月挖采为最好。


產地加工 采掘后，刮去外皮，搓实，晒干即可銷售。

商品規格 山藥有家野之分，家產多供食用，野產多供藥用。以条粗質重色白者为好貨，条細質輕色暗者次之。

鑑別方法 体肥粉多，色白无紫心者为佳品。加工后，好貨光滑无皺紋，次貨皺紋多少不等。

用 途 滴精止帶，理瀉，治痢，且为滋養強壯藥。

包 裝 用木箱裝。



山 藥


天 花 粉

產地俗名 瓜蒌根

產 地 榆中、天水、
徽成、兩當、西禮等縣。年產
量約4萬斤。

產 季 夏、秋兩季。

產地加工 采掘后，洗淨
泥土，用瓦片刮去外皮，曝日
晒干，撞白或用硫磺熏之。



天 花 粉

商品規格 天花粉以色白，肥大，質細，含粉質多，
無黃筋者為佳品；瘦小色黃，含粉質少，黃筋多不堅實，
外皮有皺紋者次之。其規格分夏貨和秋貨兩種，夏貨含粉
少，質次；秋貨含粉多，質佳。

天水專區產死瓜子根，形狀和皮色與天花粉一樣，但
粉質少，黃絲粗而多。

另外有一種苦瓜子根，形狀和顏色與天花粉相似，但
其剝口帶青色，粉質少，無黃絲不能入藥。

鑑別方法 个大、白色、剝口白色，具有黃色點狀物者
為佳品。

用 途 瀉火、潤肺、生津止渴。

包 裝 麻布包，外用繩捆，每包重160斤。

天南星

產地 岷縣、宕昌、龍巖、臨潭、西和、武都等地。年產量約7萬斤。

產季 八月為生產季節，春季未發芽前亦能挖掘，挖掘過時，其質就發生變化。


產地加工 挖出後，趁鮮撞去外皮，個大者切為兩大片，個小者（指干者，直徑約一寸。）不切，用細繩串聯後，掛于簷下，晒干後放入筐內，加石塊撞白即成。切勿上炕，否則裂口會變為紅色，如受凍也會變質。

商品規格 以個大約寸許，體肥去皮，色粉白者為上品，體瘦，色暗粉者次之。

鑑別方法 色白，扁圓，粉氣足者為佳。

用途 有毒。可散經絡風疾、治麻痺、祛痰、發汗、驅蟲等。

包裝 用麻袋裝，每件100斤。



天南星外形

1. 天南星塊外形

2. 天南星片外形

天 麻

產地俗名 独搖草，明天麻，定風草，神草。

產地 產于天水專区的兩当、徽成、天水、西礼、文縣、康縣、武都等縣。年產約1,800斤左右（天水）。

產季 初春、初冬为生產季節，天水專区因气候关系而產于五月至八、九月間。过季則成空心。

產地加工

1. 將天麻挖回后，摘去莖須，用稻壳擦去外皮，洗淨，放于沸水中煮至透心或用蒸籠蒸熟。蒸煮后，从中間切并，中心无白点为适宜。煮透取出后，放于日光下晒干，再用硫磺熏成白色。

2. 天水專区的加工方法：將挖回的鮮天麻用水洗淨，搓去外皮，再用淘米水煮透后撈出，晒到五、六成干时，用手捏实，在曝日下晒干，再用硫磺熏白。

商品規格 分为春麻、冬麻兩種（春季產者为春麻，質次。冬季產者为冬麻，質佳）。按个头分为貢毛、毛王、揀毛、原裝等四种。

貢毛：每个110克以上的为貢毛。

毛王：每个75克以上的为毛王。

揀毛：每个40克以上的为揀毛。

原裝：不分大小混裝的叫原裝。



鑑別方法 品質一般以个大、丰满、光澤明亮、外皮黃白色、有節狀点、內色潔白者为佳品。康乐天麻据鑑定，为上好天麻，武都一帶的羊角天麻，其質較次。

用 途 为治暈眩头痛的有效藥，亦可作为熄風、療風寒、湿痹及退热、鎮痛藥。

包 裝 可用麻袋木箱包裝。每件100斤。

木 通

產地俗名 万年藤，丁翁。

產 地 天水、徽成、兩当、西和、武都、文縣等。年產量14万斤。

產 季 產于八、九月間。

產地加工 收割后曝干，即可出售。但在曝干过程中，必須嚴格注意含湿性的自然發热，以防变色。

商品規格 以莖中有車輪紋，外皮白麻色，內色淡黃，粗約五、六分并均勻者为佳。过粗壯或太細者为次品。



木 通

鑑別方法

1. 和木通形狀相同者，有木防己。但防己皮粗，中間如通草形。木通皮細而无心（天水材料）。

2. 外皮黃褐如黃蓍，內剝为黃灰色，交錯分层的單輪紋，縱間有孔隙，直通兩端。

用 途 可行水瀉火，一般專做利尿藥。

包 裝 用麻繩捆扎，外包以麻布，每件80斤。

半 夏

產地俗名 麻芋子(天水)，
半子(礼縣)。土名三兴草，三
片叶，三开花，三角草，三不
跳。


產 地 为多年野生草本
植物，生于山野或田間近水湿陰
之地，產于天水、秦安、西礼、
清水、徽成、武都等縣。年產量
約为6万余斤。

產 季 四、五月間挖
采，產于天水專區者三月間亦可挖采。

產地加工 半夏產于夏季，四、五月間，自田間挖采，
挖出后洗淨泥土，用粗麻袋片撞去外皮，在曝日下晒干后，
即为生半夏。加工方法：先用涼水洗，每百斤放麻黃半斤，
甘草一斤，皂角半斤。泡的時間可按季節來決定，一般在
立夏左右为四至五天，泡透后把皮子撞淨，然后再用涼水
浸一下，就放入有石灰的缸內（每百斤半夏按其皮的厚薄
可放入四——八斤分化以后的生石灰）。先不要攪，三天攪
一次，泡制時間可按气候決定，夏天不超过四天，連石灰
帶半夏撈出放于蒲籃內，用麻袋盖嚴，待里面發熱，在曝
日下晒干后，連同石灰用麻袋盖嚴，搖撞簸淨后即可出售。

商品規格 分为蛋夏、揀夏、統夏三种。

1. 蛋夏：为顆粒圓熟半夏中之最大者。



半 夏