

高等学校教学参考书

高等数学讲义

下 册

樊映川等编

人民教育出版社

简装本说明

目前 850×1168 毫米规格纸张较少, 本书暂以 787×1092 毫米规格纸张印刷, 定价相应减少 20%。希鉴谅。

高等数学讲义

下 册

樊映川等编

人民教育出版社 (北京沙滩后街)

上海中华印刷厂印装

新华书店上海发行所发行

各地新华书店经售

统一书号 13012·068 开本 787×1092 1/32 印张 7 2/16

字数 189,000 1,323,001—1,823,000 定价 5(5) 0.56

1958年4月第1版 1964年10月第2版

1978年7月上海第30次印刷

本书原系根据高等教育部 1954 年颁布的高等工业学校高等数学教学大纲编写而成, 1964 年又根据高等工业学校高等数学课程教材编审委员会审订的《高等数学(基础部分)教学大纲(试行草案)》作了一些修订。

本书分上、下两册。下册内容包括级数, 富里哀级数, 多元函数的微分学和积分学, 微分方程等。

先后参加本书编写与修订的有: 樊映川、张国隆、陆振邦、侯希忠、方淑妹、王福楹、王福保、王嘉善、陈雄南等。

21059/17

下册目录

第二篇 数学分析(續)

第十章 級数.....1

I 常数項級数.....1

§ 10.1 无穷級数概念.....1

§ 10.2 无穷級数的基本性质 收敛的必要条件.....2

§ 10.3 正項級数 收敛性的 充分判定法.....5

§ 10.4 任意項級数 绝对收敛.....12

§ 10.5 广义积分的收敛性.....16

§ 10.6 Γ -函数.....22

II 函数項級数.....25

§ 10.7 函数項級数的一般概念.....25

§ 10.8 一致收敛及一致收敛 級数的基本性质.....27

III 幂級数.....32

§ 10.9 幂級数的收敛半径.....32

§ 10.10 幂級数的运算.....36

§ 10.11 泰勒級数.....39

§ 10.12 初等函数的展开式.....41

§ 10.13 泰勒級数在近似計算 上的应用.....47

§ 10.14 复变量的指数函数 尤 拉公式.....51

第十一章 富里哀級数.....54

§ 11.1 三角級数 三角函数 系的正交性.....54

§ 11.2 尤拉-富里哀公式.....55

§ 11.3 富里哀級数.....57

§ 11.4 偶函数及奇函数的富 里哀級数.....60

§ 11.5 函数展开为正弦或余 弦級数.....64

§ 11.6 任意区间上的富里哀 級数.....66

第十二章 多元函数的微分法及 其应用.....70

§ 12.1 一般概念.....70

§ 12.2 二元函数的极限及連 續性.....73

§ 12.3 偏导数.....76

§ 12.4 全增量及全微分.....79

§ 12.5 方向导数.....84

§ 12.6 复合函数的微分法.....86

§ 12.7 隐函数及其微分法.....90

§ 12.8 空間曲綫的切綫及法 平面.....93

§ 12.9 曲面的切平面及法綫.....95

§ 12.10 高阶偏导数.....97

§ 12.11 二元函数的泰勒公式.....101

§ 12.12 多元函数的极值.....103

§ 12.13 条件极值——拉格朗日 乘数法則.....109

第十三章 重积分.....113

§ 13.1 体积問題 二重积分.....113

§ 13.2 二重积分的简单性质 中值定理.....116

§ 13.3	二重积分算法	118
§ 13.4	利用极坐标计算二重 积分	123
§ 13.5	三重积分及其算法	127
§ 13.6	柱面坐标和球面坐标	131
§ 13.7	曲面的面积	135
§ 13.8	重积分在静力学中的 应用	138

第十四章 曲线积分及曲面

	积分	143
§ 14.1	对坐标的曲线积分	143
§ 14.2	对弧长的曲线积分	150
§ 14.3	格林公式	156
§ 14.4	曲线积分与路线无关 的条件	158
§ 14.5	曲面积分	163
§ 14.6	奥斯特罗格拉特斯基 公式	171

第十五章 微分方程

§ 15.1	一般概念	174
§ 15.2	变量可分离的微分方 程	179
§ 15.3	齐次微分方程	182
§ 15.4	一阶线性方程	187
§ 15.5	全微分方程	191
§ 15.6	高阶微分方程的几个 特殊类型	193
§ 15.7	线性微分方程解的结 构	201
§ 15.8	常系数齐次线性方程	205
§ 15.9	常系数非齐次线性方程	210
§ 15.10	尤拉方程	219
§ 15.11	幂级数解法举例	220
§ 15.12	常系数线性微分方程 组	224

第二篇 数学分析(續)

第十章 級数

I. 常数項級数

§ 10.1 无穷級数概念

設已給数列 $u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$, 則式子

$$u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots \quad (1)$$

或簡写为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$

叫做无穷級数, 或就叫做級数, 其中第 n 項 u_n 叫做級数的一般項.

作級数的前 n 項的和

$$s_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n,$$

可得到另一个数列:

$$s_1, s_2, \dots, s_n, \dots$$

根据这个数列有沒有极限, 我們可以引进无穷級数(1)的收斂或发散的概念.

定义 当 n 无限增大时, 若数列 s_n 趋近于一个极限(有限的):

$$s = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n,$$

就叫无穷級数(1)收斂, 这时极限值 s 叫做級数(1)的和, 并写成

$$s = u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots;$$

若 s_n 沒有极限, 就叫无穷級数(1)发散.

当无穷級数收斂时, 其前 n 項的和 s_n 是級数的和 s 的近似值, 它

們之間的差值

$$r_n = s - s_n = u_{n+1} + u_{n+2} + \dots$$

叫做級數的 n 項後的余項。用近似值 s_n 代替和 s 所產生的誤差是這個余項的絕對值，即誤差是 $|r_n|$ 。

最簡單的無窮級數之一是幾何級數：

$$a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots, \quad (2)$$

其中 r 叫做級數的公比。現在來考慮它的斂散性。

今若 $|r| \neq 1$ ，則

$$s_n = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} = \frac{a - ar^n}{1 - r} = \frac{a}{1 - r} - \frac{ar^n}{1 - r}.$$

當 $|r| < 1$ 時，由於 $\frac{ar^n}{1 - r} \rightarrow 0$ ，故 $s_n \rightarrow \frac{a}{1 - r}$ ，這時幾何級數收斂，其和為

$\frac{a}{1 - r}$ 。當 $|r| > 1$ 時，由於 $\frac{ar^n}{1 - r} \rightarrow \infty$ ，故 $s_n \rightarrow \infty$ ，因而幾何級數發散。當

$r = 1$ 時， $s_n = na \rightarrow \infty$ ，故級數發散。當 $r = -1$ 時，級數成為 $a - a + a - a + \dots$ ，顯見 s_n 隨 n 為奇數或為偶數而等於 a 或等於零，故極限不存在，從而級數發散。綜合上述結果，我們得到：若幾何級數之公比 r 的絕對值 $|r| < 1$ 時，則此級數收斂，若 $|r| \geq 1$ 時，則級數發散。

§ 10.2 無窮級數的基本性質 收斂的必要條件

1° 若級數

$$u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots \quad (1)$$

收斂於和 s ，則每項乘以一個不為零的常數 k 所得的級數

$$ku_1 + ku_2 + \dots + ku_n + \dots$$

收斂於和 ks 。

因為級數的前 n 項的和是

$$\sigma_n = ku_1 + ku_2 + \dots + ku_n = ks_n,$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \lim_{n \rightarrow \infty} ks_n = k \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = ks.$$

又若 s_n 沒有極限, σ_n 也不可能有極限. 所以級數的各項乘一不為零的常數後它的斂散性總是不變的.

2° 收斂級數可以逐項相加或逐項相減, 就是說, 若有兩收斂級數

$$u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots = s,$$

$$v_1 + v_2 + \cdots + v_n + \cdots = \sigma,$$

則級數 $(u_1 \pm v_1) + (u_2 \pm v_2) + \cdots + (u_n \pm v_n) + \cdots$

必收斂於和 $s \pm \sigma$.

這是因為最後一個級數的前 n 項的和

$$\begin{aligned} & (u_1 \pm v_1) + (u_2 \pm v_2) + \cdots + (u_n \pm v_n) = \\ & = (u_1 + u_2 + \cdots + u_n) \pm (v_1 + v_2 + \cdots + v_n) = \\ & = s_n \pm \sigma_n \rightarrow s \pm \sigma. \end{aligned}$$

3° 在級數前面加上有限項或去掉有限項, 不會影響級數的斂散性, 不過在收斂情形時, 一般說來級數的和要改變的.

為確定起見, 我們考慮下面兩個級數

$$u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + \cdots, \quad u_3 + u_4 + u_5 + u_6 + \cdots,$$

第二個是由第一個去掉前兩項所得到的. 仍用 s_n 表示第一個級數的前 n 項的和, 用 σ_n 表示第二個級數的前 n 項的和, 顯然有

$$\sigma_{n-2} = s_n - (u_1 + u_2), \quad s_n = \sigma_{n-2} + (u_1 + u_2).$$

由此可見, 當 $n \rightarrow \infty$ 時, σ_{n-2} , s_n 或同時具有極限 σ , s 或同時沒有極限; 在有極限時, 其間關係為 $\sigma = s - (u_1 + u_2)$.

4° 收斂級數加括弧後所成的級數仍然收斂於原來的和 s .

設級數

$$u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + u_5 + \cdots = s,$$

按照某一規律加括弧後所成的級數為

$$(u_1 + u_2) + (u_3 + u_4 + u_5) + \cdots$$

用 σ_m 表示第二個級數的前 m 項的和, 用 s_n 表示相當於 σ_m 的第一個級數的前 n 項的和, 這就是說,

$$\sigma_1 = s_2, \sigma_2 = s_3, \dots, \sigma_m = s_n, \dots$$

由此可見, 当 $m \rightarrow \infty$ 时, $n \rightarrow \infty$, 于是

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sigma_m = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s.$$

于是又得到, 若加括弧后所成的級数发散, 則原来級数也必发散, 因若收敛, 那末根据刚才所证, 加括弧后的級数就应收敛了.

此外, 收敛級数去括弧后所成的級数不一定仍是收敛的. 例如級数

$$(1-1) + (1-1) + \dots$$

显然收敛于零, 但級数

$$1-1+1-1+\dots$$

却是发散的. 若所論級数是正項級数(即各項 $u_n \geq 0$), 則無論加括弧或去括弧都不会影响它的敛散性^①.

5° 收敛性的必要条件 若級数(1)收敛, 則当 n 无限增大时, 它的一般項 u_n 必趋近于零:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0.$$

因为

$$u_n = s_n - s_{n-1},$$

所以

$$\begin{aligned} \lim u_n &= \lim (s_n - s_{n-1}) = \\ &= \lim s_n - \lim s_{n-1} = s - s = 0. \end{aligned}$$

由此可知: 若級数的一般項不趋近于零, 則級数发散. 但一般項趋近于零并不是收敛的充分条件, 有些級数纵然一般項趋近于零, 仍然是发散的. 例如調和級数

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n} + \dots, \quad (2)$$

它的一般項 $u_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$, 我們不难证明它是发散的. 順序把級数(2)的

^① 这是因为从單調增加的数列中抽出来的任何子数列必与原来数列同时趋近于无穷大或同时趋近于同一极限的緣故.

一項、兩項、四項、八項、…括在一起：

$$1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8}\right) + \left(\frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{16}\right) + \cdots,$$

这个加括弧的級數的各項顯然大於級數

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{8}\right) + \left(\frac{1}{16} + \cdots + \frac{1}{16}\right) + \cdots = \\ & = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \cdots \end{aligned}$$

對應的各項，而後一級數前 n 項的和等於 $n \cdot \frac{1}{2}$ ，故發散於 $+\infty$ ，於是加括弧後的級數也發散於 $+\infty$ ，因而調和級數(2)也必發散於 $+\infty$ 。

§ 10.3 正項級數 收斂性的充分判定法

在前兩節中所講的都是任意項級數，即級數中各項可以是正數、負數、或者零。現在我們只討論正項級數(各項 $u_n \geq 0$)。這個情形特別重要，以後可以看到許多任意項級數收斂性的問題會歸結為正項級數收斂性的問題。在下面我們先講基本的比較判定法，然後再由此推出在實用上很方便的比值法、根值法和積分法。

設級數

$$u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots \quad (1)$$

是一個正項級數，顯然它的前 n 項的和 s_n 是一個單調增加數列： $s_1 \leq s_2 \leq \cdots \leq s_n \leq \cdots$ 。如果數列 s_n 為有界，即 s_n 恒小於某一定數 M ，則級數收斂於和 $s \leq M$ (§ 2.7 極限存在準則 II)。反之，若正項級數(1)收斂於和 s ，即 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ ，則數列為有界 (§ 2.2)，所以，正項級數(1)為收斂的必要且充分條件是，它的前 n 項的和所構成的數列 s_n 為有界。

根據這個原理，我們取另一正項級數

$$v_1 + v_2 + \cdots + v_n + \cdots, \quad (2)$$

把它與級數(1)作比較。

若級数(2)收敛于和 σ , 并且 $u_n \leq v_n (n=1, 2, \dots)$, 則

$$s_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n \leq v_1 + v_2 + \dots + v_n < \sigma,$$

即 s_n 恒小于这个定数 σ , 故可肯定級数(1)收敛.

若級数(2)发散于 $+\infty$, 并且 $u_n \geq v_n (n=1, 2, \dots)$, 則

$$s_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n \geq v_1 + v_2 + \dots + v_n = \sigma_n \rightarrow +\infty,$$

即級数(1)也发散.

因此, 我們证得

比較判定法 若級数(2)收敛, 并且 $u_n \leq v_n (n=1, 2, \dots)$, 則級数(1)也收敛; 若級数(2)发散, 并且 $u_n \geq v_n (n=1, 2, \dots)$, 則級数(1)也发散.

注意到級数各項乘以不为零的常数 k , 以及去掉級数前面的有限項不会改变級数的敛散性, 我們立刻得到

推論 若級数(2)收敛, 并且从某項起(例如第 N 項起), $u_n \leq kv_n$, 則級数(1)也收敛; 若級数(2)发散, 并且从某項起, $u_n \geq kv_n (k > 0)$, 則級数(1)也发散.

例 作为比較判定法的一个例子, 我們来討論 p -級数

$$1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \frac{1}{4^p} + \dots + \frac{1}{n^p} + \dots, \text{ 常数 } p > 0. \quad (3)$$

現在要分別证明当 $p \leq 1$ 时級数发散; $p > 1$ 时級数收敛.

設 $p \leq 1$. 这时級数的每一項不小于調和級数的对应項: $\frac{1}{n^p} \geq \frac{1}{n}$;

但調和級数发散, 故当 $p \leq 1$ 时級数(3)发散.

例如級数 $1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots$ 发散.

設 $p > 1$. 順序把級数(3)的一項、兩項、四項、八項...括在一起

$$1 + \left(\frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} \right) + \left(\frac{1}{4^p} + \dots + \frac{1}{7^p} \right) + \left(\frac{1}{8^p} + \dots + \frac{1}{15^p} \right) + \dots, \quad (4)$$

它的各項显然小于級数

$$1 + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^p}\right) + \left(\frac{1}{4^p} + \cdots + \frac{1}{4^p}\right) + \left(\frac{1}{8^p} + \cdots + \frac{1}{8^p}\right) + \cdots =$$

$$= 1 + \frac{1}{2^{p-1}} + \left(\frac{1}{2^{p-1}}\right)^2 + \left(\frac{1}{2^{p-1}}\right)^3 + \cdots$$

对应的各项;而后一級数是几何級数,其公比 $r = \frac{1}{2^{p-1}} < 1$,故收敛.于是,当 $p > 1$ 时,級数(4)收敛,又因为收敛的正項級数去括弧后仍收敛,所以級数(3)收敛.

例如級数 $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots$ 收敛.

取一几何級数作为級数(2)来与已給級数比較,我們能得到在实用上极方便的两个充分判定法:比值法与根值法.

比值判定法 設正項級数(1)之后項与前項的比值的极限等于 ρ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho,$$

則当 $\rho < 1$ 时級数收敛; $\rho > 1$ (或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \infty$) 时級数发散; $\rho = 1$ 时級数可能收敛或可能发散.

我們分別证明如下:

(i) 設 $\rho < 1$. 选定一个适当小的正数 ε 使得 $\rho + \varepsilon = r < 1$. 根据极限定义,当 $n \geq m$ 时,我們有不等式

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} < \rho + \varepsilon = r.$$

因此

$$u_{m+1} < r u_m, u_{m+2} < r u_{m+1} < r^2 u_m, u_{m+3} < r u_{m+2} < r^3 u_m, \cdots;$$

而級数

$$u_{m+1} + u_{m+2} + u_{m+3} + \cdots$$

的各项就小于公比为 $r < 1$ 的收敛几何級数

$$r u_m + r^2 u_m + r^3 u_m + \cdots$$

的对应項,所以它是收敛的.由于已給級数(1)比它只多了前面 m 項,

因此也是收敛的了(前节基本性质 3°).

(ii) 設 $\rho > 1$. 选定一个适当小的正数 ε 使得 $\rho - \varepsilon > 1$. 根据极限定义, 当 $n \geq m$ 时, 就有

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} > \rho - \varepsilon > 1,$$

也就是

$$u_{n+1} > u_n.$$

因之, 当 $n \geq m$ 时, 級数的一般項 u_n 是增大着的, 当 n 无限增大时它不可能趋近于零, 所以級数发散(前节基本性质 5°). ($\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \infty$ 时, 证明亦同).

(iii) 設 $\rho = 1$. 我們注意到当 n 无限增大时, 若比值 $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ 是由大于或等于 1 而趋近于极限 $\rho = 1$ 时, 显然一般項 u_n 不能趋近于零, 故級数发散. 一般而論, 在 $\rho = 1$ 的情形下, 比值判定法不能解决級数的敛散性的問題. 例如 p -級数(3)当 $n \rightarrow \infty$ 时均有

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \left(\frac{n}{n+1} \right)^p \rightarrow 1,$$

但我們知道 $p \leq 1$ 时級数发散; 而 $p > 1$ 时級数收敛. 因此只根据 $\rho = 1$ 不能断定級数是收敛或是发散.

在上面判定法的证明中, 我們看到如果級数自某項起, 适合不等式:

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} < r < 1,$$

則不論 $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ 是否趋向极限, 級数总是收敛的, 因为級数从某項起各項均小于收敛几何級数的对应項.

如果上面的不等式自某 n 項起成立, 則我們取級数前 n 項的和 s_n 作为和 s 的近似值, 这时所产生的誤差 r_n 可估計如下:

$$r_n = u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots < ru_n + r^2u_n + \cdots = \frac{ru_n}{1-r}.$$

例 1. 研究下面級数的收斂性并估計誤差:

$$1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdots (n-1)} + \cdots.$$

解 第 n 項为

$$u_n = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdots (n-1)},$$

而
$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdots n} : \frac{1}{1 \cdot 2 \cdots (n-1)} = \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

这时 $\rho = 0 < 1$, 故級数收斂.

誤差 r_n 为

$$\begin{aligned} & \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \cdots = \\ &= \frac{1}{n!} \left(1 + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots \right) < \\ &< \frac{1}{n!} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + \cdots \right) = \frac{1}{(n-1) \cdot (n-1)!}. \end{aligned}$$

例 2. 研究級数

$$\frac{1}{10} + \frac{1 \cdot 2}{10^2} + \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{10^3} + \cdots.$$

解

$$u_n = \frac{1 \cdot 2 \cdots n}{10^n},$$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1 \cdot 2 \cdots (n+1)}{10^{n+1}} : \frac{1 \cdot 2 \cdots n}{10^n} = \frac{n+1}{10} \rightarrow \infty.$$

这时 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \infty$, 故級数发散.

例 3. 研究級数

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{5 \cdot 6} + \cdots.$$

解

$$u_n = \frac{1}{(2n-1) \cdot 2n},$$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(2n-1) \cdot 2n}{(2n+1)(2n+2)} \rightarrow 1.$$

这时 $\rho=1$, 比值判定法失效. 但显然可見級数的各項小于收斂級数

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots$$

的对应項, 根据比較法它是收斂的.

根值判定法 設正項級数(1)的一般項 u_n 的 n 次根的极限等于 ρ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho,$$

則当 $\rho < 1$ 时級数收斂; $\rho > 1$ (或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \infty$) 时級数发散; $\rho = 1$ 时級数可能收斂或可能发散.

这个判定法的证法基本上与比值判定法的相同.

(i) 設 $\rho < 1$. 当 $n \geq m$ 时, 我們有

$$\sqrt[n]{u_n} < \rho + \varepsilon = r < 1.$$

因此

$$u_m < r^m, \quad u_{m+1} < r^{m+1}, \quad u_{m+2} < r^{m+2}, \dots,$$

而級数

$$u_m + u_{m+1} + u_{m+2} + \dots$$

的各項就小于公比 $r < 1$ 的收斂几何級数

$$r^m + r^{m+1} + r^{m+2} + \dots$$

的对应項. 于是, 級数(1)收斂.

(ii) 設 $\rho > 1$. 这时 $u_n \geq 1, u_{n+1} \geq 1, \dots$, (1)的一般項不能趋近于零, 故必发散.

(iii) 設 $\rho = 1$. 仍可取 p -級数为例. $\sqrt[n]{u_n} = \sqrt[n]{\frac{1}{n^p}} = \left(\frac{1}{\sqrt[n]{n}}\right)^p \rightarrow 1$ (因为当 $x \rightarrow +\infty$ 时未定式 $x^{\frac{1}{x}} \rightarrow 1$, 故 $n^{\frac{1}{n}} \rightarrow 1$), 这就說明了 $\rho = 1$ 时級数可能收斂也可能发散.

在上面根值判定法的证明中, 我們也看到如果級数自某項起, 适合不等式:

$$\sqrt[n]{u_n} < r < 1,$$

則不論 $\sqrt[n]{u_n}$ 是否趋向极限, 級数总是收斂的, 因为級数从某項起各項均小于收斂几何級数的对应項. 并且以和 s_n 作为和 s 的近似值时所产生的誤差 r_n 可估計为

$$r_n = u_{n+1} + u_{n+2} + \dots < r^{n+1} + r^{n+2} + \dots = \frac{r^{n+1}}{1-r}.$$

例 4. 研究級数的收斂性并估計誤差:

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^3} + \dots.$$

解

$$\sqrt[n]{u_n} = \sqrt[n]{\frac{1}{n^n}} = \frac{1}{n} \rightarrow 0,$$

故級数收斂. 誤差 r_n 为

$$\frac{1}{(n+1)^{n+1}} + \frac{1}{(n+2)^{n+2}} + \frac{1}{(n+3)^{n+3}} + \cdots < \\ < \frac{1}{(n+1)^{n+1}} + \frac{1}{(n+1)^{n+2}} + \frac{1}{(n+1)^{n+3}} + \cdots = \frac{1}{n(n+1)^n}.$$

积分判定法 設級数

$$u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots \quad (1)$$

的各項可以看作是区間 $[1, \infty)$ 上正的减函数 $f(x)$ (連續的) 对应于 $x=1, 2, \cdots, n, \cdots$ 的各个值:

$$u_1 = f(1), u_2 = f(2), \cdots, u_n = f(n), \cdots,$$

則广义积分

$$I = \int_1^{\infty} f(x) dx$$

收斂或发散时, 級数也随之收斂或发散.

考察曲綫 $y=f(x)$ 与纵綫 $x=1, x=n$ 及 x 軸所圍成的面积:

$$I_n = \int_1^n f(x) dx.$$

由图 10.1 可見这个面积小于 $(n-1)$ 个高出于曲綫上面的矩形之和 $u_1 + u_2 + \cdots + u_{n-1} = s_{n-1}$, 而大于低入于曲綫下面的 $(n-1)$ 个矩形之和 $u_2 + u_3 + \cdots + u_n = s_n - u_1$, 故有

$$s_n - u_1 < I_n < s_{n-1}.$$

由此, 即得不等式

$$s_n < I_n + u_1 \text{ 及 } s_n > I_n.$$


图 10.1

先設 $I = \lim I_n$ 存在. 根据前一不等式, 則单调增加数列 $s_n < I + u_1$ 是有界的, 因之它必具有极限而級数 (1) 收斂. 次設 $\lim I_n = \infty$. 根据后一不等式, 則有 $\lim s_n = \infty$, 故极限不存在而級数 (1) 发散. 证明完毕.

下面举一个例子說明有时用比值法或根值法所不能解决的問題却很容易用积分法来解决.

例 5. 用积分判定法研究 p -級数

$$1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots \quad (p > 0)$$



的斂散性.

解 这时 $u_n = \frac{1}{n^p}$, 可取 $f(x) = \frac{1}{x^p}$. 根据 § 8.8 例 2, 我們知道广义积分

$$I = \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$$

当 $p \leq 1$ 积分发散, 当 $p > 1$ 积分收斂而等于 $\frac{1}{p-1}$. 于是根据积分判定法 仍然得到

我們在前面用比較法所証出的結果: 若 $p \leq 1$ 已給級数发散, 若 $p > 1$ 級数收斂。

§ 10.4 任意項級数 絕對收斂

現在讲任意項級数, 即級数中各項可以有正数、負数、或者零. 首先讲交錯級数. 所謂交錯級数是这样的級数, 它的各項是正負相間的, 从而可以写成下面的形状:

$$u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \cdots, \quad (1)$$

其中 $u_1, u_2, \cdots$ 是正数. 我們来证明萊布尼茲关于交錯級数收斂性的定理:

定理 1. 若交錯級数(1)滿足条件:

$$1^\circ u_n \geq u_{n+1} (n=1, 2, 3, \cdots)$$

$$2^\circ \lim u_n = 0,$$

則級数收斂, 其和 $s \leq u_1$, 其余項 r_n 的絕對值 $|r_n| \leq u_{n+1}$.

证 先证明前 $2n$ 項的和的極根 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n}$ 存在.

把級数的前 $2n$ 項写成两种形式:

$$s_{2n} = (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \cdots + (u_{2n-1} - u_{2n})$$

及

$$s_{2n} = u_1 - (u_2 - u_3) - (u_4 - u_5) - \cdots - (u_{2n-2} - u_{2n-1}) - u_{2n},$$

由条件 1° 知道所有括弧中的差都不能为負. 首先由第一行可見 s_{2n} 随 n 增大而增大, 由第二行可見 s_{2n} 恒小于 u_1 . 根据极限存在准則 II (§ 2.7) 知道, 当 n 无限增大时, s_{2n} 趋近于一个极限 s , 并且 s 不大于