

奇難雜症醫術秘傳

許靈驗著

五洲出版社印行

無師
自通

奇難雜症醫術秘傳目錄

卷一 中西花柳科祕訣

上編 中醫花柳科

徵瘡病原

下疳驗方十則

橫痃驗方十六則

附魚口便毒治法

徵瘡驗方四十則

結毒驗方十五則

梅毒愈後驗方五則

淋濁驗方

白濁治法十三方

白帶白淫治法一方

下編 西醫花柳科

梅毒原因

梅毒之經過

梅毒之診斷

梅毒治療法

局所驅除梅毒法

治原發症

治淋巴腺腫脹

治面及兩手邱疹

治扁平濕疣

治謹膜腫潰

治潰瘍

治口鼻粘膜初發症

治喉頭梅毒

治初期硬結

治皮膚梅毒

治呼吸器梅毒

治消化器梅毒

治泌尿生殖器梅毒

治神經系梅毒

治眼耳梅毒

治奔馬梅毒

全身驅梅毒法

舊六零六之用法與治法

新六零六之用法與治法

水銀治法

沃度治法

先天梅毒治療法

下疳治療法三則

橫痃治療法四則

男子淋病治法

女子淋病及併合症治法二則

花柳科製藥欄

男女梅毒良藥治法四十四種

男子淋濁病良藥製法二十九種

女子尿道淋良藥製藥一種

奇難雜症醫術秘傳目錄

花柳科	一一五〇
針灸科	一一四六
祝由科	一一三六
小兒推拿科	一一四六
痧症科	一一一八
痘症科	一一一四
痧疹科	一一一〇
跌打科	一一一八

自通無師 奇難雜症醫術秘傳

卷一 中西花柳科祕術

上編 中西花柳科

▲徵（音梅）瘡病原

徵瘡。即下疳。橫痃。淋濁病之總稱。其病原中醫則謂正氣不足。邪毒乘之而生。如腎氣虛。邪毒乘之。則生下疳。或為蛭。梗甚。則骨痛。徵瘡形如爛枯。肝氣虛。邪毒乘之。則發橫痃。或成魚口心。氣虛。邪毒乘之。則發紫瘡。形如楊梅。左右相對。有一經獨虛。而邪氣獨盛者。有數經同虛。而齊病者。有見於外。而滿身生瘡者。有伏於內。而遍體骨痛者。治法。當詳究脈理。辨別毒。法。或用中法。但求診斷精明。方藥靈驗。莫不名利兼收。誠為時下當行之投機醫生。而且學習比較。其他編。以備有志學習者之參考。至於西醫治徵毒各法。另輯於下編。上編中概不附錄。

醫科容易。茲將歷代名醫之徵瘡治驗丹方。選輯成編。以備有志學習者之參考。至於西醫治徵毒各法。頗倒斬削。元神病重。而藥輕。難收速效。病輕。而藥重。必生他變。所以治此症者。須標本兼治。以攻邪補元。為主。不可偏施也。又見日本名醫本堅元。調解釋徵。

▲下疳驗方（下疳為梅毒先發症）

【治下疳丹方】下疳初起。用大黃一兩。皂莢二錢。同

研細末。水發爲丸。每服二錢。瀉去其毒。便能銷散。
〔又方〕下疳初起。陰頭皮皺處。時覺濕爛疼痛。速用
生甘草瓦松各錢半煎湯待溫。洗淨拭乾。次用鳳
凰衣（即出小雞之蛋壳內衣）炒黃色。兒茶各
等分。同研細末。摻敷患處。冤取壁上蠟蜘蛛錢。（俗
稱壁蠅裏）十數個。逐個在菜豆油燈上略燒存
性。入小鉢中研細。加冰片少許研和。擦敷濕爛處。
立能止痛。

〔又摻藥方〕海過子（一名貝子）煅存性一兩研極
細。加冰片五分五色粉霜三分研和。藏磁罐中。以
新桿摻敷。
〔又熏洗方〕苦參、川椒、忍冬花各一兩。加清水四大
碗。煎五六沸。傾入木桶中。乘熱熏患部。待溫洗滌
瘡口。拭乾。用上列摻藥徑四沿邊塗之。倘熏摻無
效。受毒必深。
〔又化毒丸方〕虎脰骨酥、龜板酥、炙川山甲、炙臘
砂各一錢六分。血餘（用童子每月一剃之頭
筋肉。研細末。水發爲丸。每服二錢。瀉去其毒。便能銷散。

〔解表飲〕治下疳便毒同起。筋骨疼痛非常者。麻黃、
紫蘇、桔梗各三錢。川芎、升麻、當歸、忍冬花各五錢。
僵蠍、蟬退各三錢。五分子羊肉十兩。用黃酒十
盞。煎至三盞去渣。作一頓服。厚被蓋。復汗透爲度。

【治漏濁疳方】一名蠟燭疳。從內爛出。或從半邊溜爛者是也。用人脚根上老皮一錢或二錢。瓦上焙脆研末加黃柏末等分。用猪胆汁勻拌晒乾再研細末。摻患處以烏金紙包頭。

【治雞眼疳魚口下疳方】婦人陰戶臭爛亦可用此藥療治。熟乳香、冰片、珍珠末、象牙末、兒茶各三分。搽面粉一兩（入傾銀罐內煅紅成鵝黃色）牆上白螺殼壳（洗淨入傾銀罐內煅枯研細）淨末一兩。各藥共研細末。收藏磁瓶封固。若遇爲患者上藥先用米泔水煎滾。除去上面浮沫。加雄黃三錢於沸泔水內。待溫淋洗患處。除盡膿血。然後從磁瓶中取藥末摻患部。不拘男女。三日後立見功效。

【生生乳製法】生生乳爲治大癰瘍、諸虫疾、頑毒頑癬之聖藥。不獨能治下疳也。製法煅練譽石三錢。雲母石二錢五分。硝石（即盃硝）一兩六錢。朱砂液（即朱汞粉紅色者爲上）九錢六分。晉譽

一兩二錢。桑白皮一兩八錢。食鹽一兩五錢。枯礬五錢六分。青鹽三錢五分。共研至不見星。入羊城罐內三方一頂火燒至藥化。上面有霜頭起離火候。冷用鐵鑊蓋。紮鹽泥封固。待罐口泥乾入八卦爐中。先用文火燒至罐底熱透。緩緩擦水加炭平口。用武火燒三炷香離火。先用甘草牙皂各二錢。煎濃汁收藏底白丹砂。棉紙包裹。浸汁內片時取出。連紙埋土中三日夜。取來晒乾。每兩加冰麝各七厘。辰砂九分。共研細末。外用乳香一錢二分。滲水煉化。和前末研勻爲丸。每粒重一錢一分。外以黃蠟封固。卽命生生乳照方配合。凡遇百藥不治之梅毒惡症。服之無不立見奇功。此方妙在水銀與雲母譽石同煉。能解水銀毒也。

△橫痃驗方

【治橫痃立愈方】橫痃生小腹兩傍大腿縫中。形如腰子。皮色不變。按之堅硬而微痛者是大抵繼下疳而發。初起卽靜臥。用後列藥方療治可期消散。

一經潰爛則非半年不能全愈。初起宜用皂角刺六錢研末布袋裝好同糯米二合煮薄粥一日分早晚兩次服完。次日再如法煮服連服三四日自消。

【通氣飲】治橫痃初起或兩側俱腫作痛。肉未堅實。服此通氣飲可望內消。木通、瓜蒌子各五錢。忍冬花粉、甘草各三錢。貝母、紫蘇葉各二錢。加清水兩大鍾。煎八分空心服。渣再加水鍾半煎七分服。

【又方】鷄子一個一端開小孔入紅娘子六個紙包放稻草火灰中燶熟去紅娘子及蛋壳食鷄子用黃酒空腹送下隔一日或半日小便若得淋出膿血毒去即愈。或用鮮瓦松搗爛同冰片、鷄蛋白調敷亦效。

【又方】黃括蔥一個黃連五錢初起時水煎服二三劑即愈。又生山藥五錢活鯽魚一尾同搗爛塗敷亦效。

研末好陳醋調勻攤布貼患處布上塗藥須勻厚貼一日夜初起即消。潰爛久不收口者貼之亦效。惟藥宜多備以便每日更換又內服冬葵子酒下二錢亦效。

【又方】穿山甲半兩、豬苓二錢。醋炙研末酒服二錢。外用穿山甲末和麻油輕粉調塗有效。

△魚口便毒驗方（生在左脣縫內曰魚口生在右脣縫間曰便毒）

【治魚口方】魚口生在左脣縫內瘡口潰爛甚太身立則瘡口合身屈則瘡口張開合之形相似魚口此係宿娼忍精不洩怒氣傷肝而成初起用端陽日從桃樹上採下之青核桃置無日無雨處陰乾瓦上火燶存性研末藏磁瓶中每服一錢好黃酒空心送下連服三四次未成者即消已成者減輕另用大荔枝核中仁、青棗核中仁、桃仁各三錢共同搗爛醋浸一宿取起擦敷患部再用黃柏燒灰同

松花粉撲之。如是貼三四劑。不論已潰未潰。均有奇效。

【治魚口立愈三方】一用芙蓉花葉連根搗爛加白礬少許。調敷患處。毒即退散。二用瓦松焙乾研末。雞蛋白調敷。不出腹愈。三用雄黃、乳香各二兩。黃藥一兩。共研細末。初起時用新汲水調敷患部。腫痛自消。

【又方】葱根五六個。洗淨和蜜搗爛敷患部。以紙薄護之。并煎服橫痃門之通氣飲。自愈。

【治便毒方】使毒生在左腰縫間。一名便癰。又稱血癰。男女皆有生之者。發於少腹之下。臍根之上。摺紋縫中。經屬肝腎。大抵由強力房勞。忍精不洩。或則慾念未遂。以致精搏血留。聚於中途。壅遇而成。或爲暴怒傷肝。氣滯血凝而發。初起用白芷、僵蠶、（炒黃）川山甲（炮）各二錢。當歸、生大黃、各三錢。乳香、沒藥各一錢。水煎服兩劑。即消。此爲惡毒初起之妙方。外用千年石灰末一錢。加白礬食

鹽少許。米湯調敷。即愈。

【消散毒】治便毒發腫。硬大作痛者。用歸尾、粉草、大黃、黑丑（搗碎）各三錢。僵蠶、貝母各二錢。加水酒各一大鍾。煎八分空心服。渣再加水酒煎七分服。卽愈。又黑丑頭末七錢。空腹熱酒送服。或汗或下。卽愈。

【五虎湯】藥力稍猛。惟患便毒。而元氣充足者。宜服此方。全蝎、僵蠶、川山甲（炙）各一錢。五分蜈蚣三條。斑毛三個。（去頭足。糯米拌炒。）生大黃二錢。皆研細末。分兩次用黃酒空腹送服。

【內托散】便毒腫痛作脹者。用地榆一兩。黃芪、粉草、忍冬、川山甲、白芷各二錢。用酒二大鍾煎一鍾。空腹服。

【透膿散】便毒有膿。未曾破潰。作痛作脹。用皂角刺、黃芪、牛膝各三錢。川芎一錢。歸尾、川山甲、忍冬花、大黃、各一錢。水煎服兩劑。卽消。此爲惡毒初起之妙方。外用千年石灰末一錢。加白礬食渣。再加水煎七分服。

【魚口便毒通治方】凡患魚口便毒用隔年陳水仙花兜和口津在粗石上磨成濃汁用杯盛貯擗於患處未潰者腫消而散已潰者臘即提出俟毒膿流盡用野菊花煎湯洗淨患處向藥店買九乙丹擦之即愈。

【預解瘡毒油】凡患便毒下疳未愈而有發生瘡瘍之兆預煎此油吞服可免面部生瘡。麻油八兩加自己頭頭五錢用文火煎化離火待冷作兩次服再服亦可。蓋麻油善能消毒潤腸能下腹中瘡毒多服無妨。

▲徵瘡驗方

【治楊梅瘡方】梅毒何自而來蓋由嫖妓宿娼樂極悲生。毒氣由洩精之後從精道乘虛直透命門以灌督脈於是外而皮毛內而筋骨凡督脈所到之處無不受最深最惡之蠶毒倘初起時治不得法卒至缺唇股鼻者有之除毒未盡以致貽害妻兒甚且絕嗣喪命者亦有之當世青年受害者幾如

恆河沙數綠將梅毒治驗良方搜輯如下以便自醫及學醫者之參考凡治病必先診斷明確方可對症檢方給藥初起頭不痛筋骨不痛小水通利。瘡形碎小頭面稀少口角無瘡胸背稠密穀道清楚者爲順先發下疳次生魚口便毒及橫痃便覺筋骨疼痛而梅毒始發現色紫堅硬手足多生形如湯潑起皚者爲險總之調治得法亦可告痊。最忌欲求速效雖服輕粉水銀白粉霜等（解法見後）以致餘毒含藏骨髓復爲倒發輕則害及妻兒重者損形喪命徒遭噬臍之悔可不慎乎。治瘡藥方不下數百種茲擇最有效驗者錄下。初起用羊角核桃壳等分燒存性研極細末用細絹篩篩盡粗屑每服錢半好黃酒調下早晚各一服約服四日毒從大便出如血如膿以後每日早上服一次半月毒盡前藥不必服另用熟地當歸人參白芍白朮白茯苓炙甘草各等分水煎服虛者宜多服數劑。

〔熏洗方〕凡微瘡發於頭面及小便處者。用此方薰洗。再用後方塗點。五日即愈。方用番打麻雷丸。各

五錢。朴硝、地骨皮各一兩。黃芩兩半。用河水五碗。

煎藥味出離火傾木盆中。將患部先薰後洗。次用點藥。

〔點藥方〕用此點藥。必先服下列化毒藥。不服藥者忌之。方用大杏仁二十個。（火上燒透存性）胆礬四分輕粉一錢。三物共研如膏。敷點患處。每日於臨睡時先將煎藥煮熟。薰洗。然後點藥。

〔加味化毒飲〕治微瘡下疳。腐爛陷下凹或包皮腫如鷄肫。或肌膚見形如斑如疹。勢將發瘡者。用漢防己當歸忍冬花白鮮皮連翹光活川芎各三錢。牙皂五錢。各藥一律切片。分作七帖。每帖加奇良四兩。猪胰子一枚。水四碗。煎至兩鐘。一日分二次服。渣再煎一鐘。臨睡服。七帖分七日服完。

〔又方〕胡桃仁輕粉槐花（炒研）紅棗肉各二錢。共搗爲丸。分作三日服。第一日鷄湯下。第二日陳

酒下。第三日兩煎茶下。五日瘡乾。七日痂落。此係花柳科專家楊誠所傳。治微瘡之經驗良方。幸勿輕視。

〔又方〕黃土一升。加水澄清作水。蚊蠅糞二兩。生大黃一兩。生甘草五錢。黃芩根五錢。水煮。加前土黃水。服後便瀉。隔一日再服。再瀉。如是數劑。毒氣盡而微瘡自愈。

〔又方〕楊梅瘡潰爛。古牆上螺螄壳辰砂各等分。加冰片少許。共研細末。敷擦患部可愈。

〔治梅毒寄鼻方〕龜板（酒炙三次研淨末）二兩。石决明（蜜便淬研末）二錢。硃砂（水飛研）二錢。共同研和。用黃米飯糊丸如桐子大。每服一錢。空心下。土茯苓湯充酒下。服過硃黃者。水其藥煎湯送服有效。

〔立愈楊梅結毒方〕珍珠二分。西牛黃一錢。土茯苓一片。水煎服。西牛黃絹包入煎。珍珠研末含口藥湯送下。

【九龍丹】治楊梅結毒及懸癰毒。魚口便毒。橫痃初

起俱有奇效。用木香、乳香、沒藥、兒茶、血竭、巴豆（不

去油）等分爲末。生蜜調成一塊。貯藏磁盒中。勿令

洩氣與霉壞。臨診施用。摘取一角。搓成丸藥。

九粒。如瘡毒大。用熱黃酒送下。輕者服四五

次即愈。腫甚者。間日再服。罄一料。毒必消盡。

【五寶丹】治楊梅結毒。筋骨疼痛。腐爛口鼻。百藥無

效。服此丹無不收功。方用石蠶乳四錢（須向著

名大藥鋪中購買。凡乳頭下垂。敲破易碎。形似蜻

蜓翅膀者方真）。硃砂一錢。珍珠二錢（塞豆腐中

煮半炷香時取出）。冰片一錢。琥珀二錢。分研細

末。併合再研數百轉。磁罐密收。臨用取藥二錢。加

飛羅麵粉八錢。再研勻。用土茯苓一斤水八碗煎

至五碗。瀝其渣。作五回服。每服加五寶丹一分。和

勻。如鼻子腐爛。每日土茯苓內加辛夷三錢。煎服。

引藥上行。忌食海腥牛羊鷄肉火酒煎炒。房事更宜遠避。

【金蟬脫壳酒】治楊梅結毒。筋骨疼痛。用醇酒五斤。

大蝦蟆一個。土茯苓五兩。浸酒內瓶口封緊。重湯

煎兩炷香。取出次日飲之。以醉爲度。無論冬夏。須

蓋暖使汗透爲效。飲存之酒。逐日隨量飲之。酒盡而毒消。

【醫治梅毒斷根不發方】金銀花、皂角刺、蟬退、僵蠶

各七錢。杏仁（去皮尖）七粒。土茯苓一斤。加水

適宜。煎至一半離火。傾出盡。一日當茶服完。戒飲

茶。房事。海腥發物。避風靜居。隔一日再服七劑全

愈。永不再發。

【治誤服輕粉毒方】患梅瘡誤服輕粉。（少服無妨。

本編也有用輕粉之方。）毒竈經絡。或口齒腫爛。

或筋骨疼痛。繫久不愈。將成殘廢者。解救之

方。用土茯苓一兩。苡米、銀花、防風、木通、白蘚皮各

一錢。木瓜錢半。皂角子四分。氣虛加頂上黨參一

錢。血虛加當歸七分。加水煎八分。一日分早晚兩

次服完。忌牛羊鷄鴨魚肉。海腥燒酒。麵食。辣椒及

一切發物謹戒房事半年。服至十日其毒即解。

【預防梅毒結染祕方】家有患徵瘡者。其妻妾子女及在傍伺候之人。欲免傳染。宜用雄黃川椒（去子）各五錢研末。杏仁百粒蒸熟去皮尖炒共研細末。燒酒半盞糊丸如桐子大。每服十五丸。開水下可免傳染。

【又治楊梅結毒神效方】川芎、當歸、金銀花、花粉防風、生半夏（姜鑿製）、川貝母、海螵蛸（去皮水飛）、白芷各一兩。南星兩半（黃汁製）。先用土茯苓一斤（米泔水煎竹刀去皮）搗爛不犯鐵器。放沙鍋內加水四大碗。將竹筷量定深淺。再加水四大碗。煎至四大碗。將前煎末十兩五錢投入。再加水大四碗。煎至四碗去渣。一日服完。忌鹽及切毒物。發物海鮮房事粥飯祇可淡吃。輕者一料。一重者兩料必愈。或每料調入八寶丹一分二厘。
【八寶血方】真犀黃一錢。血珀二錢。珍珠二錢。冰片一錢。滴乳五錢。飛麵八錢。辰砂二錢。飛滑石二錢。

分研細末。併合研勻。收藏磁瓶。固能治一切梅毒。惟成本昂貴。患者出不起藥本。醫生都不製備。

【又方】胡連、宣連、川大芎、牛膝各二錢。豬胰脂一個。皂筍子七粒。先將土茯苓一斤以石搗碎。加水八碗。煎至六碗。入藥至前煎五碗。入胰脂再煎至四碗。溫服。一日服盡。渣再加水四碗。煎至兩碗。服第二次煎時。須用竹筷入藥罐逐碗量定水量。則煎至若干為度。一目了然。惟服此藥之前。須先吃鷄羊海鮮。使毒氣發透。然後服藥。二三劑後。瘠勢漸減。後劑須加苡仁。當歸各二錢。於前方內。如法煎服。重者不過四五劑。輕者不過二三服。遍體貼然。且無結毒之患。結痂後。再服排毒散數劑。更妙。惟

各藥忌鐵器。又忌茶。

【梅毒丹方】鷄蛋一枚去黃留白。入輕粉一錢。攬勻。紙糊。飯鍋上蒸熟食之。初起即消。已發透者亦有功效。

爛。先用茯苓、木通、防風、荆芥各一錢。當歸二錢。生黃耆三錢。麻黃一錢。（太熱有汗者減半。）先用精羊肉二斤水五大碗煎至三碗去肉。將藥加入煎至二碗。於下午照常食飽。臨睡吃藥。如天氣寒冷服熱白酒一杯。蓋被出得汗透頭面亦須出透。苟有一處無汗。卽遣後患。至天明自然汗止。卽用熱湯沐浴。另換新衣新被。有汗衣破須加水自洗。若使他人洗澡。則其氣味未有不被傳染者。存心有天知。不當以此惡瘡。始害婢姬。若輩無錢醫治。遺害不堪設想。憤之或者將衣被燒燬。亦須令人掩鼻遠避。更換衣被後。再用生大黃研細一兩。牙皂莢炒黃研末三錢。水泛爲丸。每晨食薄粥後。卽服二錢。白湯送瀉。三五次後吃粥一碗。卽止。體厚者。間日一服。以後每日用土茯苓煎濃湯服三五碗。每碗入五寶丹（見前）六粒。逐日照法服。以告瘥爲止。忌茶湯發物及房事。

【治楊梅瘡餘毒未盡方】槐米（檢淨微炒去尖研

細）每服二錢。用開水空心調服。每日兩次。服至兩升。毒盡。

【治楊梅結毒方】僵蠶、蟬蛻各三個。豬牙皂三錢。皂角子七個（研碎）。土茯苓三錢。生大黃錢半。甘草三錢。川山甲三片（煨）。加河水兩大碗。黃酒一碗。煎至七分服。不拘二服三服。以瀉爲度。瀉時須塞鼻。不可聞臭味。便桶中須放臭藥水。身弱者瀉後不心再服。強壯者瀉後再服一劑。體內餘毒自盡。忌鷄鵝等發物。

【楊梅結毒敷藥方】真輕粉二錢。杏仁霜二十粒。（去皮尖取霜）。番木鼈（水煙存性）三錢。兒茶三錢（火煅）。胆礬三分。片腦一分。將各藥入研鉢中共研細末。用鵝膽或猪胆調敷。每日早晚各敷一次。數日卽愈。

【楊梅瘡點藥方】兒茶、杏仁霜各一錢。輕粉五分冰片三分。入器研勻。用鵝膽汁調點。一日三四次。卽

愈。

【治梅毒神祕丹方】紹興酒、小磨麻油、每日清晨空心服。隔湯燉熟，須用一高玻璃杯。有量杯最好。無

量杯用紙條分作十格貼杯外。先放酒七分在下。上加麻油十分。燉熟調和服。如餘毒未盡。以荷葉加水煎濃湯置壺中。代茶飲。忌飲茶、海鮮、發物。惱怒行房。連服七日即愈。

【又方】雄黃、雨前茶葉、生芝蔴各四兩。共研細末。用黃米飯磨粉糊爲丸。如桐子大。每晨開水送服三錢。

【又方】牛角一對。羊角兩對。用粗草紙包好。復將童便浸透。以炭火炙之。去淨紙灰研成細末。入絹篩過。粗屑再研再篩。用川山甲一兩。焙脆研成極細粉末。篩過入藥研和。每晨空腹服三錢。用好陳酒送有效。

【又方】黑豆、生甘草節各二錢。加水煎濃湯。傾入木桶中。乘熱先薰。待溫洗患部。洗後拭乾。擦以鯉魚胆汁。極效。又用槐花四兩。略炒。加黃酒兩大鐘。入

沙罐中煎十餘沸。離火稍隔片時。乘熱去渣。服得汗透即愈。

【治頭面梅毒方】斬艾一兩。川椒八錢。麻黃去節三錢。川芎二錢。白茯苓二兩。豬頭天靈蓋骨（火煅存性）五錢。上藥共研細末。以蒸餅糊丸。如桐子大。飯後開水下三錢服。三四日瘡口乾燥。服至平爲止。

【武定候方】雄黃錢半。輕粉一錢。杏仁三十粒（去皮）。共研細末。用雄猪胆汁調擦患處。日服麻油一杯。更效。

【治棉花瘡點藥方】患棉花瘡毒及下疳。或初感或毒盛。經久不愈。用新槐蕊揀淨不必炒。每日早午晚各服一錢。於食前用清酒送下。服至二三日。毒盡去。絕無寒涼敗脾之病。如不能飲酒。用開水送亦可。

【五寶湯】專治誤服輕粉毒方。用紫草、金銀花、山慈姑各一兩。乳香、沒藥各五錢。加新鹽水六碗。好陳

酒五碗。煎六七碗。空心熱服一杯。蓋被取汗。不可見風。多至服兩劑。其毒即從大小便瀉出。如結毒不消。宜先服五寶湯。用搽藥。即使鼻子。陽物潰爛。內外並治。亦可藥到病除。以免脫鼻壞形。搽藥方列下。

【搽藥方】輕粉一錢。（輕粉內服有毒。外搽無妨。）乳香六分。沒藥二分。血竭兒茶麝香。冰片各一分。大珍珠三分。宮粉（煅）六分。紅蝎子（燒灰）二分。文蛤二分（煅存性）。蟬骨五分。胎髮（燒存性）。白螺蠣壳（燒存性）各二分。上藥十四味。分研細末。合研勻。磁盒收藏。用時先以甘草煎濃湯待溫。洗淨患處。然後搽藥。早晚各一次。忽又復發。日久不愈。膿水淋漓。臭爛不可近者。方用楓子肉四兩。輕粉一錢。菟麻仁二兩。蘆甘石二錢。杭粉二兩。花椒五錢。共爲細末。加小磨麻油搗成膏。用老油紙攢貼瘡上。貼時先用花椒甘草煎。

湯洗淨。臘水將藥貼上。用布束住。三日一換。五六次必癒。

【治服霜粉牙跟腐爛出血方】管仲黃連各五錢。二味共研末。加水兩碗。煎四五沸。入冰片二分。攪勻。每日含漱。

【護面散】患梅毒速服此散。可保楊梅毒瘡。不攻頭面。用婦人頭髮（煅存性）。明雄黃各三分。共研細末。香油半杯。調勻。每日分早午晚三次。用滾黃酒冲服。即愈。

【又方】臘豬首骨（搗碎）。土茯苓（春碎）。金銀花各一斤。誤服輕粉結毒。在冬季加水十大碗。煎八分。去渣。貯有蓋破鉢中。每晨空心溫服一鍾。在夏季匀分六帖。每帖半斤。逐日加水兩鍾。煎八分。服藥盡即愈。

【又方】紅棗三斤。入鍋加水適宜。用杉木作薪煮棗。逐次鉗出悶炭。煮至棗爛爲度。離火待溫。剝去皮核。并將鉗出之悶炭。入石盆中。磨成細末。篩淨粗

屑加入聚肉中。用木杵搗爛。搓成丸。如鉛彈大小。置日中晒乾。收藏磁器中。每日服一丸。用土茯苓煎湯送下。初毒者起輕服半料。卽愈。毒重者服一

料。

【采病解毒丹】治楊梅瘡。初起可作瀉毒藥用。絕無剋伐胃氣之弊。方用山茨菇二兩。（須擇嚴處土產。色紫價重者爲良。色白者力薄無效。）紅第大戟（去木切薄片。取頭末用。）一兩五錢。千金子（去壳去油。取淨末。）二兩。文蛤三兩。硃砂、雄黃各五錢。麝香二錢。各研細末。合併研和以稀薄糯米粥。搗成錠子。收藏磁盒中。用時量體質之強弱。毒氣之輕重。年紀之大小。抵重用每服一錢。二分。輕用每服八分。開水磨冲。

【加味風流散】楊梅瘡初起不生下疳。便毒者宜服此方。防風、荆芥、川芎、升麻、鼠粘子、花粉、白芷、皮、僵蠶、甘草、川山甲、牛膝、何首烏、赤芍、木通、五加皮。各等分。猪胰半隻。奇良一兩。加水三大碗。煎至一碗。

傾出去渣。乘熱服。蓋被臥。取得汗出爲度。渣再煎服。以後宜服化毒丸。（見後。）

▲結毒驗方

【甲字化毒丸】患微瘡。毒結於心小腸經者。毒注腫仁。似生內障。或見或不見。毒聚舌本作腫。或十指慘痛。或瘡生遍體。腐爛不易結痂。或結他經。兼主他病。當服此丸。兼以後列煎藥調理。丸方用牛黃、珍珠、蜈蚣（去頭足炙腹）各四分。犀角生生乳（製法見前）。牙皂各一錢。月月紅（即每月一剃之兒童頭髮）。白蘿蔔皮、硃砂各一錢七分。雄黃研和用神麩末五錢入水少許。打成糊。入藥末。擣勿丸。如桐子大。另研硃砂爲衣。收藏有蓋磁瓶中。勿令泄氣。勿使着潮粘連及霉壞。因藥本甚貴故也。臨診用。每早空心服十五丸。每晚空腹服十九人參湯送下。貧者用圓眼湯送亦可。病去丸宜