

二九

萬有洪武

吳之屏



本刊  
編者

# 中醫朱振聲診例

科 目

內外婦幼各科

時 間

門診上午九時至下午四時出診四時以後

診 金

門診一元出診四元

診 所

上海三馬路雲南路老會樂里第一弄第一家

通函。  
論症。

外埠通函論症第一次納費二元覆診減半先患  
後覆惟來函須詳述現在病狀及經過情形掛號

寄下原班還件

# 男女二病

## 發育不全

朱振聲

(一)

問 振聲先生同道。未經御李意切贍。韓夙仰先生畢業於丁公之門。每欲臨書問候。又苦尊址不詳。以是思慕之忱。與時俱集。茲購閱尊編。腎病研究。始知台端下榻深懇渴想。爰不揣謬。恃託神交。時得開函而如面。則慶幸何如。茲肅者。友人楊君之子。今年齡十九。勤讀詩書。約在十六七歲時。先有白濁之患。繼有夢遺之苦。乞診於予。余曾受業於興化魏小泉先生。予治以滋陰泄熱之品。近來較前稍減。一月約有兩次。體瘦肉瞶。健忘耳鳴。心悸頭空眩。神疲氣悶。小便短黃。陰毛既發。而生殖器細小。如未成年者狀。惟陰莖時短時長。並易勃起。勃起時。龜頭突出。而小精易出。且乳頭不高。起據述從前年稚無知。思想不正。予爲之一再診察。斷其相火亢進。遺泄太早。含苞之花。遽被摧殘。以致龜頭睪丸大傷。失於涵養。此乃生殖器發育不全。前楊君囑予向幸福書局代購腎病研究。以資參考。購來覽及。兄所立陰莖短小簡治法。但此法弟亦曾於遺精廣論見知。

之並已經俾其遵藥物治療。自然療法施治不但罔效。且有瘡癤流弊。諒因藥丸不合症情故也。竊醫家本仁濟爲懷。且弟與楊兄情闊至契。故不得不於無法中窮求方法。以希完全功效。此因僅恃藥餌無功。非求他法兼治不可。(下略)

答……發育不全。關於先天。矧後天思想不正。而更加以摧殘耶。雖有治法。恐難收效。蓋人力難奪造化之力也。

(二)

問 鄙人因小時被下人將生殖器玩弄。致生殖器於小時即脫壳。後鄙人因年小不知。再犯手淫。今則年大。略無之事。因之不犯。然鄙人今年已十七。而身小若幼。年幼如此。慮恐發育不全。(單金達)

答 身體長大及短小。關於先天。實無法可施。手淫能致發育不全。此後宜勉力戒除。此惡習。節制性慾。全心妄動。靜養數年。亦能恢復健全。惟恐足下無恒心耳。

## 陰莖短小驗方選

尤學周

庫存

不外售

074

火燉酥如網油。常服不斷。如此五六年始發育如成人。直隸贊皇孫陸敬之爲循吏。陸某之孫生而天闔。後得一方。用何首烏。生取汁和人乳服之。三四月後下部時覺熱氣衝動。五六月後漸發育。一年後竟生子矣。(蔡濟平)

(學周按)陰莖短小。有由於先天不足者。有由於後天斬喪者。先天不足。名曰天闔。顧名思義。即知本症之不易圖治矣。後天斬喪。多於青年發育之時。性慾不節所致。較諸天闔。尚有挽救之希望。本節應用之二祕方。竟能使天闔者成爲偉器。女媧補天功亦偉矣。苟用此二方施之於後天斬喪者。如響斯應。意中事也。然實際上恐不能如天闔者見效之捷。蓋得諸先天者。早存絕望之心。於性慾一事。已屬無緣。而一點真陽。反賴以保持。加以相當之養料。不難欣欣向榮。其由於後天斬喪者。不特一點真陽不能保全。且習慣成自然。放心不求。一時亦難於控制其慾念之不發。雖有良方。其如不能得力何。

## □陽痿早洩

朱振聲

問。敝外幼犯手淫。以至遺精十有餘。日間稍覺疲乏。夜必患之。百不一償。每月至多。雖祇二三次。而精神不振。記憶力銳退。面色蒼白。結婚之後。竟不克盡其人事。一觸即

洩。有時未作入幕之賓。已倒戈先遁。鳩片煙本有固精之能。服之絲毫未見效。驗市售丸散。亦曾試服數種。均如石沉大海。影響全無。七寶美髯丹亦服數兩。未見功效。本草謂洋虫九枚。用蛇床子湯沖服。能壯陽。事服之亦未見効。每責其何不早醫。據云。碍難啓齒。以至一誤再誤。在未結婚以前。尙未感有何項病苦。結婚後。雖亦在外日多。而工作繁勞。因是精神日見衰敗。甚至心有所動。精已遺出。前年尙能自動堅強。去歲大病之後。不復自主矣。卿雖不負我。我實負卿。予聆斯言。五內欲裂。雖自歎命薄然。亦無可如何也。彼旣未能盡其夫職。巧婦又何能爲無米之炊。翁姑對予頗有煩言。(意謂不能生育)予祇有暗自飲泣而已。近檢本草。謂陽事不起。用五味子研末。溫酒下。忌猪魚蒜醋。百日自見功效。法雖簡便。予因不知藥性。未敢令彼嚐試。所謂忌猪魚等。是否服五味子後。即不能吃猪肉魚等。又日前見貴報。某君問蕊容及○○○等分研末。陰乾○○能令陽事強大。(藥名製法用法。均已忘記。能再見示。尤甚感激)。敝外陽事。據之較前縮小甚多。未知亦能仿用此法否。予因頻受翁姑及妯娌冷譏熱笑。難以自堪。外子旣目不識丁。就醫又碍難啓齒。故不瑞冒昧。將種種情形。錯雜直陳。懇乞

貴報各大醫師。詳細指示。賜予簡易良方。俾外子恢復康健。

實不啻再生之恩矣。肅此奉懇並頌。

大安

嚴嫵梅鞠躬

答 由手淫而遺精。由遺精而陽痿早泄。因腎陰虧耗。以致性神經衰弱。夫婦之道。固不僅求性慾之滿足。而處於「無後為大」觀念之舊式家庭之中。將產生不良之結果。而招芻姑之歧視。固意中事也。身為女子者。既不能暢其床第之歡。復受「不育」之母妄之謠言。其痛恨為如何。然處此環境之中。既然「自嘆薄命。無可如何」。則當代為設法。於絕處求生路。常人對於本症。祇知服藥。一若藥石萬能。除服藥而外。無別種方法。不知本症之發生。由於縱慾太過。服藥以補償其所失。固無庸議。性慾貴有節。縱慾成疾。尤當「絕慾」。首先降伏其心。不使妄起慾念。再則不行房事。夫婦分床。禁慾一二年。枯楊始有牛梯之望。服藥「無比山藥丸」「加味金剛丸」。皆可服食。然亦非一月二月之功也。

## □ 陽痿之原因及療法

沈熊璋

名稱——一名陰痿。亦名陰莖勃起障礙。即當交媾時。陰莖之擴大不足。硬度減低。或全無奮起力。因之不能插入女子腔中之謂也。

原因——有一時性陽痿與持續性陽痿之別。一時性陽痿

攝生——食滋養之物品。（如牛肉汁。鷄肉汁。雞卵。魚肉。肉鬆。荳腐。杜仲各一錢。肉桂。茯神各二錢。白朮五錢。人參三錢。鹿二仙膠。（龜版五斤。鹿角十斤。杞子一斤十四兩。人參十五兩。熬膏。）

症狀——局部為陽物軟弱無力。全身則現虛弱症狀。

療法——赤脚大仙種子丸（全當歸。肉蓯蓉。蓮鬚蕊。杜仲。

菟絲子。淫羊藿。潼蒺藜。茯苓。破故紙。牛膝各八兩。枸杞四兩。枚蜜丸。）傅青主方。（熟地一兩。山萸肉四錢。遠志。巴戟。天

肉。桂心二兩。綫魚膠二斤。大天雄每枚重一兩四五錢者二枚。蜜丸。）傅青主方。（熟地一兩。山萸肉四錢。遠志。巴戟。天

肉。桂心二兩。綫魚膠二斤。大天雄每枚重一兩四五錢者二枚。蜜丸。）傅青主方。（熟地一兩。山萸肉四錢。遠志。巴戟。天

者。有由於精神過勞者。有由於飲酒過度者。有由於睡眠不足者。有由於機能廢弛者。（如獨身主義者及佛教信徒。因生殖器官久廢不用。致勃起力減弱或缺如。）有由於精神感應者。（如老人與少女交接。自慮持久力不足。）

以羊腎或羊肉和米煮粥爲尤佳。爲規律之運動。（如球術拳術郊行乘馬皆可。惟須有一定之時間持續之恒心。及勿使太過爲要。）行局部之冷浴。（以冷水灌注生殖器及脊柱。復以毛巾拭乾。）保精神之安靜。杜淫猥之言行。預後——苟非重篤之症。皆有治愈之望。一般之患陽痿者。每焦灼憂鬱。若搜沈疴。此大誤也。考陽痿非死症。充其量不過喪失床第之歡耳。夫床第之歡。爲使神經感覺愉快之一種方式。並非舍此方式。即無快愉可得。如伴愛人。小語於綠蔭之下。徜徉於山水之間。如與嬌妻。歌唱於明月之夜。舞蹈於氍毹之上。此種精神之愛戀。實人生無上之幸福也。

## ○陽痿治驗

梅竹洲

謝君係余學生。少隨讀書娶妻多年。未有孕育。在伊父久欲稱公。奈伊兒艱於生子。本擬小星之詠。飾說大婆之難。實在下體沾病。有不敢遽出諸口者也。未幾伊父逝世。而宿疾方師有何不便之處。後乃含羞細語。謂老蚌間有珠。吐枯楊難。望稀生。吾之陽具其不舉者。既有年矣。未知先生有無方法。余說此陽痿之証。實爲房事之累。與補中益氣湯去生薑陳。

皮加杜仲。杞子菟絲。巴戟。淫羊藿。陽起石。海狗腎。驢鞭。鹿鞭等味。囑他多服。定可壯陽。第要守身。毋生妄念。否則不惜元氣。服藥無益。彼曰。唯唯。惟命是聽。從此靜養。數年復娶。簉室竟生一子。何幸如之。此證暫則易療。治法不外補腎壯陽。乃爲根本解決。所以補中益氣湯加減。原方爲氣虛下陷。而陽痿又是氣虛下陷。故低垂弗起。所以用參者。以補氣。提其陽。即以起其痿。當歸。補血。俾血液充滿海綿體。則陽具自然膨大而勃起。何有致於陽痿耶。白朮。甘草。甜則入脾。稼穡作甘。以補其中土。即內經所謂精不足者。補之以味歟。且脾爲後天。飲食入胃。自能滋生先天之腎。腎氣足。則陽不痿。加以杜仲。杞子。菟絲。巴戟。補腎壯陽。陽壯則陽不至痿。合之柴胡升麻。俱以升其陽氣。陽氣一升。亦不致於痿。海狗腎。驢鞭。鹿鞭。以三獸之鞭。久戰不屈。屢戰不休。取其象形以治。從頸而施。有大補元陽者也。至淫羊藿。其梗如草梗。葉如楓葉。一說此草主淫。有土人看見。白日無風。美女經過其地。距離尺許。霍然低垂下拜。似人點頭頻頻一般。一說北部有羊。一日百戰。因食此藿所致。故名陽起石。出齊州。雲母根也。嘗有大雪。偏墮而此山獨無。以陽氣蒸騰。熱氣突起。乃得。天陽之氣凝結。而爲石之精。故大雪之寒氣。不敢逼近。此諸薑以治也。葉大士云。淫羊藿治陰虛陰痿。巴戟天治陽虛陰痿。陰陽並施。得

效是易。有是病必有是藥。非是也。不能治病。中醫藥其可廢乎哉。

## 口腎萎及其種類

昌

腎萎即是一種男性的性的障礙。陰莖無力勃起以與女性交接。腎萎由來可分生理的先天的及後天的三個方面。男子到了年老力衰的時候性慾減退甚或完全消失了性的要求。這是生理上的普通徵象也。即所謂生理的腎萎。有些先天睪丸缺乏（天閼）或者生殖器構造畸形沒有性的要求。或者不能與女子性交的人。這就是所謂先天的腎萎。後天的腎萎原因比較複雜。但是牠的原因不外乎受人爲的病害所促成。譬如因睪丸的疾病而行切除術。性的機能即喪失殆盡而成腎萎。不過兩個睪丸倘然尙留其一時。那末不會因切除一個而呈腎萎的現象。又譬如有些患病。如糖尿病。腎臟病。以及其他慢性的全身衰弱病患者。肥胖。脊髓癆患者也能使生殖器始則勃起衰弱繼至完全不能勃起而成腎萎的。腎萎的由來和症狀既有這許多不同。因此腎萎的種類可依病原病症的各異分爲下面的四種。（一）器質腎萎（二）精神的腎萎（三）神經的腎萎（四）

麻痺的腎萎

## 口夾陰傷寒驗方選

尤學周

夾陰傷寒乃房後感寒直中陰經之惡症也可分急性慢性二種急者陽物即時縮入腹內疼痛難忍陽物縮盡性命即不可保。一時無藥可用即將陽物用手握住毋令再縮隨用錫壺或酒壺（若無錫器瓷器亦可）內盛沸水隔衣重按臍中陽物即出（若不隔衣用紙一二重隔住亦可）。因恐底太熱灼傷皮膚也。

又法用洋硫磺三錢研細末沸黃酒冲服。陽物立出此余家世傳之秘方也。萬試萬驗。若牙關緊閉陽物業將縮盡者。則找一未生老毛之小鷄雛活搗極爛加量便少許壓取濃汁。揭牙灌下立甦。

以上皆急性夾陰之治療也。其慢性者多發於房後數小時或半日或一二日不定。初起祇覺腹痛沈沈漸痛漸劇繼復不覺痛。舌漸強而致不能言。心中雖醒而週身百節既不能如意運動。疾狀至此誠可危矣。急取小雄雞一隻重量在一斤以內者活剖其腹不去腸雜。覆臍上少頃腹中雷鳴渾身汗出即愈。此法奏效神奇。萬試萬驗。確能起死回生。讀者幸勿輕視。若覆臍時再加麝香少許於臍內則取效更速。此皆

經驗之談也。（鍾俊麟）

(學周按)飲食男女人之大欲存焉。然飲食無度必傷胃腸。

男女之間狂浪不羈亦必發生種種疾患。急色之子縱慾無度。既不審天時。復不擇地利。所謂桑間濮上。無處不可實行。其洩慾主義。此與饕餮之徒同一易於發生疾患。此輩不特易感夾陰。且有脫陽之患焉。

漏上已去世之某名醫。以善治夾陰而得名。法用鵠一隻。剝其腹入麝香少許。縛臍上。此與本節內用小雞法相同。此病有急慢二症。某名醫之用鵠。僅知慢性之治法。而急性之治法。尙未之前聞。得此篇。可以補其闕略矣。

下疳包皮腫驗方選

尤學周

患下疳者。其人若爲包莖。則必於潰爛之時。同時包皮發水腫性之腫脹。腫脹之皮膚發有光澤之水紅色。內含水分。以指彈之即可破。此症殊爲困難。既感腫墜之痛苦。而包皮腫即不可翻上。洗瘡敷藥。又感困難。因之包皮內部愈加潰爛。若不先消去包皮之腫。斷難收治愈之功。顧治法雖多。每不能速效。茲將一最易而最有實驗之祕方錄之。以貢於世。其法用鮮馬齒莧一握。搗之極爛。納入青黛細末五錢。川連細末三錢。冰片少許。共搗成糊。用蠟紙或油紙攤勻。包於陰莖上。每早晚各換一次。二日可消。包皮腫消即可翻上。而

由白濁而起之囊癰

尤學周

(學周按)包莖之人。有因包皮太小。不能下退等。有因包皮太長者。最易藏垢納污。故宜常洗滌。患包莖之人。若尋花問柳。其毒裹於包皮中。最易傳染花柳病。患此者。宜深加注意。馬齒莧爲清熱解毒妙品。以之治白帶白濁。皆甚靈妙。佐以青黛川連。退毒之力尤偉。此方不特可治包皮腫。一切熱毒皆可用之。

由白濁而起之囊癰 尤學周

囊癰。即睾丸炎。其原因多由溼熱下注。侵入睾丸而起。患白濁者。每易變生此症。大凡此可怕之囊癰患者。十有六七。由白濁而起。白濁之爲害。亦大矣。

白濁初起。失治似愈非愈。病勢蔓延。及於腎臟。則腎臟疼痛。及於關節。則關節疼痛。及於睾丸。則睾丸疼痛矣。其痛時作時止。作時脹痛徹骨。不能久耐。輕者稍覺牽引。如電光之閃。牽及胯下。惟一閃即止。此時可用生薏米一兩。北沙參三兩。淡吳萸一錢。海桐皮四錢。煎日三服。如於牽痛之時。不加注意。則病情更進。脹痛無有已時。則用仙方活命飲。穿山甲一錢。兒角刺錢半。當歸尾錢半。甘艸節一錢。金銀花三錢。炒赤芍一錢。乳香一錢。沒藥一錢。天花粉一錢。防風一錢。大貝母

一錢白芷一錢陳皮錢半水酒各半煎服。

## ■膀胱左面漲大

萎腎弱治之法以麻黃根二錢飛滑石六錢牡蠣四錢蛇床子五錢密陀僧三錢赤石脂三錢冰片四分薄荷二錢均研爲末調勻數摻惟有血毒者不效應另診治內服導濕解毒清血之劑。

問鄙人幼時多病十一二歲時會發虛腫病平時稍有頭暈耳鳴等症前年冬季下部左面膀胱之筋忽覺漲大惟無任何痛癢至去年夏左膀胱之筋略大行路時該筋恒有小痛月可一二次其痛時間約一二分鐘而精神亦甚憊乏今年春鄙人返家就醫診治據云元陽氣缺乏虛濕火亦盛但診治匝月無效也如故嗣即回淞因思長此以往甚覺危險

且鄙人身任跑街職日奔走於道途之中苟不亟圖補救則前途焉堪設想用特函詢先生用何法以補救之（霖松）答敬啓者該症甚難確定惟奔走則易於牽動最好改換職業得能休養在未明症情以前不敢遽定內服方試用白芥子一錢香附二錢赤芍錢半研末熱醋調敷

## ■陰囊濕癢

仁

陰囊濕癢由於其人分泌水濕之機能不發達濕濁停留爲患若其人血分較熱喜飲酒食厚味則爲患更甚又有一種係因白濁之毒遏伏所致患此者陰囊時常濕潮癢不堪耐入夜更甚有腥臭之汗液久之必延及跨間兩股且令人陽

## ■囊癰

腎腫破爛子出落南星蘇木紫蘇共研細末各重五分香圓（即佛手柑）切碎同入公猪尿脬內好酒三斤煮爛搗丸日夜服之按南星治風散血祛風紫蘇和血止痛香圓理氣健脾公猪尿脬用爲諸藥響導又借酒力以和之故佳

## ■前陰腫治驗

陳應期

清宣統元年八月間李村張正猶伊兒兆新四歲前陰腫痛民國六年五月間龍仙岡廈陳壽麟十二歲前陰腫痛民國二十一年三月間岡廈陳自飄伊男志養十四歲前陰腫痛俗名火綻令均用蚯蚓擂白糖搽敷數日腫消痛止盡告平安民國八年岡廈陳新飄三十餘歲亦是前陰腫痛醫者誤以花柳藥治之升丹爲丸一連三日每服丹丸數粒變本加

厲以致口腮爛痛。牙肉盡腫。真是上腫下腫。上痛下痛。上下交征。幾不聊生。改延別醫。亦無效。果伊欲自裁。他母問余。有無別法可救。隨即臨床問他。病情如何。據說前陰腫痛。余亦信其無他。不過爲醫所誤。囑伊亦用蚯蚓插白糖。搽敷數日。腫則全消。第有白濁血淋。便溺如同刀割。另與四苓散。并卑蕤分清飲。合方而治。數劑而愈。所以然者。蚯蚓上應軫星。軫水爲蚯。則下飲黃泉。水即以導足少陰之腎水。而濟足厥陰之相火。蚯又上食穉壤。加以白糖入脾。據恰蚯引腹。坭又以滋足陽明之胃實。而燥足太陰之脾溼。故能應手。

## 男女前陰腫痛

陳應期

前陰者。後陰之對也。前陰居身之前。後陰在背之後。爲穀道。爲糞門也。前陰在男子。則爲陽。具爲生殖之器。前陰在女人。則爲陰戶。爲生育之門。考之臍下爲小腹。小腹兩旁爲少腹。小腹者。少陰水臟。少腹者。厥陰肝臟。內經云。腎開竅於前後二陰。是前陰者。屬少陰也。經又云。前陰者。宗筋之所聚。太陰陽明之所合也。以陽明主宗潤筋。是前陰屬太陰陽明也。總之經絡貫通。萬殊一本。而其要則歸結於厥陰肝經。夫肝經藏血。主筋。若果血熱。作劇筋被火灼。而熱毒發。現以致前陰腫痛。其平素清操。并未有臥柳眠花者。則外症須當外治。內

服難以圖功。外療易爲奏效。理或有然。試之屢驗。是則外治之法。實足以助內治之所不及。云爾。試言男子。其在巫雲楚雨。迺地花天。自行作弊。而毒染前陰者。無論已。即以平人言。之守正不阿。他無別病。而突於前陰之處。忽而紅腫。忽而痛痒。此證之重要。關係非輕。治之非容易也。實在治得其人。究無難事耳。何者。時當酷暑。火傘高張。行路維難。囊中伏熱。操工困苦。袴下薰蒸。倏坐坭坪。而補襦火燒。適爲熱氣所加增。因而毒發前陰。腫大宏長。痛不忍。有呼號。叫苦焉者。治以蚯蚓數條。白糖少許。擂融坭漿。敷之患處。常蘸常搽。而腫消痛止。真有實驗之單方者矣。若說女人。其爲皮肉生涯。包辦奇貨。自貽伊戚。而毒惹前陰者。弗究已。即以常人論之。守貞待聘。不染淫邪。而忽於前陰之間。倏然腫脹。倏然痛爛。此證之艱危。非同小可。治之亦屬爲難也。實則治有其方。頗易見功耳。此症之起。天或陰沉濕熱。反伏治田。少息勤續苧麻。採樵餘暇。帶做針指。突坐草頭。而陰戶腥羶。致爲土虫所仰吸。因而吐毒。前陰腫浮。高凸痛極。非常有涕泣悲啼焉者。治以狼毒數兩。煎水常洗。朝夕無間。洗過數日。不知不覺。而腫散痛除。此又爲實驗之單方也。

## 陰戶腫痛外治方

羌活防風。葱白各一兩。煎湯薰于陰戶。能消腫止痛。有神效。  
按。製字者。以風字從虫。蓋知空氣中多微生蟲。而風邪之病。  
亦多由微生蟲之爲患也。故中醫祛散風邪之藥。皆能治西  
醫所謂之細菌病。且有特效也。陰戶腫痛。亦必有細菌生焉。  
故以防風羌活葱白之祛風藥薰之。可以愈也。

## ■女人陰中作癢

蔣一鳴

女人陰中作癢。乃濕熱下注。及早治之。斷根甚易。惟女子羞  
惡心重。下部陰曲之事。最不願意告人。因循失誤。久則難治。  
成爲終身之累。此症初起。用杏仁輕粉水銀雄黃四味等分  
研勻。爲細末。每五分。以棗肉一枚。和爲丸。以絲綿包裹。留一  
線條。擦線在外。先用荷薄百部濃煎。洗陰戶。然後將藥納入  
陰中。留線在外。如欲小便。取出便過。再納入。一日一換。另用  
當歸白芍。生地川芎。黃芩黃連。山梔柴胡茵陳。知母龍胆大  
黃等涼營瀉火之品。煎湯內服。(便利者不用大黃)重者  
四五日可愈。

或用活蚌一個剖開。將有肉半個。對陰戶合一夜。次日再用  
一個。可以安全。蛤蚌不必用大者。普通河蚌亦足應用矣。(

編者按)陰中作癢。亦有由於血虛所致者。宜明辨。果由血  
虛。當用補劑。

## ■婦人陰道分泌液過多之疾患

明哲

婦女陰道中。時下白色粘膩之液。其甚者。有如膿樣。人皆謂  
之白帶。婦女病此者。十居八九。致病之原。不一。如花柳毒之  
淋菌。子宮內膜炎。膀胱陰道炎。惡性腫瘍。蛲虫。腺病。萎黃病。  
充血壓感。疼痛。惡寒發熱。尿意頻數。交媾及排便。均有障礙。  
久之轉爲慢性。帶下增多。貧血。便祕。食思不振。交媾不歡。因  
之受孕無望。

從女子體上的炎病而死。以及從大多的痼疾而死。聞說有  
百分之九十。乃起還于此的淋病。尚有一種可怕的結果。能  
使產兒瞎眼。此事久已證明。據一八八四年眼科學會所報  
告。在英國四個盲人院中。有百分之三十五至百分之四十一  
的小兒。因是而盲目。全人類中。因受感了母親的淋毒。而至  
盲目者。其數甚巨。大都於胎兒出體時。受體的淋菌所侵入  
而盲目。故犯有淋病嫌疑的母親。應于生產時。請醫生防範。  
產兒的眼。

## ■陰毛八角虱

人陰毛中生虱。名八角子。貼伏毛根。最癢惱人。相傳此虱不醫。延及頭髮眉毛。其人當死。治法以銀杏搗爛敷合毛上。隔宿其虱盡死。余少年曾患此。用此法神效。有友爲余言。生此虱者。運會將否之兆。余患此之後。抱病十餘年。備嘗苦楚。其言果驗。(內翰良方)

(按)余友方君。近日亦患此病。一日相值。問余以何法可治。余即囑用上法。有效與否。尙未得悉。惟方君年來。遭際不佳。潦倒風塵。孜孜謀食。無暇注意清潔。醞釀而生虱也。所謂運會將否者。其說亦不能否認。惟因果倒置耳。實則其人生八卦角虱者。其運會早已否矣。

## 婦女隱病治驗記

陳益生

婦人交接時。或違生理。有終身之疾。轉展求治不愈。亦有因治不得法而喪生者。竹林女科症治求嗣法中有云。「凡交接不可大肆出入。密密揉之可也。若大肆出入。胎風自不免矣。」是以交接大肆出入。圖快一時。而胎未成。寒風更易竄入。蓄久內舍骨髓。易成湯藥不逮之症。醫者苟不體會病原。隱情。妄施藥石。不免僨事矣。矧男女者。人之大欲存焉。夫男子身中之機。既能因情勃起作強。豈女子不能因感而勃發吸弛。中國素重禮教。即有情感。每不肯言。曾治某婦。患腰折。

骨間行疼。摸不到患處。胸有焦臭。上冲舌絳無苔。脈象細緊。擬用溫化。礙其焦臭。清之臭焦化而疼折加重。察婦神情流動。似蹈求嗣法所言之弊。遂囑購肉桂末一錢。用絲棉包裹。外潤蜂蜜。剪透一頭。向上納入陰道。經數小時。遍體汗出而愈。又丁卯仲冬。舍姪媳生產。未幾即將所着布裙脫去。至五日後。其腹脹若未娩。反板硬掣痛難轉側。余曰。此拘骨傷寒。重症。係未拘骨。陷風寒由產門內竄也。前法不數時。汗徹已軟縮矣。推而廣之。凡產後驚風。及倦怠骨疼。諸治不效者。慨可以此法治之。費省效捷。故登本刊以廣其傳。並願兩性知寡慾。享康健福。

## 遺精

守淵

所謂遺精。就是在睡眠中。不知不覺地從精囊中。排洩出精液來。同時身心即起一種不愉快的感覺。這種於深夜睡眠中。不自知覺的精液排洩。並不完全屬於病理的症象。許多人偶爾排洩精液。是屬於生理的自然現象。要判斷這種遺洩。是係生理的自然現象呢。抑爲性神經衰弱的病象。那時要看這種遺洩的相隔時間之長短。與遺洩以後的身心精

神的影響如何為定。大體地說。如遺精的時間。每次在一週以上。或每隔數週遇有一次的遺洩。於身心精神毫無不良的異常感覺的。都可以說是生理的現象。反之。若遺精次數增多。每週有數次或每晚多至數次的遺洩。身心精神上都因此而行起不良的影響。這無疑地是該歸之於病態的範圍。亦即所謂性神經衰弱的顯明表徵了。

這一種病理的遺精。對於身心精神上所引起的不良影響。是些什麼現象呢？大概在日常遺精以後的結果。身心即呈疲勞狀態。他如頭昏。頭重。耳鳴。目眩。心悸亢進。四肢疲乏。背部酸痛等。都是遺精者最習見的症狀。精神方面則感覺鬱迷朦。心境時常悲觀不樂等現象。這種遺精後即發生的身體的倦怠疲勞與精神上的抑鬱。朦朧的程度。是跟着遺洩的密度。即遺精回數。而不同。大概極度的重症者。幾乎每晚均有一次或數次的遺洩。因之身心之疲勞。達於極點。精神上的抑鬱。亦莫可言狀。對於社會事業。個人前途。均抱悲觀主義。什麼事情。都沒有念頭。沒有興趣想做了。

尚有一種。除晚間有習慣性的遺精之外。在日間亦有遺洩精液之事。如白晝看見異性女色而興奮勃起。或大小便後之輕微刺激。即能使精液遺洩而出。這種漏精現象。當然屬於重症的性神經衰弱的病理範圍了。

至於遺精的原因。第一要算是由於性神經衰弱了。（本來遺精為性神經衰弱的主要症象。上文已經說過。）而造成性神經衰弱的最大原因。則莫過於慾過度與手淫了。尤其是手淫。可以說是青年界所犯最普遍的惡習慣了。我們每週接到讀者們因犯這手淫惡習而至遺精一類的疾患的通訊信件。真是太豐富了。幾乎無日無之。這足見手淫確是青年界造成遺精一類性機能障礙的最大原因了。又有因避姪而輕常採用避姪套或房事時使其不排精而中止性交等。等等往往亦引起性神經衰弱而得這不良的遺精惡疾哩。此外也可不由於性神經衰弱。而由於生殖器或泌尿器官疾患而成功的。如先天性的包莖（即包皮過長緊包龜頭。不能或不易下反者）。及後天所傳染的白濁症患者。最為習見。又如攝護腺炎及攝護腺腫大等疾患。以及膀胱炎。膀胱結石。尿道炎。尿道狹窄等。等。均能為遺精病象的。

現在要來說遺精的療法了。我們每次接得讀者的問病信件。在敍述病者遺精的種種現象。種種痛苦之後。接着不就是「請貴大醫師本慈悲的心腸。速賜根治方藥。以解除病者的苦海呵」的哀求苦語嗎？可是我們的答復除了勸告原因療法。以及種種攝生方法以外。多是沒有給與以方藥的處治的。這不是我們不給與病人以藥到病除的方藥。以

解除問者的病痛。却是因為凡屬這遺精一類的性機能疾患。戒除引起性神經衰弱的誘因（行爲）和平日切實努力攝生而外。是沒有更對症的「藥到病除」的方藥的了。遺精並不是一個獨立的病症。他只不過是他種疾症——尤其最多的是神經衰弱的症象耳。故治療方法亦惟有設法除去造成遺精的原因。才是根本辦法呢。

除由於生殖器或泌尿器等等的器官疾患而起的遺精。應當就醫對症處治——如包莖者須用術開割之。有白濁症者須照白濁治療等。而外。若由於一般的性神經衰弱而就者。則須從戒除並注意造成性神經衰弱的原因。始有治愈的希望哩。譬如由於性慾過度的。應由節慾着手。由於手淫的先應戒除手淫的惡習。始有恢復健康之望呀。那末。遺精病人會應該注意些什麼衛生方法呢。現在來把他主要的攝生法寫出來。以供遺精病同人們的參考。

由於手淫而成功之遺精。不消說須要患者具有堅決的意志。戒除的決心。並須保持心緒的清淨。拋棄一切不正的慾念。把整個的情緒精神放到有益的事情上。改變易於引起性的刺激的生活環境。避免富於衝動的目觀耳聞。飲食方面舉凡富於刺激性的東西如酒類。烟草。咖啡。濃茶等等嗜好品。均在禁忌之列。即普通飲食物亦以清淡為主。萬勿。

飲食無常。暴飲亂食。性愛小說。性愛電影。以及淫污的繪圖。亦能引起遺精患者的性衝動。而增加其病體。故亦勿去看爲是。如在便意之時。應立即小便大便。因飽滿的膀胱與充實的直腸。均能刺激尿道精囊。而誘起遺精之結果。睡眠時飲食不宜過多。不宜多進茶水。腸胃過於飽滿。不易入睡。亦爲引起遺精之原因。被褥亦不可過於溫暖。睡眠時穿的短襯衣褲。切勿過緊。以減少刺激的誘因。

對於生殖器的局部。每日可用冰水洗滌。一則能供龜頭清潔。龜頭周圍的不潔污物。停留着時。亦能刺激生殖器而引起遺精。二則冷水洗滌。減少生殖器溫熱。則減少其興奮的機會也。其實每天能行冷水浴。直接減少性興奮的良好方法。間接即有益效於遺精患者呢。故凡遺精患者的同人們。

儘有一試之價值哩。

運動。對於遺精。如能行之合理。亦能俾益于患者。但切勿作身心過勞之運動。否則無益而有害。精神勞動者。應減少其費神勞心的工作。避免身心的過勞。又患者在攝生治療的過程中間。須保持能自治愈的自信心。切勿終日憂鬱。朝夕不安的懊惱煩悶。精神的抑鬱不樂。能使病體更加陷于悲

哀不救的境地的呀。

至於藥品的療治。當然要請告醫師。不可自行亂投藥餌。更

不可輕信報紙上的誇大廣告的成藥。什麼立止遺精丸。什麼一盒斷根無效還洋等等的口號。那十九是欺騙病人的勾當。一上了當。輕信了牠。而忘了攝生。那損失幾個金錢。到還是小事。弄壞了身體。倒不是玩的呢。況且對於這種病症。藥石的效力遠不及攝生療養。藥石只得做做攝生療養的副手罷了。這是凡舉遺精患者的同人們所極應注意的一點。

藥石的效力遠不及攝生療養。藥石只得做做攝生療養的副手罷了。這是凡舉遺精患者的同人們所極應注意的一點。

## □ 精病概說

茹十眉

### (一) 精之來源

精之來源。本涵諸血。真銓曰。五臟各有藏精。並無停泊於其所。蓋人未交感。精涵於血中。未有形狀。交感之後。慾火動極。爲週身流行之血。至命門而變爲精。以泄焉。故以人所泄之精。時於器少。拌鹽酒露一宿。則復爲血。內經則曰。腎者主水。受五臟六府之精而藏之。考之西醫。則謂睪丸爲造精之要。具至春機發動期。則睪丸中之精液細胞分化精液。而由輸精管運至精囊存貯。以備交合時之放射。然亦未盡精之所由來也。故應以中醫之學說以補其不及。

精能生氣。氣能生神。榮衛一身。莫大於此。養生之士。先寶其精。精滿則氣壯。氣壯則神旺。神旺則身健。身健而少病。內則五臟敷華。外則肌膚潤澤。容顏光彩。耳目聰明。老當益壯矣。故靈樞謂精爲身之本也。

## (二) 儲精之法

精既可寶。則宜設法以儲之。或問儲之之法。若何。曰節慾是也。養生書曰。人年四十以下。多有放恣。四十以上。即頓覺氣力衰退。衰退既至。衆病蜂起。久而不治。遂至不救。若年過六十。有數旬不得交合。而意中平平者。自可閉固也。又云。凡覺陽事輒成。必謹而抑之。不可縱心極意。以自戕也。若一度制得。則一度火滅。一度增油。若不能制。縱慾施瀉。即是膏火將滅。更去其油。可不深自防也。

### (四) 補精之方

精之不足者。多見腰背痛。而脛痠。耳鳴目昏。而眩冒。補之之方。宜求諸五穀。蓋世間之物。惟五穀得味之正。但能淡食最能養精。凡煮粥飯。而中有厚汁。滾作一團者。此米之精液所聚也。食之最能生精。其或甚者。始宜補之以藥餌。如人參固本丸。(人參二兩。天冬。麥冬。生地。熟地各四兩。蜜丸) 班龍

丸（鹿角膠。鹿角霜。菟絲子。柏子仁。生地黃各八兩。白茯苓。破故紙各四兩。米糊和丸）等劑是也。

### （五）遺精論治

遺精之因有三。一由色慾過度。二由勞心太過。三由濕熱下注。三者之中。色慾過度者占其半。故多患之於青年。其一月一遺。而明日不覺。忘之者不足爲慮。一月三四遺者。輕一晩數遺者。則元陽要盡。最爲危險。急宜施治。固真丹（蠶蛾二兩。肉蓯蓉。白茯苓。益智各一兩。龍骨五錢。爲末。鹿角膠酒浸化。開和丸梧子。每服三十丸。空心酒下。乾物壓之）。保精湯（當歸川芎。白芍。生地黃。薑汁炒麥門冬。黃柏酒炒。知母蜜炒。黃連。薑汁炒。梔子童便炒。乾薑炒黑。牡蠣煅。山茱萸肉各五分。水煎。空心服）。黃連清心飲（黃連當歸甘草茯神酸棗仁。遠志人參蓮肉各等分。每服五錢。水煎服）。皆可選服取效。

### （六）滑精論治

不因夢而自泄者。謂之滑精。其症險於遺精多矣。宜即服固精丸（知母鹽水炒。黃柏鹽水炒。各一兩。牡蠣煅。芡實蓮花蕊。白茯苓。遠志各三錢。龍骨二錢。山茱萸五錢。糊丸。空心鹽

湯下五十丸（或鎖陽丹）。桑螵蛸。三兩。龍骨。白茯苓。各一兩。糊丸。煎茯苓鹽湯下七十九丸。治之。

### 口談遺精

潘蘭坪

遺精當辨有夢無夢與濕熱之因。有夢治心。無夢治腎。濕熱治小腸膀胱陰虛者。填精陽虛者。補氣陽強者。瀉火。故前賢治法有甯心益腎。填精固元。與清利濕熱之別。茲先擬寧心益腎固攝之劑。以便因各見症加減治之。

桑螵蛸三錢。雲茯神三錢。大麥冬二錢（連心）。建蓮米五錢（連心）。熟棗仁一錢半。遠志肉五分（製）。敗龜版打碎五錢。生龍骨打碎三錢。二味先煎。或加菖蒲。雲連各三錢。杜仲。白朮等（去龜版。麥冬。龍骨。桑螵蛸）。陽加熟地。天冬。阿膠。當歸等（去棗仁。遠志。茯神）。陽虛加人參。黃蓍。杞子。杜仲。白朮等（去龜版。麥冬。龍骨。桑螵蛸）。陽強加生地。知母。黃柏（去棗仁。遠志。茯神）。遺泄頻頻。宜佐以固攝之品。如菟絲子。五味子。覆盆子。金櫻子。蓮鬚之類。選入一二味爲佐使。至若精遺因濕熱者。宜另用猪苓湯法治之。（如芡實山藥沙苑蓮米。凡遺泄症皆可常食。）

### 口夢遺

守淵

對於遺精的種種情形和攝生的大要。上節已經述說過了。這兒所提的夢遺。實際上和遺精沒有絕對的區分的。如果要望文生義的分別起來。那他們的相異之點就在「夢遺」是有着與異性或將與異性發生性的衝動或幻覺後而流出精液來。不若在遺精時的排洩精液。在乎不自知覺之中。故夢遺是有着隱約或明晰的夢的境象。同時亦有與交合時行將排洩精液的極度興奮時所有的恍惚狀態的性的快感。而遺精則否。不過此種恍惚狀態的性的快感。只不過是極短極短的一剎那。這種感覺全然是精神上的反應和幻覺。

這種因有夢境而排洩精液的夢遺。如果也只不過是偶爾的發現。而不是經常的發生。當然亦無多大影響於身心的健康。這與偶然或相隔期間頗遠的遺精現象一樣。都不好算作病的現象。反之若經日連夜的發現夢遺。那也與經日連夜的遺精無異。當然能影響於身心健康。病象了。不過在這深夜夢遺後往往容易引起青年們的非分的思戀和幻想。這種思戀和幻想久了慣了。當然亦能使精神及神經系漸陷於不利的地位的一部分性的神經衰弱症的患者。即起因於此。至於這種屬於「病理的夢遺」——即有習慣性的夢遺習慣。而能引起身心不良的影響的夢遺。對於身

心精神所引起的現象。也和上述「病理的遺精」所引起的身心精神的現象無異。譬如身體的疲乏倦怠。精神的鬱悶。不樂。心境迷朦悲觀。腦神經系的記憶力薄弱。作事渺有興趣等。總之一般神經衰弱的徵象。差不多是應有盡有的。

所以對於夢遺的療法。除原因療法。須視患者由何原因。再視各人症候而異外。對於一般的療法。還是不外乎注意日常生活。在努力於一般攝生的治療期間中。最要的還是心境要抱樂觀。意志要堅強鎮定。不但要有必須治愈的决心。還要具有必能治愈的自信。除了息作飲食起居的

攝生外。胡思亂想固然要禁忌。苦悶煩惱亦是不必要。逐漸地把生活弄成規則化。合理化。然後這可惡的夢遺症象亦會漸漸地消滅無形。

## □再談夢遺

何中明

按夢遺之症。其因有四。有用心過度。心氣空虛。不能攝腎而遺者。有淫慾邪思。動其君火者。以致相火不甯。搏激真水而久無色慾。精氣溢而遺出者。為證不同。治法亦異。用心過度者。當安其神。宜遠志。棗仁。茯神。龍齒。山藥。蓮肉。歸身。人參。丹