

陳氏小兒痘病疹源方論

金陳文中撰

商務印書館

陳氏小兒病源方論

金 陈文中撰

商 务 印 书 馆 出 版

北京东总布胡同10号

(北京市书刊出版业营业许可証出字第107号)

新 华 书 店 总 經 售

上海大东集成联合印刷厂印刷

統一書号 14017·51

1958年8月初版

开本 787×1092 1/32

1958年8月上海第1次印刷

字数 52,000

印张 3 7/16

印数 1—6,200

定价(9) ¥ 0.38

小兒痘疹方論

吳郡後學薛己校註

嘗謂小兒病證雖多，而痘疹最爲重病。何則？痘疹之病，蓋初起疑似難辨，投以他藥，不惟無益，抑又害之。況不言受病之狀，孰知畏惡之由？父母愛子，急於救療，醫者失察，用藥差舛，鮮有不致夭橫者。文中每思及此，惻然於心，因取家藏已驗之方，集爲一卷，名之曰小兒痘疹方論，剞梓流布，以廣古人活幼之意，願不遑歟。

和安郎判太醫局兼翰林良醫陳文中謹書

論痘疹受病之由

夫小兒在胎之時，乃母五臟之液所養成形也。其母不知禁戒，縱情厚味，好啖辛酸，或食毒物，其氣傳於胞胎之中，此毒發爲瘡疹，名曰三穢液毒。○一、五臟六腑穢液之毒，發爲水泡瘡。○二、皮膜筋肉穢液之毒，發爲膿血水泡瘡。三、毒既出，發爲疹痘瘡也。子母俱忌食葱韭、薤蒜、醋酒、鹽醬、葷兔、雞犬、魚腥等物，世俗未曉，將爲發舉，往往不顧其後，誤傷者多矣。

論痘疹治法

況小兒痘疹未出已出之間。有類傷寒之狀。憎寒壯熱。身體疼痛。大便黃稠。此正病也。若無他疾。不必服藥。

愚按痘疹。若小兒首尾平和。自有勿藥之喜。蓋其腸胃軟弱。易爲虛實。故必不得已。折其太過。益其不足可也。

凡療痘疹。先分表裏虛實。如表裏俱實者。其瘡易（原本作「分」）出。易靨。表裏俱虛者。反是。表實裏虛者。其瘡易出。難靨。表虛裏實者。亦反是。若始出一日至十日。渾身壯熱。大便黃稠。乃表裏俱實。其瘡必光澤起發。滿肥。且易靨也。

愚按治痘疹之法。與癰疽無異。若邪氣在裏而實熱者。用前胡。枳殼。散元氣。怯而虛熱者。用參。芪。四聖散。虛弱者。用紫。草。木。香。湯。虛寒者。用參。芪。內。托。散。虛寒內脫者。用木。香。散。若邪氣在表而實熱者。用麻。黃。甘。葛。湯。此要法也。餘見各症。

凡瘡疹已出未出之間。或瀉。渴。或腹。脹。或氣。促。謂之裏虛。急用十一味。木。香。散治之。

愚按經云。真氣奪則虛。邪氣勝則實。實謂邪氣實而真氣虛也。然倒靨瀉渴等症。若喜熱飲食。手足並冷。或不食嘔吐者。是爲陽氣虛寒也。用辛熱之劑補之。喜冷飲食。手足不冷。或唇舌黑裂者。陽氣實熱也。用苦寒之劑瀉之。

凡瘡疹已出未愈之間。不光澤。不起發。不紅活。謂之表虛。急用十二味異功散治之。

愚按張翼之云。吐瀉少食爲裏虛陷伏。倒靨灰白爲表虛。二者俱見。爲表裏俱虛。用異功散救之。甚至薑、附、靈、砂、亦可用。若止裏虛。減官桂。止表虛。減肉荳蔻。若能食便閉而陷伏倒靨者。爲裏實。輕用射干鼠粘子湯。重用前胡枳殼散。下利吐瀉能食爲裏實。若用食裏則結癰毒。紅活綻凸爲表實。若用補表則潰爛不結痂。凡痘一見斑點。便忌葛根湯。恐發得表虛也。

凡痘瘡已出未愈之間。不光澤。不起發。不紅活。或腹脹。或瀉渴。或氣促。謂之表裏俱虛。急用十二味異功散。送七味肉荳蔻丸治之。

愚按前症。審悉表裏虛寒。急用前法。緩則不救。○一小兒出痘。不起發。紅活。腹脹。瀉渴。皆以爲不治。施院使謂表裏虛寒。用十二味異功散一劑。卽起發紅活。諸症頓退。又用參芪內托散貫膿而靨。○儒者薛戒甫子五歲。出痘三四日。下紫血。日數滴。至八日不止而瘡不起。御醫錢春林謂脾氣虛寒。用木香散二劑。用丁香十一粒。人參五錢。一日服之。次日痘皆起而有膿。由是血漸止。二十餘日而愈。○一小兒起發紅活。但不時作痒。口乾作渴。便血。面赤發熱。先君謂腸胃有熱。先用濟生犀角地黃湯。加柴胡一劑。諸症漸退。形體倦怠。此邪氣去而形氣虛弱耳。用四君子湯。加當歸、黃芪、紅花。二劑而安。○一小兒痘疹赤痛。煩熱作渴。或便血。或衄血。先君用犀角地黃湯而血愈。又用紫草快癍湯。加黃芪、芍藥而

愈後瘡痕色白。用四君、歸、芪治之而痊。○一小兒出痘吐血。其痘赤痛如錐。或瘡出血。余謂肝火熾盛。用小柴胡湯加生地一劑。隨用濟生犀角地黃湯一劑頓愈。又用芹菜汁而痊。○一小兒痘瘡下血而不起發。先君謂氣血不足。用紫草快癍湯加參、芪、歸、朮治之。血止瘡起。但胃膿遲緩。用八珍湯倍加參、芪。數劑瘡靨而根白痒。此氣血虛而熱也。用八珍湯二十餘劑而愈。○一小兒痘疹。大便秘下血。小便甚赤。瘡顯色赤。發熱飲冷。先君謂熱毒鬱滯。先用八正散一劑。後用解毒防風湯一劑頓愈。又飲芹菜汁而全痊。○一小兒痘正發而便血。倦怠少食。作渴飲湯。余謂倦怠便血。此脾虛而不能攝血也。少食作渴。此脾虛而津液短少也。用五味異功散加升麻、紫草治之而愈。○一小兒便血。腹脹困倦。發熱口乾。飲湯四肢逆冷。先君以爲脾氣虛寒不能攝血。用五味異功散加丁香十粒。炮薑五分。二劑血止。痘貫而靨。○一小兒七歲。患痘瘡腹脹八九日矣。先君云當急補脾土。不信。仍服消毒之藥。忽大便秘下血甚多而發。○一小兒作渴。泄瀉。發熱飲冷。唇舌皴裂。瀉糞穢臭。先君以爲內熱所作。用前胡枳殼散一劑稍愈。又用清涼飲加漏蘆。乳母服之。兒頓安。凡小兒斑駁疹毒之病。俗言疹子是肺胃蘊熱。因時氣薰發於外。狀如蚊、蚤所咬。赤則十生一死。黑則十死一生。大抵遇春而生發。至夏而長成。乃陽氣薰蒸。故得生成者也。臟腑調和。血氣充實。則易出易靨。蓋因內無冷氣。外常和暖也。凡痘疹熱渴。切不可與瓜、柿、蜜水等冷物。及清涼飲、消毒散等藥。恐傷脾胃。則腹脹喘悶。寒戰咬牙而難治。蓋咬牙者。齒槁（原本

作「稿」也。乃血氣不榮。不可妄作熱治。

愚按前症。若兼吐瀉。手足指冷者。屬內虛寒而外假熱也。急用木香散。如不應。用異功散。若大便不通。渴欲飲冷者。則前所禁蜜水之類。又當用矣。但宜審其熱之虛實。若屬虛熱者。雖欲水拒之而不飲。當用人參白朮散。熱渴自止。屬實熱者。自甚。索水且喜而飲之。當以犀角磨水服。諸症卽解。其後亦無餘毒之患矣。北方出疹。不拘冬夏。若喜冷者。再不用藥。但與水飲。無有不愈。蓋北方地燥。而又睡熱炕故也。○一婦人患時疫。將愈。更出痘。瘡大起發。體倦痛甚。則昏憤。煩渴飲湯。不思食。用十全大補湯及朱砂末。其痛頓止。食進體健。仍用前湯。倍加參。芪。十餘劑而貫膿。又數劑而愈。○一姪婦發熱作渴。遍身骨節作痛。用仙方活命飲二劑。諸症稍愈。至十一日出痘百餘顆。形氣甚倦。用紫草木香散。又出少許。但口乾作渴。用人參白朮散而渴止。用八珍湯。加丹皮。柴胡。而貫膿。後去丹皮。柴胡。倍加參。芪。數劑而痘靨。○一男子年將三十出痘。根窠赤痛。發熱作渴。服紫草飲之類。前症益甚。痘裂出血。余用小柴胡加生地。犀角。二劑。諸症頓減。又用聖濟犀角地黃湯。而貫膿。再用八珍湯而結痂。○一小兒煩燥。飲冷不止。先君用濟生犀角地黃湯頓愈。後渴而喜熱。又用當歸補血湯而痊。惟倦怠少食。用七味白朮散而瘥。○一小兒患此。飲冷不止。或痘脹痛。先君用濟生犀角地黃湯。并芹菜汁而頓愈。

凡痘疹出不快。多屬於虛。若誤謂熱毒壅盛。妄用宣利之劑。致臟腑受冷。榮衛滯滯。不能運達肌膚。則瘡

不能起發。充滿後不結實。或痲痺場。煩燥喘渴而死。

愚按前症。亦有各經熱盛壅遏而出不快者。亦有毒甚痘疔而不能發起者。亦有餘毒而潰痒者。當細審其因而藥之。○一小兒九歲。出痘六日。痒場寒戰。院使錢密庵用十一味木香散二劑。貫膿。用參芪托裏散而醫。後痕白作痒。用十全大補（原本作補）湯而愈。○一小兒痘瘡。膿未滿。面赤作痒。余謂氣血虛而有熱。欲用溫補之劑。不信。乃服清熱之藥。至十三日。瘡痘色赤。虛煩作渴。腹痛不食。手足逆冷而歿。○一小兒未週歲。痘瘡焮痛出血。哭不能已。診其母有肝火。先用小柴胡。加山梔。生地與母服。子飲數滴頓愈。又用加味逍遙散而痊。○一小兒出痘。內有痘疔數枚。雖挑破出血。熱毒不解。餘痘不發。皆以爲不治。先君以仙方活命飲徐灌一劑。痘疔解而諸痘亦愈。○一小兒痘疔。患在臀間。色黑大痛。挑出黑血。仍服堅痛。皆以爲不治。先君用隔蒜灸數壯。痛止。色淡而軟。挑出黑血甚多。灌以活命飲。患處及諸痘貫膿而愈。

凡小兒纔覺傷風身熱。是否痘疹。便服四味升麻葛根湯。

愚按痘疹未明而元氣實者。最宜前湯。若元氣虛者。又當詳治。恐發得表虛而痘難出也。○一儒者年三十餘。因勞役倦怠發熱。服補中益氣湯數劑。發赤點以爲癍。另服升麻葛根湯一劑。更加惡寒。仍服益氣湯四劑。至九日出痘甚多。余用八珍湯加黃芪。白芷。紫草四劑。至二十日膿始貫。用十全大補湯。

月餘而醫。

凡痘疹始出。一日至五七日之間。雖身熱或腹脹。足梢（原本作「梢」）冷。或身熱瀉渴。或身熱驚悸。腹脹。或身熱出汗者。服十一味木香散。

愚按前症屬脾氣虛寒假熱。非此藥不救。如未應。佐以六君子。專補脾氣。更不應。加木香。補骨脂。肉苳蔻。兼補腎氣。○一小兒第五日不紅活。至九日貫膿不滿。余謂氣血虛弱。用十全大補湯治之。庶無後患。不信。至脫痂痕作痒色白。至十四日而歿。○一小兒第七日膿清不滿。形氣倦怠。飲食少思。大便秘。實用托裏散二劑。手足指冷。咬牙作渴。用木香散倍用參。芪一劑。諸症頓退。又用參。芪四聖散四劑而愈。

凡瀉水穀。或白色。或淡黃。煎十一味木香散。送十味肉苳蔻丸治之。瀉止者住服。不止者多服。

愚按前症。若察其外症。若唇青指冷。睡而露睛。口鼻氣寒。瀉色青白。脾腎虛寒也。用前藥六君子湯。加補骨脂。肉苳蔻。若色赤體熱。睡不露睛。口鼻氣熱。瀉色黃赤。脾土實熱也。用瀉黃散。○一小兒腹脹。渴瀉。氣促體倦。先君以爲表裏俱虛。用六君子湯加歸。芪。送四神丸一服。諸症頓退。瘡勢頓正。但膿遲而渴。仍用前湯。加歸。芪二劑。瘡色紅活。形體頗安。任其貫膿而痊。

凡瀉頻。津液內耗。血氣不榮。瘡雖起發。亦不能醫也。如身溫腹脹。咬牙喘渴者。難治。緣穀食去多。津液枯

渴飲水蕩散真氣故多死矣。速與一味木香散救之。如不應。急用十二味異功散。

愚按前症兼手足指冷。面色青白等症者。屬陽氣虛寒。急用木香散。陽氣脫陷。用異功散。脾氣虛弱。用六君子湯。血氣虛弱。用八珍湯。不應。用十全大補湯。○一小兒第九日不紅活。不貫膿。云歿於十三日。陳院長謂屬虛寒。用一味木香散二劑。漸紅活。貫膿。又用紫草木香湯。及人參白朮散而愈。○族姪孫衍慶六歲。出痘稀少。瘡痂悉落。至十三日。身煩熱而畏寒。手足逆冷。厚衣圍火不能溫。皆謂不治。余思大熱而不熱者。是無火也。急用人參理中湯煎服一盃。肢體頓溫。更用人參白朮散調理而痊。○一男子年二十餘。發熱煩燥。痘黯出血。足熱腰痛。用聖濟犀角地黃湯二劑而貫膿。用地黃丸料數劑而瘡靨。○一男子年將三十。出痘色紫。作渴飲水。腰痛足熱耳聾。余謂腎虛之症。用加減八味丸料。煎與恣飲。熱渴頓止。佐以補中益氣湯。加五味。麥冬而愈。○一小兒十二歲。出痘色黯。兩足及腰熱痛。便秘。咽舌乾渴。引飲不絕。衆謂腎虛不治。先君用加減八味丸料作大劑。煎與恣飲。至二劑。諸症悉退。又佐以補中益氣。及八珍湯各十餘劑而痊。

凡四五日不大便。用嫩豬脂一塊。以白水煮熟。切豆大與食之。令臟腑滋潤。使瘡痂易落。切不可妄投宣瀉之藥。元氣內虛。則瘡毒入裏。多傷兒也。

愚按前症。若因熱內蘊。宜用射干鼠粘子湯解之。或發熱作渴。或口舌生瘡。或咽喉作痛。並宜用之。

凡瘡疹初出。兩三日。至十三日。當忌外人及卒暴風寒穢惡之氣。輕者三次出。大小不一。頭面稀少。眼中無根。窠紅肥滿光澤也。重者一齊出。如蠶種灰白色。稠密瀉瀉。身溫腹脹。頭溫足冷也。輕變重者犯房室。不忌口。先曾瀉飲冷水。餌涼藥也。重變輕者避風寒。常和暖。大便秘也。

愚按丹溪先生云。痘疹密則毒甚。用人參敗毒散。犀角地黃湯。或以涼藥解之。雖數貼亦不妨。○一小兒痘疹甚密。至九日貫膿不滿。色不紅活。或云當攷於十二日。余以爲氣血虛弱。用八珍湯內加糯米百粒。數劑。至十五日膿完色正。結痂而愈。○一小兒五歲。出痘密而色白。屬虛弱也。始末悉用補托之藥。而安旬餘。飲食過多。忽作嘔吐。面白兼青。目唇牽動。先君以爲慢脾風症。用五味異功散。加升麻。柴胡。不信。翌日手足時搐。服煎藥而不應。急加木香。乾薑。二劑而愈。○一小兒第五日矣。稠密色黑。煩躁喜冷。先君以爲火極似水。令恣飲芹汁。煩熱頓止。乃以地黃丸料服之。至二十餘日而愈。

凡身熱發煩渴者。宜用六味人參麥門冬散治之。如不應。用七味人參白朮散。

愚按前症。若渴而飲冷者。脾胃實熱。宜用麥門冬散。若渴而飲湯者。氣虛熱渴。宜用白朮散。若大渴引飲。面赤。血虛發躁也。用當歸補血湯。

凡痘疹欲靨已靨之間。而忽不能靨。兼腹脹煩渴者。急用十一味木香散。

愚按前症。若兼惡寒。或四肢冷。瘡毒去而脾胃虛寒也。宜用前藥。若十指逆冷。咬牙等症。陽氣脫陷也。

用十二味異功散。脾氣虛陷用六君加川芎、當歸、黃芪主之。○一小兒九歲出痘。第七日發熱煩躁。不
 貫膿。色灰白。寒戰咬牙。瀉渴腹脹。手足冷。時仲夏飲沸湯而不熱。腹中陰冷。先用木香散二劑。益甚。用
 異功散一劑。頓安。又用六君子加附子三分。二劑後用調補之劑。至十四日而愈。

凡痘瘡欲靨已靨之間。忽頭面溫。足指冷。或腹脹瀉渴氣促者。急服十二味異功散。若十一二日當靨不
 靨。身不壯熱。悶亂不寧。臥則哽氣煩渴。嚙牙者。急用十二味異功散加歸朮。以救陰陽表裏。

凡痘瘡已靨。煩渴不止。或頭溫足冷。或腹脹。或瀉。或咬牙。多致難愈。急用十一味木香散以救之。已上之
 症。若誤用蜜水生冷之物。則轉加熱渴而死。

愚按前症。屬脾胃虧損。內真寒而外假熱耳。非溫補不救。如前藥未應。用十全大補湯。加附子以純補
 之。○一小兒頭生一癰。出膿將愈。忽癰間腫脹。發痘二十餘顆。遍身赤點。用快癍湯而漸出。用紫草散
 倍加參、芪而出完。用托裏消毒散而膿貫。用托裏散而瘡靨。○一小兒痘已靨。其痕色赤而錯縱。日食
 粥七八碗。作渴面赤。先用白朮散二劑。渴減五六。粥減太半。又用四君加蕪荑、黃連二劑。痕平色退。乃
 用八珍湯。加蕪荑、山梔而痊。○一小兒痘瘡愈後泄瀉。飲食不化。此脾腎氣虛。用六君加補骨脂、肉苳
 蔻治之而愈。○一小兒痘瘡將愈。患泄瀉。侵晨爲甚。飲食不化。屬脾腎虛也。朝用補中益氣湯。夕用二
 神丸而愈。

凡身壯熱。經日不除。如無他症。用六味柴胡麥門冬散治之。熱退卽止。如不愈。服七味人參白朮散。

愚按前症。若肝膽熱毒。用柴胡麥門冬散。若肝經血虛。用四物湯。加黃芪、柴胡。若中氣虛熱。用入參白朮散。

一男子患痘瘡。作痛。發熱不止。其勢可畏。皆以爲不起。施銀臺用消毒救苦湯治之。諸症頓退。予先用仙方活命飲。痛全止。又用八珍湯。加紫草三錢。四劑貫膿而靨。○一小兒患痘。稠密大痛。發熱勢甚危急。先君用消毒救苦湯一劑。安臥良久。遍身出小痘。頓消。再劑貫膿而靨。

凡身壯熱。大便堅實。或口舌生瘡。咽喉腫痛。皆瘡毒未盡。用四味射干鼠粘子湯。如不應。用七味人參白朮散。

愚按前症。若壯熱飲冷。屬熱毒在表。宜用前湯。若兼大便不通。屬熱毒在內。少用四順清涼飲。若熱毒既去。胃氣虛而發熱。用七味人參白朮散。若因陰血虧損而發熱。用四物湯。○一小兒六歲患痘。第七日根顆赤痛。大便祕結。小便赤澀。煩躁飲冷。或用清涼解毒之劑。未應。錢密庵以爲熱毒內蘊。用四順清涼飲一劑。并豬膽汁導下結糞而安。又用犀角地黃湯。其痘自靨。○一小兒痘瘡。發熱作渴。掀赤脹痛。大便祕結。先用四順清涼飲一劑。諸症頓退。又用四味鼠粘子湯一劑。諸症全退。再用紫草湯而貫膿。用消毒飲而痘靨。○一小兒痘愈而聲瘖。面赤足心發熱。小便赤少。先君以爲腎經虛熱。用六味地

黃丸補中益氣湯而愈。其時患是症。用清熱解毒者俱不起。○一小兒十一歲患痘。第四日根盤紅活起發。因痛甚不止。至七日。形氣甚倦。痘色淡而欲陷。此因痛盛而傷元氣也。先用仙方活命飲一劑而痛止。再用八珍湯而貫醫。

凡風熱咳嗽。咽膈不利。用三味桔梗甘草防風湯治之。如不應。用七味人參白朮散主之。

愚按前症。如痘熱內作。宜用桔梗甘草防風湯。如兼痰熱咳嗽。佐以抱龍丸。若氣虛痰涎壅上。宜用人參白朮散。以補脾肺。○一小兒痘瘡十二日。患咳嗽十餘日不愈。所服皆發表化痰。余曰。此脾肺氣虛。復傷真氣而變肺癰也。不信。仍服前藥。果吐膿血。用桔梗湯而愈。○一小兒痘將愈。咳嗽。面色黃白。嗽甚則赤。用五味異功散調補而愈。

凡涕唾稠粘。身熱鼻乾。大便如常。小便黃赤。用十六味人參清膈散。如不應。用七味人參白朮散。

愚按前症。屬脾肺蘊熱。痘邪爲患。用清膈散解散邪氣。若脾肺虛熱。不能司攝。用人參白朮散調補中氣。○一小兒痘赤壯熱。咳嗽痰甚。煩熱作渴。用人參清膈散一劑。諸症頓退。日用芹菜汁。旬餘而醫。○一小兒痘瘡。狂喘躁熱。作渴飲冷。痰涎不利。先君用十六味清膈散。犀角地黃湯各一劑。頓愈。又用當歸補血湯而愈。○一小兒痘赤狂喘。大便不利。先君以犀角地黃湯。芹菜汁而痊。○一小兒痘愈後。涕唾口乾。飲湯鼻塞。或腹作脹。先用白朮散二劑。後用六君子湯而愈。

凡痰實壯熱胸中煩悶大便堅實臥則喘急速用五味前胡枳殼湯治之。

愚按前症若因腸胃蘊熱宜急用前湯緩則熱毒延內多致有悞。○一小兒患痘赤痛痰喘作渴大便不利錢密庵用前胡枳殼散一劑諸症頓退。又用濟生犀角地黃湯二劑月餘而愈。○一小兒第八日根顆赤腫脹痛作渴大便下黑血煩渴痰喘飲冷呻吟求治施銀臺以爲血熱毒蓄於內用聖濟犀角地黃湯一劑諸症悉退。又用消毒丸及化斑湯而愈。○一小兒痘根色赤作痛發熱口渴喜冷大便堅實用清涼飲一劑痛熱少減再劑便利渴止却用聖濟犀角地黃湯而安。用芍藥汁而靨。○一小兒痘根色赤作痛熱渴喜飲冷水大便不利先用五味前胡枳殼散大便利而熱渴減。又用聖濟犀角地黃湯而安。用芍藥汁而靨。○一小兒大便不利小便赤澀作渴飲冷先君用涼膈散一劑漸愈。又用濟生犀角地黃湯及芍藥汁而痊。若乳母有肝火兒患此症必用加味逍遙加黃芩犀角兼治其母。○一小兒痘已愈而痕赤作痛內熱作渴二便不利先君用濟生犀角地黃湯及芍藥汁而痊。後用四物黃芪而安。○一小兒痘痕白或時痒作渴飲湯大便稀澀先君用五味異功散加當歸黃芪而痊。○一小兒豆痕白時或痒先君以爲氣血俱虛用八珍湯補之不信自用解毒之劑後卒變慢脾風而歿惜哉。凡飲冰雪不知寒者陽盛陰虛也。飲沸湯不知熱者陰盛陽虛也。陽盛則補陰木香散加丁香官桂陰盛則補陽異功散加木香當歸每一兩藥共加一錢。

愚按陽盛者。當用清涼飲以補陰。陰盛者。當用異功散以補陽。須審的實而用。若或少差。死在反掌。前云乃傳寫之誤。

凡痘瘡首尾。若誤飲冷水。瘡靨之後。其痂遲落。或生癰腫。或成疳蝕。蓋脾胃屬土。而主肌肉。水濕所傷。則津液衰少。榮衛滯滯。不能周流。故瘡痂遲落而生癰腫。

愚按痘癰之類。屬血熱未解而內作。外邪搏於肌膚之間。或餘毒蘊結。經絡輕則肌表津淫癢痒。重則肢節壅腫作痛。若餘毒熾盛。先用仙方活命飲以解其毒。却用托裏消毒散。毒氣將盡。用四君、歸、芪、以補托元氣。大凡痘瘡始末。皆係脾胃之氣所主。若飲食藥餌失宜。多致變症。故凡飲食少思。內熱晡熱者。屬脾胃氣虛血弱。佐以四君、芎、歸、黃、芪、升、麻。若飲食如常。發熱作痛者。屬氣血虧弱。餘毒爲患。佐以射干鼠粘子湯。若飲食如常。發熱作痛。大便祕結者。屬熱毒內蘊。用大連翹飲。如不應。仙方活命飲。若根赤而作痒。血虛也。四物加牡丹皮。色白而作痒。血虛也。四君加當歸、芍藥。色赤而作痛。血熱也。四物加連翹、金銀花。腫而不潰。血氣虛也。用托裏消毒散。潰而不愈。脾氣虛也。用六君子湯。○一小兒痘毒蝕陷。敷以雄黃散。及服加味解毒散而愈。○一小兒痘毒遍身腐潰。膿水淋漓。以經霜茅草研末。鋪於寢席。更服九味解毒散頓愈。用神效當歸膏敷之而痊。○一小兒痘毒後。腿膝腫痛。此脾腎虛而毒流注。先用活命飲四劑。腫痛頓減。再用補中益氣湯。及六味地黃丸而痊。○一小兒腿膝腫潰。而膿水不

止。內熱嘔熱。體倦肌瘦。先君以爲元氣復傷。用補陰八珍湯。六味丸。三月餘而愈。○一小兒痘已愈。兩目昏閉。先君用鼠粘子湯。加山梔。龍膽草。犀角。目開而有赤白翳。佐以蛇蛻散。外用二粉散尋愈。凡瘡疹已醫未愈之間。五臟未實。肌肉尙虛。血氣未復。被風邪相搏。則津液澀滯。遂成疳蝕。宜用雄黃散。綿繭散等藥治之。久而不愈。則潰。多治不起。

愚按前症。屬足陽明胃經。其方解毒殺蟲之劑。若毒發於外。元氣未傷者。用之多效。若胃氣傷損。邪火上炎者。用蕪荑湯。六味丸。若赤痛者。用小柴胡湯。加生地黃。肝脾疳症。必用四味肥兒丸。及人參白朮散。更佐以九味蘆薈丸。○一女子痘痂將脫。因其穢氣。以湯浴已。而身熱如炙。四肢強直如發瘧然。此腠理開泄。熱毒乘虛而入。用十全大補湯一劑頓安。○一小兒痘出甚密。先四肢患毒膿潰而愈。後口患疳。涎蝕牙齦。先用大蕪荑湯。活命飲各一劑。又用清胃散加犀角。及蟬蜋丸而愈。後發熱作渴。口中作痛。服蟬蜋丸。搽人中黃而安。

類集痘疹已效名方

葛根麥門冬散 治小兒熱毒斑疹。頭痛壯熱。心神煩悶。

葛根 錢三

麥門冬 錢四 去心

人參 錢二

石膏 兩半

川升麻

甘草

茯苓 錢各二

赤芍藥 錢一