

红斑狼疮的中医治疗

王渭川 著

何焕霞 整理

人民卫生出版社

红斑狼疮的中医治疗

王润身 著

何焕霞 整理

人民卫生出版社出版

(北京市崇文区天坛西里 10 号)

北京顺义寺上印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

787×1092毫米32开本 2 $\frac{1}{4}$ 印张 47千字

1984年12月第1版 1984年12月第1版第1次印刷

印数：00,001—19,300

统一书号：14048·4839 定价：0.87元

[科技新书目 82 — 41]

目 录

一、红斑狼疮的中医治疗	1
二、典型病案例举	11
(一) 盘状红斑狼疮二例.....	11
(二) 系统性红斑狼疮.....	16
1. 系统性红斑狼疮热盛型二例.....	16
2. 系统性红斑狼疮脾肾阳虚型八例.....	20
3. 系统性红斑狼疮肝肾阴虚型六例.....	38
附：主要药物和基本方剂简介	54
(一) 主要药物简介.....	54
1. 紫草.....	54
2. 蜈蚣.....	54
3. 白花蛇(附：乌梢蛇).....	55
4. 蛇头一颗草.....	56
5. 白花蛇舌草.....	57
6. 半枝莲.....	57
7. 石大年.....	58
8. 无花果.....	58
9. 苦荞头.....	59
10. 隔山撬.....	59
11. 瞿麦.....	60
(二) 基本方剂简介.....	60
1. 清营汤.....	60
2. 犀角地黄汤.....	62
3. 通窍活血汤.....	63
4. 地黄饮子.....	64
5. 一贯煎.....	65

一、红斑狼疮的中医治疗

红斑狼疮是一种结缔组织疾病。由于结缔组织广泛分布于全身，因此可在疾病的不同时期产生多个脏器病变。临床表现为发烧（严重时高烧），关节酸痛，血沉增高，白细胞降低，心、肺、肝、脾、肾等重要器官受累。皮肤的暴露部分多有病变，往往在面部两颊及鼻梁部之间出现蝴蝶状红斑；红斑发生于四肢，则呈对称性分布；红斑多伴有丘疹、水疱鳞屑和结节，有痒和烧灼感。

本病患者多数对日光过敏。阳光曝晒常能诱发或加重本病。据统计，约有四分之一红斑狼疮患者的发病与患者病前曾否日晒有关。

本病多见于15~50岁女性，尤其好发于育龄妇女。一般来看，患者越年轻，病情越严重，预后多不良；相反，老年患者症状较轻，预后较好。鉴于红斑狼疮有遗传性及妊娠会使病情加剧，因而患本病的妇女不宜怀孕。

本病病因目前医界还众说不一。有些学者依据临床的大量资料分析，认为从免疫学观点来解释本病的发生机理，则属于自身免疫疾患。患者淋巴系统中有些细胞的细胞核染色体带，有易发生本病的基因，可以遗传。由于这些淋巴细胞对自身组织的细胞产生抗体，因而产生自身抗体抗原的反应而发病。另外如真菌与细菌感染、病毒感染、药物（青霉素、链霉素、四环素及磺胺类）过敏、日光曝晒、精神创伤、内分泌失调等均是本病的诱因。

中医对红斑狼疮的认识并未见诸于文献典籍。本人认

为：本病的病因可分为外因、内因。外因是由于毒邪侵入，蕴聚于脏腑经络；内因是正气不足，情志抑郁，阴阳长期失调，气血运行失常，而又毒邪内蕴，气滞血瘀，郁结壅塞，经络阻涩，发于外则皮肤起红斑，袭于内则脏腑致病。

对本病的确诊，本人采用西医的红斑狼疮细胞检查方法，即从血液或骨髓涂片中找红斑狼疮细胞。红斑狼疮细胞检查（血块法）方法如下：

取患者静脉血5毫升，置于试管中待其凝固。将凝固血块搅碎，置于37℃温箱中两小时，再经离心15分钟，然后吸取红细胞与血清之间的乳白色层（白细胞层）涂片，用美蓝——伊红染色（旧称瑞特氏染色）后，再进行显微镜检查。红斑狼疮细胞为含有圆形、无结构、均匀的嗜碱性物质的中性多形核白细胞，细胞核被挤向一边。红斑狼疮细胞较正常多核白细胞大。

西医将本病分为局限性的盘状红斑狼疮和全身性的系统性红斑狼疮。盘状的以皮疹为主，一般不累及内脏，预后较好。系统性的以内脏病变为主，皮损为次，有时甚至无皮损症状出现，病情严重，常可导致死亡。

本人根据临床症状和外感内伤、阴阳表里和脏腑阴阳转化的理论，审证求因，进行辨证施治。认为可将本病分为两类三型。

第一类是盘状红斑狼疮，它以局部皮肤病变为主，症状近似古代医典所载之“猫眼疮”。《素问·至真要大论》云：“诸痛痒疮，皆属于心。”心在五行归类属火，故此症属阳疮热证，毒热内盛，与系统类热盛型外部症状相似。

第二类是系统性红斑狼疮，病情错综复杂，往往累及内脏，常伴有心、肝、脾、肺、肾五脏病症，而以肾的病变为

主：如耳鸣（肾开窍于耳）、腰痛（腰为肾之府）、头发稀疏或脱落（肾之华在发）。肾主生殖机能，故患本病的男子多阳痿遗精，女子多有月经紊乱。肾阴虚而毒热内盛，必致心阳偏亢而化火，形成热盛型。如肾阳虚不能制水，必致脾阳亦虚，不能运化水湿，形成脾肾阳虚型。如肾阴虚引起肝阳上亢，形成肝肾阴虚型。

《内经》云：“邪之所凑，其气必虚。”故治疗本病，必须遵循“治外必本其内，知其内以求其外”的原则，无论何类何型，都要内外兼顾，攻补并施。本人常用下列三种治法进行治疗。

1. 清法 是治疗红斑狼疮的一种重要方法。用以清营解毒，驱赶、消灭红斑狼疮细胞。主要用于红斑狼疮热盛型，其余各型均可酌情采用。

2. 滋补法 以补益脾肾为主，常用于系统性红斑狼疮脾肾阳虚型。但本型常兼有多部位疼痛、关节肿大及腹部癧瘕痞块等瘀血症状，所以必须同时活血化瘀，才符合补虚不忘化瘀的原理。

3. 滋肝养阴法 用以滋养肝阴和肾阴，常用于系统性红斑狼疮肝肾阴虚型。

下面试分型论治。

(一) 盘状红斑狼疮

特征：

1. 皮疹多发于皮肤的暴露部位，以面部为主。病初起时，面部皮疹单个出现，随病情发展，损害增多扩大，可融合成以鼻梁为中心、两颊为双翼的蝴蝶形红斑。其次口唇、外耳、手背、头皮以及四肢皮肤均可出现皮疹。

2. 皮疹为边缘清楚而微隆起的持久性红斑，中心萎缩微凹，呈盘状。皮损一般边缘鲜红而中心色较淡。常可见毛细血管扩张，表面附有灰黄色粘着性鳞屑。将鳞屑剥去，可见其下毛囊口扩张，并有角栓。粘膜上的损害一般为灰白色糜烂或浅溃疡。

3. 本病患者对日光过敏，曝晒日光可使病情加剧。少数病人有发烧、关节酸痛等症状。如患病日久，迁延不愈，会损害内脏，易致气虚、瘀滞。

脉象：沉迟或沉弱。

舌：舌质淡润，苔腻。

治则：清热除湿解毒，活血化瘀。

处方：清营汤合通窍活血汤加减。

每方必用药物：蜈蚣2条、白花蛇（或乌梢蛇）9克、紫草60克。

蜈蚣辛、温有毒，入肝经，功能镇痉解毒、祛风定惊、消肿止痛。白花蛇甘、咸温，有毒，入肝经，功能攻毒止痒、祛风除湿、镇痉定惊、舒筋活络。紫草甘、咸，寒，入心、肝经，功能凉血解毒、活血透斑。此三味药配合八味草药，能消灭红斑狼疮细胞，起清热除湿，祛邪解毒的作用，故每方必用。

清热除湿：可选用红藤24克、蒲公英24克、大青叶9克、佩兰9克、地骨皮9克、肥知母9克、银柴胡9克、地肤子15克、白藓皮15克、玄参9克、生地24~30克、板蓝根24克。

活血化瘀：可选用地鳖虫（即䗪虫）9克、生蒲黄9克、全蝎9克、桃仁9克、土红花9克、黑故脂12克、炒五灵脂12克、琥珀末6克（冲服或布包煎）。

补益气血：可选用党参 24~60 克、鸡血藤 18 克、生黄芪 24~60 克、桑寄生 15 克、菟丝子 15 克。

如有兼症，可随症选加下列药物：

心跳过速：可选加炒北五味 12 克、山萸肉 9 克、苦参 24 克、桂圆肉 12~24 克、玉竹 9 克。

腰痛，查尿有脓球、红血球或蛋白，可选加：仙鹤草 60 克、夏枯草 60 克、大小蓟各 12 克、阿胶珠 9 克（冲服）、山楂 9 克。

四肢不利或瘫痪，指趾关节痛：加麝香 0.15 克（冲服）。

呼吸急速，气紧：可选加麻绒 1.2 克、川贝 9 克、炒北五味 12 克。

肝区痛：可选加柴胡 9 克、丹参 9 克、金钱草 60 克、满天星 24 克、花斑竹 24 克、茵陈 12 克。

胁痛：可选加柴胡 9 克、丹参 9 克、炒五灵脂 12 克、生鳖甲 24 克（先熬二小时）、九香虫 9 克。

胃痛：加台乌 9 克、九香虫 9 克。

夜尿多：加桑螵蛸 9 克、生龟板 30 克（先熬二小时）。

腹水：加熟附片 24~60 克（先熬二小时）、细生地 12 克、石斛 9 克。

脉管炎：加麝香 0.15~0.3 克（冲服）。

另用下面八种草药同煎，以求增强解毒功效。

蛇头一颗草 60 克 白花蛇舌草 60 克 半枝莲 30 克
石大年 30 克 无花果 30 克 苦荞头 15 克 隔山消 15 克
瞿麦根 15 克

(二) 系统性红斑狼疮

特征：

1. 全身症状 有发热、虚弱无力、消瘦、盗汗、脱发、色素沉着、全身淋巴结肿大、妇女月经失调等症状。病势轻重表现不一，病变累及不同内脏，其症状亦异。

(1) 滑膜或浆膜受累：可出现关节炎、胸膜炎、心包炎等症。关节痛（炎）是本病常见症状之一。如长期关节痛（炎），经过多种方法治疗无效者，即应想到是否为红斑狼疮性关节痛（炎）。此种关节痛可分为三大类：① 关节痛可能伴有软组织轻度肿胀；② 急性或亚急性移走性的多发性关节炎，伴有不同程度的红、肿、热、痛，有时与风湿热相似；③ 慢性进行性伴有畸形的多发性关节炎，有时与类风湿性关节炎很难区别。最多见者为四肢关节，其它如髋关节、脊柱等关节也可能受累。

(2) 心脏受累：有心动过速、心尖收缩期杂音等心肌炎表现，甚至可引起心力衰竭。

(3) 四肢血管受累：可致指（趾）端坏死。

(4) 造血系统受累：可致造血功能发生障碍。

(5) 肾脏受累（多数病人有肾脏受累）：类似急性肾炎，有小便改变（蛋白尿、出现管型细胞，甚至可出现血尿），血压高，肾性水肿，反复发作可导致肾功能衰竭。

(6) 消化系统受累：可致消化不良、食欲减退、恶心、呕吐、腹痛、腹泻以致肠穿孔等，有的腹痛严重者酷似外科急腹症，并常有肝脾肿大。

(7) 呼吸系统受累：有胸痛、气紧、咯血等支气管肺炎、胸膜炎症状。

(8) 神经系统受累：可致抽搐、偏瘫、癫痫、周围神经炎、精神病等。并可出现视神经乳头水肿伴视网膜出血渗出等。

2. 皮肤症状

- (1) 有些急性病例没有皮肤症状。
- (2) 皮疹好发部位：典型者皮损于面部鼻颊两侧呈蝴蝶形分布，其次是指（趾）的末端和手足易受压力及摩擦的部位。
- (3) 皮疹常较盘状红斑狼疮多而广泛对称。
- (4) 皮疹为多形性和多变性。典型者为水肿性红斑或紫红斑，其他有出血斑、结节性红斑样皮疹以至风团等。口腔粘膜受累时呈现出血小点或糜烂。

3. 实验室检查

- (1) 血常规：红细胞、白细胞和血小板均减少。
- (2) 血沉降率持续性长期的增快。
- (3) 血清球蛋白增高，白蛋白降低，白蛋白与球蛋白比例倒置。
- (4) 尿常规：出现蛋白、红细胞及管型细胞。
- (5) 红斑狼疮细胞检查：找到红斑狼疮细胞。

本人将系统性红斑狼疮根据其中医临床表现，分为下列三型：

1. 热盛型

特征：对日光过敏，日光照射后，病情转剧或骤发。发热烦躁，关节酸痛，全身不适，口渴，喜冷饮，目赤唇红，或口舌生疮，大便秘结，小便短赤。

脉象：弦数。

舌：舌质红，苔黄燥。

治则：清营养阴，活络解毒。

处方：犀角地黄汤合清营汤加减。

每方必用药物：蜈蚣 2 条、白花蛇（或乌梢蛇）9 克、

紫草 60 克。

清营养阴：加犀角 1.5 克（锉末冲服）。

如有兼症，可随症选加下列药物：

兼心阴虚者，病人心悸而烦，心中热，舌质淡红苔少，或舌尖红而干，脉细数者，可选加：沙参 9 克、生地 12 克、炒川棟 9 克、生白芍 12 克、鸡血藤膏 18 克、山萸肉 12 克、当归 9 克、熟枣仁 12 克、炒北五味 12 克、枸杞 12 克。

兼心阳虚者，病人心悸气喘，时感胸部疼痛，甚者可出现四肢冰冷，或发生心绞痛，唇紫发绀，面色苍白，自汗甚，脉细弱，苔淡白者，可选加：熟附片 15 克（先熬二小时）、肉苁蓉 12 克、生地 12 克、炒北五味 12 克、山萸肉 12 克、党参 30 克、生黄芪 24 克、茯神 12 克。

兼肝阴虚者，病人肝和胆囊区剧痛，呕吐苦水，眩晕头痛，耳鸣耳聋，眼结膜充血，视力变差甚至失明，鼻衄或咯血，舌边红，苔黄或干燥，脉弦细而数者可选加：沙参 9 克、麦冬 9 克、生地 15~60 克、枸杞 12 克、炒川棟 9 克、钩藤 9 克、刺蒺藜 18 克、夜交藤 60 克、石菖蒲 3 克、楮实子 24 克、木贼草 24 克、青葙子 24 克、珍珠母 24 克、仙鹤草 60 克、石斛 9 克。

兼肝阳上亢者，病人头昏头痛，四肢麻木，肌肉跳动，甚至突然昏倒，口角歪斜，半身不遂。舌质红，苔薄黄，脉弦者可选加：京半夏 9 克、制胆星 9 克、天竺黄 9 克、蜈蚣 2 条、白花蛇（或乌梢蛇）9 克、全蝎 9 克、沙参 12 克、茯神 12 克、制旋覆花 9 克、石菖蒲 3 克、仙鹤草 60 克、阿胶 9 克（冲服）、地鳖虫（廑虫）9 克、炒蒲黄 9 克、琥珀末 6 克（冲服或布包煎）。

兼脾阳虚者，病人面色萎黄，消化不良，腹胀，喜热

饮，口吐清水，大便稀，小便清长，消瘦乏力，舌质淡，苔白腻，脉濡弱者，可选加：党参24~60克、炮姜9克、砂仁6克、蔻仁6克、京半夏9克、熟附片24克（先熬二小时）、鹿角胶9克（冲服）、吴茱萸6克、台乌9克、九香虫9克、鸡内金9克、枳壳6克、柿蒂9克、藿香6克。

兼脾阴虚者，病人形体消瘦，善饥，腹胀，唇红，咽干，苔黄薄而燥，脉弦细而数者，可选加：肥知母9克、沙参9克、生地12克、麦冬9克、天花粉9克、淮山药24克、枳壳6克、石斛12克、瓜蒌12克、何首乌15克、地骨皮9克。

兼肺寒者，病人畏寒无汗，咳嗽声重，痰多稀薄，苔薄白而润，脉浮紧者，可选加：麻黄6克、杏仁9克、茯苓9克、炒葶苈9克、川贝9克（冲服）、百部9克、海浮石15克、炙紫菀9克、款冬花9克、桔梗9克、枇杷叶9克。

兼肺热者，病人有发热咳嗽，胸痛，吐稠痰、脓痰或痰中带血，咽干口燥，舌红，苔黄燥，脉数者，可选加：银花9克、连翘9克、红藤24克、蒲公英24克、桔梗9克、杏仁9克、生石膏9克、川贝9克（冲服）、炒葶苈9克、麻黄6克、百部9克、琥珀末6克（冲服或布包煎）。

其余加减同盘状红斑狼疮。

另用下面八种草药同煎，以求增强解毒功效。

蛇头一颗草60克、白花蛇舌草60克、半枝莲30克、石大年30克、无花果30克、苦荞头15克、隔山挑15克、瞿麦根15克。

2. 脾肾阳虚型

特征：日光照射后，病情转剧或骤发，眩晕耳鸣，腰痛，关节痛，脚跟痛，心悸乏力，自汗气短，脱发，食欲不振，

腹胀浮肿，喜热饮，大便结而不爽，小便短。

脉象：沉迟或濡弱。

舌：舌质淡，苔润滑。

治则：补益脾肾，活血化瘀，祛除病毒。

处方：河间地黄饮子合通窍活血汤加减。

每方必用药物：蜈蚣 2 条、白花蛇（或乌梢蛇）9 克、紫草 60 克。

补益脾肾：可选加熟附片 24 克（先熬二小时）、肉苁蓉 12 克、杭巴戟 12 克。

消除浮肿：可选加糯米草 60 克、海金沙 12 克、夜明砂 12 克。

振兴食欲：可选加山楂 9 克、神曲 9 克、鸡内金 9 克、生谷芽 24 克。

其余加减 同盘状红斑狼疮、系统性红斑狼疮热盛型。

另用下面八种草药同煎，以求增强解毒功效。

蛇头一颗草 60 克、白花蛇舌草 60 克、半枝莲 30 克、石大年 30 克、无花果 30 克、苦荞头 15 克、隔山擂 15 克、瞿麦根 15 克。

3. 肝肾阴虚型

特征：日光照射后，病情转剧或骤发。腰痛耳鸣，午后发热，颧部潮红，腰腿瘦软，口苦咽干，眩晕畏光，头发枯脆，肢麻或肌肉掣动，大便结，小便短黄。男子遗精盗汗，妇女乳胀胸痛，月经紊乱或停经。

脉象：弦细或弦数。

舌：舌质红，苔黄。

治则：柔肝养阴，活血化瘀，祛除病毒。

处方：一贯煎合通窍活血汤加减。

每方必用药物：蜈蚣 2 条、白花蛇（或乌梢蛇）9 克、紫草 60 克。

柔肝养阴：选用沙参 9 克、当归身 9 克、枸杞 12 克、炒川棟 9 克、女贞子 24 克、旱莲草 24 克。

胸痛：加夏枯草 15 克、薤白 12 克。

盗汗：加金樱子 30 克。

头发枯脆：加桑椹 9 克、何首乌 9 克。

其余加减同盘状红斑狼疮、系统性红斑狼疮热盛型、系统性红斑狼疮脾肾阳虚型。

另用下面八种草药同煎，以求增强解毒功效。

蛇头一颗草 60 克、白花蛇舌草 60 克、半枝莲 30 克、石大年 30 克、无花果 30 克、苦芥头 15 克、隔山撬 15 克、瞿麦根 15 克。

二、典型病案例举

（一）盘状红斑狼疮二例

病例一 盘状红斑狼疮

吕× 女 52 岁 北京话剧院演员

初诊：1974 年 1 月 8 日

证状：两颧部有明显对称性红斑，畏阳光。阳光照射一会儿即发病。经首都某医院确诊为“盘状红斑狼疮”，血中查出红斑狼疮细胞。患者发低烧，关节痛，腰痛，脚跟痛，耳鸣，心悸气紧，浮肿，精神疲乏，无力上楼，脱发，自汗，食欲差，腹胀，形寒，喜热饮，失眠。

脉象：沉弱。

舌：舌质淡，苔薄白。

治则：清热解毒，活血化瘀，佐以益气。

处方：蜈蚣 2 条 白花蛇 9 克 紫草 60 克 黑故脂 12 克 地鳖虫 9 克 生蒲黄 9 克 银花 9 克 连翘 9 克 地骨皮 9 克 土红花 9 克 桃仁 9 克 炒北五味 12 克 山萸肉 12 克 党参 30 克 鸡血藤 18 克 生黄芪 30 克 槟榔 6 克。

八种草药与上方同煎：

蛇头一颗草 60 克 白花蛇舌草 60 克 半枝莲 30 克 无花果 30 克 石大年 30 克 隔山撬 15 克 苦荞头 15 克 瞿麦根 15 克

一周六付，连服两周。

二诊：1974 年 1 月 22 日

证状：服上药十二付后，病情好转，低热已退，精神渐增，浮肿减轻，步行较前有力，耳鸣渐减。但关节仍痛，食欲仍差，腹微胀。

脉舌：同前。

治则：守前法继进。

处方：前方去桃仁、土红花、银花、连翘，加鹿角胶 15 克（冲服）、阿胶珠 9 克（冲服）、厚朴 6 克、砂仁 6 克、蔻仁 6 克、鸡内金 9 克，草药八种同煎。

一周六付，连服两周。

三诊：1974 年 2 月 6 日

证状：服上药十二付后，病情显著好转。在阳光下走路，未引起皮肤痛感。脸上蝴蝶斑已逐渐消退，其余各症亦有减轻。但仍浮肿、血沉高。患者准备返回北京单位。

脉舌：同前。

治则：守前法继进。

处方：二诊方去地骨皮，加炒五灵脂 12 克，草药八种同煎。

一周六付，连服四周。

疗效：患者回北京后，通信易方，但治则基本不变。服药至 1974 年 8 月底，患者自动停药观察。同年 9 月初到南京、上海、杭州等地旅行，年底回北京欢度元旦。1975 年 3 月 15 日来信说：经省部某医院复查，证明病已基本痊愈。为防止复发，处以膏方巩固疗效。

膏方：潞党参 120 克 鸡血藤 120 克 生黄芪 120 克 熟枣仁 90 克 鱼鳔胶 120 克 槟榔 60 克 厚朴 60 克 茅术 30 克 糯米草 120 克 炒五灵脂 60 克 细生地 120 克 桑椹 120 克 女贞子 90 克 旱莲草 90 克 覆盆子 120 克 淫羊藿 120 克 紫草 120 克 蛇蜕 20 条 白花蛇 90 克 蕺菜头 60 克 半枝莲 60 克 无花果 120 克 威灵仙 30 克 枸杞 60 克

上药熬四次，合取浓汁，加鸡内金、山楂、地鳖虫、炒蒲黄、琥珀末各 24 克，共研极细末，合蜂糖二斤，缓缓搅匀收膏。每日早、中、晚各服一大汤匙，风寒感冒时停服。

按语：本病例属盘状红斑狼疮，皮疹发于两颧部，呈明显蝴蝶斑。因病情较长，导致气虚瘀阻，因而出现心悸气紧、浮肿、精神疲乏、腹胀形寒等脾肾阳虚症状。故在治疗初期宜除湿解毒，活血化瘀。待病情好转，脸部红斑渐退时，则宜补脾健肾，水火并济，以膏方巩固疗效。

病例二 盘状红斑狼疮兼盆腔炎

钟×× 女 45 岁 重庆巴县石岗农场工人

初诊：1981 年 2 月 13 日

证状：两颧部红斑溃疡已有两年之久。患者畏阳光，经

日晒后即烦躁发病。经重庆某医院确诊为“盘状红斑狼疮兼盆腔炎”。血中查出红斑狼疮细胞。患者消瘦乏力，口苦咽干，头眩失眠，胸痛，肝区痛，小腹痛，关节痛。月经紊乱，量多，带下黄臭。曾日服强的松 30 毫克治疗，无效。

脉象：沉弦。

舌：舌质淡红，苔光。

治则：滋肾柔肝，清湿解毒，去瘀调冲。

处方：沙参 12 克 细生地 9 克 枸杞 9 克 红藤 24 克 蒲公英 24 克 败酱 24 克 紫草 60 克 蛭蛇 2 条 乌梢蛇 9 克 女贞子 24 克 旱莲草 24 克 地鳖虫 9 克 炒蒲黄 9 克 柴胡 9 克 生白芍 9 克 仙鹤草 60 克 金钱草 60 克 益母草 24 克 琥珀末 6 克（冲服或布包煎），与上述八种草药同煎。

一周六付，连服四周。

二诊：1981 年 3 月 13 日

证状：服上药 26 付并遵嘱日渐减少强的松服用量后，病情好转，两颧部红斑溃疡处已收口结疤，食欲增加，小腹不痛，白带减少，畏光减轻，精神渐增。但肝区、关节、胸口仍疼痛。

脉象：弦数。

舌：苔薄白。

治则：守前法继进。

处方：上方去败酱、女贞子、旱莲草、地鳖虫、炒蒲黄、仙鹤草，加当归 9 克、夏枯草 12 克、薤白 9 克、满天星 24 克、花斑竹 24 克、广藿香 6 克、槟榔 6 克，加八种草药同煎。

一周六付，连服四周。