


常用进口药品简明手册

人民军医出版社



内 容 提 要

本书根据国内外有关资料,编辑、整理出498种进口药品。全书共17章,并附有中、外文索引。每种药物按〔又名〕、〔作用与用途〕、〔剂型与规格〕、〔用法用量〕、〔注意事项〕分项介绍;内容简明、扼要,用法具体,查阅方便。可供临床医生、药学工作者参考。

常用进口药品简明手册

刘奉连 曾小鸿 赵晓琳 编

人民军医出版社出版

(北京市复兴路22号甲3号)

北京军区军医学校印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

开本:787×1092毫米1/32 印张:10.5 字数:225千字

1989年8月第1版 1989年8月第1次印刷

印数:13600 定价:4.40元

ISBN 7—80020—089—2/R·88

〔科技新书目:184—122⑥〕

前 言

近几年来,随着我国社会主义事业的改革、开放和对外贸易的发展,国内市场进口药品也日趋增加。由于进口药品涉及许多国家和公司,致使商品名称繁多,不少药品组方比较复杂,而且某些药物说明书偏重于介绍药物的优点,对其不良反应的介绍则比较简单或者未予介绍,影响了合理使用。为了有选择地利用国外先进技术和成果,使医药人员对进口药品有较全面的了解,合理使用药品和充分发挥药物作用,防止药源性疾病的发生,使进口药品有效地为我国医疗、保健工作服务,几年来编者根据国内药品进口市场信息,收集了国内外有关资料编译整理遴选出498种进口药品,编成《常用进口药品简明手册》,供广大医药工作者和从事药物进口、经销、科研生产的同行们参考。

本书每个药物的第一个名称是常用名,有关药名中附有生产国国名,在国际非专利药名旁标有〔I〕,对国内尚未生产或资料缺乏的药物作了比较具体的介绍,并详细介绍了复方制剂的组方。其药物分类参照《新编药理学》的编排次序。

本书承蒙中山医科大学药理教研室主任孙家钧教授,中国人民解放军广州军区总医院李禧主任药师和曾梅辉主任医师分别审校了有关章节,并由第二军医大学药学系副主任兼药理教研室主任龙焜教授等多人校阅。在编写过程中还得到了广州军区直属第二门诊部领导和药局同志们的支持,并提供了部分资料,在此一并表示感谢。

本书在编译过程中,由于书中的内容涉及广泛和对新药的认识还有一个临床实践过程,加上编者水平有限,难免有欠妥之处,敬请读者批评指正。

编者 1988年4月15日

目 录

第一章 抗生素

- (一) 青霉素类.....(1)
- 苄星青霉素G(1) 利本他(1) 强化“都美”长效西林(2) 赛米西林(2) 卡比西林(3) 卡他西林(3) 阿莫西林(4) 哌哌西林(4) 呋苄西林(5) 密沙西林-S(5) 羧苄青霉素茚满酯钠(6) 氨苄青霉素酞酯(6) 氯唑脒青霉素(7) 氯苄脒青霉素双酯(7) 羧噻吩青霉素(8) 维斯林-S(8) 奥格门丁(9)
- (二) 头孢菌素类.....(9)
- 头孢噻吩钠(9) 头孢噻啶(10) 头孢氨苄(10) 头孢唑啉钠(11) 头孢雷定(11) 头孢氰甲(12) 头孢吡硫钠(12) 头孢孟多(13) 头孢噻乙胺唑(13) 西力欣(14) 美福仙(14) 头孢氨甲苯唑(15) 头孢双硫唑甲氧(15) 头孢磺吡苄(16) 先锋必素(16) 氨噻肟头孢菌素钠(17) 复达欣(17) 菌必治(18) 先锋美他醇(18) 羧基氧酰胺菌素(19) 噻肟单酰胺菌素(19)
- (三) 氨基糖甙类.....(19)
- 阿米卡星(19) 达卡霉素(20) 卡内多霉素(20) 妥布霉素(21) 紫苄霉素(21) 乙基西索米星(22) 威他霉素(22) 巴龙霉素(23)
- (四) 四环素类.....(23)
- 二甲胺四环素(23) 伟霸霉素(24)
- (五) 大环内酯类.....(25)
- 麦迪霉素(25) 乙酰螺旋霉素(25) 白霉素(25) 交沙霉素(26)
- (六) 其它抗生素.....(26)
- 林肯霉素(26) 福赐美仙(27) 林大霉素(28) 多粘菌素E(28) 多粘菌素B(29) 粘菌素-M(29) 万古新(30) 混合短杆菌肽糖锭(30) 新生霉素(30) 永妥万灵(31)

(七) 抗结核药与抗麻风药.....(32)

力复霉素(32) 利福平(32) 紫霉素(33) 肺敌平(33) 理本灵(34)

(八) 抗霉菌药.....(34)

酮康唑(34) 密康唑(35) 安确治(35) 两性霉素 B(36)

第二章 抗寄生虫病药物

抗虫灵(37) 服净(37) 防治疟(38) 滴比露(38) 美舒仿
(39) 肠用慰欧仿(39) 平菌痢(40)

第三章 主作用于中枢神经系统的药物

(一) 中枢兴奋药.....(41)

美可灵(41) 尼可林(41)

(二) 镇痛药.....(42)

酒石酸麦角胺(42) 特施利尔(42) 咖啡葛(43) 咖啡葛-PB(43)

百乐得(44) 达而丰(44) 阿扎芬(44) 奈福潘(45) 镇痛新(45)

(三) 消炎、解热、镇痛药.....(46)

瑞培林(46) 痛热宁(46) 格里发那(47) 痛湿灵(47) 灵加消

(47) 保弗灵(48) 氟苯水杨酸(49) 烟氟灭酸(49) 风平(50)

舒洛芬(50) 消痛灵(51) 费啉(51) 服他灵(52) 长效服他灵(52)

炎易妥(52) 拔怒风(53) 优洛芬(53) 撒烈痛(54) 多疗彼安(54)

福禄达明(55) 苯扎(55) 强力苯扎(56) 苯扎鼻炎丸(56)

泰必治(56) 罗拜辛(57)

(四) 抗痛风药.....(58)

秋水仙碱(58) 丙磺舒(58) 痛风宁(59)

(五) 抗震颤麻痹药.....(59)

美道普-125(59) 开马君(60) 西姆特尔(60) 优麦克斯(61)

(六) 抗精神病药.....(62)

美立廉(62) 斯特米梯(62) 氟奋乃静(63) 达乐丹(63)

耐阔(64) 舒必利(64) 泰普尔多(65) 氯氮平(65) 安棕酯

(66) 氟斯必灵(66) 安拿芬尼(67) 佐特平(67) 因息顿(68)

拉劳克斯(68) 利彼乐(69) 露滴美(69) 利他林(70) 凯舒(70)

(七) 抗焦虑和抗癫痫药.....(70)

利眠宁(70) 安定(71) 眠确当(72) 妥眠当(72) 利福全(72)
罗眠乐(73) 速眠安(73) 宁神定(74) 芬那露(74) 替格列
妥(75) 欧斯旁特(75) 抗癫灵(76)

(八) 镇静、催眠、抗惊厥药.....(76)

美多眠(76) 吐钠(77) 麦络克坦(77) 芬那达明(78) 阿达林
(78) 多利丹(78) 脑疗达(79) 海尔神(79)

第四章 麻醉药及辅助醉麻药物

拉可他(81) 易使宁(81) 异氟烷(82) 凯他敏(82) 赛罗卡因
[83] 力奥来素(83) 潘寇罗宁(84) 爱肌松(84) 维库罗宁(85)
弗来西特(85)

第五章 主作用于循环系统的药物

(一) 强心药(86)

西地兰D(86) 地高辛(86) 爱心静(87)

(二) 抗心律失常药.....(87)

普鲁卡因胺(87) 胺碘酮(88) 诺佩斯(89) 定搏律定(89)
脉安定(90) 阿吗灵(90) 新缓脉灵(91) 缓脉灵双氯乙酯(91)
美西律(92) 利他脉(92) 异搏停(93) 敌胺(94)

(三) 防治心绞痛药.....(94)

硝酸甘油(94) 永保心宁气雾剂(95) 硝酸甘油护心膏(95)
札顿(96) 长效硝酸甘油(96) 复方硝酸甘油(97) 基那(97)
尼托罗(97) 消心痛注射液(98) 异速凯他(99) 异舒吉气雾剂
(99) 长效易顺脉(100) 吗导敏(100) 衰得命(100) 潘生丁
(101) 心可定(102) 尼非地平(102) 佩尔迪喷(103) 合心爽
(103) 心力加(104) 救心丹(104)

(四) 周围血管扩张药 ... (105)

脑益嗪(105) 利脉顺(105) 脉栓通(106) 罗尼可(106)
康维脑(107) 适脑脉(107) 喜德镇(108) 麦角溴烟酯(109)
地洛特(109) 乐福调(110) 抗栓丸(110) 哈里多(111)

瑞支亨(111)	达苯尼林(112)	血管舒缓素(113)	诺斯帕(113)
脑灵(114)	托派松(114)	都可喜(114)	r-氨基羟酪酸(115)
(五) 降血压药.....(115)			
硝普钠(115)	刻甫定(116)	爱道美(117)	脉宁平(117)
爱达芬(118)	海固通-利血平(118)	阿普利灵素(118)	普乐利(119)
含钾苄氟噻嗪(119)	降压利(120)	降压乐(120)	
钠催离(121)	埃司白他(121)	定可利压(122)	阿方那特(123)
喷他明(123)	四氯吗啉铵(124)	心得安(124)	蔡羟心安(125)
心得平(125)	长效心得平(126)	心得神(126)	维斯加迪(127)
心复宁(127)	美多心安(128)	氨酰心安(128)	拉贝洛尔(129)
(六) 降血脂药.....(130)			
麦固醇(130)	利扑斯太(130)	脉通(131)	活脉素(131)
Substerol S(131)	安妥明(132)	安妥明丙二醇脂(132)	特调脂(133)
心降酯(133)	诺衡(134)	潘特生(134)	酶脂定(135)
(七) 血管活性药.....(135)			
阿拉明(135)	增血压素(136)	多巴酚丁胺(137)	低压丁(137)

第六章 主作用于呼吸系统的药物

(一) 祛痰药.....(139)	
必嗽平(139)	氨溴醇(139)
稀化黏素(140)	咳福乐(140)
阿斯威林(141)	咳即消长效止咳片(141)
(二) 平喘药.....(142)	
安瑞定(142)	强力安喘通(142)
保定呐丁(143)	喘乐灵(143)
因诺林(144)	芬忒醇(144)
羟丙茶碱(145)	新双茶碱肛用药(146)
美普定(146)	茶丙喘宁(147)
色甘酸钠(147)	萨地酮(148)
必可酮(148)	喘泰气雾剂(149)

第七章 主作用于消化系统的药物

(一) 抗酸药及治疗溃疡病药.....(150)	
西米替丁(150)	善胃得(150)
蒙胃顿(151)	乐得胃(151)
胃仙U(152)	佳胃治胃片(152)
德国和路胃片(153)	胃必治

- (153) 妥胃U(154) 太田胃片(154) 利加乐双层胃片(155)
胃格乐(155) 和泉强力正露丸(156) 格巴坚M胃片(156) 怀氏复
方甲基硅氧烷(156) 利凯胃肠药锭(157) 胃益宁(157) 必舒胃(158)
- (二) 胃肠解痉药(158)
普鲁本辛(158) 服止宁(159) 溴甲乙哌嗪平(159) 安退痲那
(160) 达力康(161) 利肠挛(161) 新握克丁(162) 哌明
(162) 麦皮凡林(163) 百乐而精(163) 丁基莨菪(164)
- (三) 健胃消化及止呕、止泻药.....(164)
多潘立酮(164) 苯丁哌胺(165) 西纳梅脱(165) 康彼身(166)
强力胰酶片(166)
- (四) 肝脏辅助药.....(167)
保肝能(167) 谷胱甘肽(167) 利肝能(168) 利肝隆(168)
肝得治(169) 肝立健(169) 复方保肝宁(170) 沥毒停(170)
克劳酸(171) 肝隆(171) 肝宝(172) 安肝灵(172) 乙型肝炎疫苗注射剂(173)
- (五) 利胆药(173)
利胆素(173) 氧甲基烟酰胺(174) 肥利克(174) 嘉宁胆石溶
解剂(175) 宝灵肝胆护理丸(175) 利胆通(176) 西德消石灵
(176) 乐可活(176) 华沙利胆丸(177)

第八章 主作用于泌尿系统的药物

- 膀胱灵(178) 尿多灵(178) 泌尿灵(179) 消石灵(179)
消石素(180) 优克隆(180) 太阳牌消石丸(181) 利石素(181)
露化尿石(181) 尿通(182) 护前列素(182)

第九章 影响血液及造血系统的药物

- 速血凝 M(183) 凝血质(183) 肝素(184) 尿激酶(184)
华法令(185) 心德隆(185) 纤维蛋白溶酶(186) 促凝康(186)
安特灵(187) 阿格鲁明(187) 抑肽酶(188)

第十章 抗变态反应药物

- 迈神(189) 治肤宁(189) 茶苯海明(190) 扑敏宁(190)

好克敏(190) 泛尼替斯(191) 头痛灵(191) 抗组胺复合剂(192)

第十一章 激素及有关药物

的确当(193) 康宁克通-A(193) 琥钠甲强龙(194) 超能特灵
(194) 多乐宝灵(195) 尼乐饱(195) 庚酸睾酮(196) 降糖灵
(197) 优降糖(197) 因苏林(198) 特泌胰(198) 达美康(199)
克糖利(200) 果开恩(200) 爱初新(201) 甲碘安(201) 丙基
硫氧嘧啶(202) 溴隐停(202) 爱保莲调经丸(203) 安君可(203)

第十二章 营养输液、生化制剂及抗衰老药物

三磷酸腺苷(204) 静脉用脂肪乳剂(204) 人血白蛋白(205) 人血
球蛋白(205) 补血康(206) 维生素H₃(206) 防老丸(207)
泛醌(207) 罗钙全(208) 双氢速变固醇(209) 施宝康补丸(209)
维纳斯粉(210) 克西兰(210) 几种复方氨基酸成分表(211)

第十三章 抗肿瘤药物

米尔法兰(212) 癌腺治(212) 嘧氟啶(213) 左旋天冬酰胺酶
(213) 环磷酰胺(214) 乐疾宁(214) 依木兰(215) 爱力生
(215) 丝裂霉素C(216) 柔红霉素(217) 阿霉素(217)
、 阿克拉比星(218) 匹来霉素(219) 表阿霉素(219) 东洋霉素
(220) 解肾腺瘤(220) 抑乳癌(221) 顺铂(221) 罗氏疗治
癌(222) 长春地辛(223) 胺苯吡啶(223) 马兜铃酸(224)
癌肤治(224)

第十四章 诊断用药物

泛影葡胺(226) 康拉-280(226) 胆影葡胺(227) 碘番酸(227)
必洛坡定(228) 碘苯酯(228) 阿米派克(229) 代马克斯(229)
丙碘酮(230) 腾喜龙(230) 诊断用绿针(230)

第十五章 皮肤科用药物

银屑灵(232) 敏白灵(232) 三甲咪豆素(233) 保肤灵(233)
倍他米松(234) 仙乃乐(235) 仙乃乐-N(235) 庆那可软膏

(235) 复方康纳乐霜(236) 斯的罗生(236) 康纳可滴耳剂
(237) 肤利爽(237) 肤利爽C(238) 娥罗钠英软膏(238)
抗真菌一号(238) 皮洛阿依(239) 癣可宁(239) 乐家美(239)
优力斯(240) 喜疗妥药膏(240) 夫轻松软膏(241) 对甲氧酚
(241) 风湿Q软膏(242) 薄荷膏(242) 无比膏(242) 快痔
清痔疮膏(243) 一贴好外伤胶布(243) 力达有孔膏布(243)
普拉妥气雾剂(244) 东莨菪碱贴膏(244) 意膏牛皮癣膏(244)

第十六章 眼科用药物

视明露(246) 卡他林(246) 法可灵(246) 谷胱甘肽滴眼剂(247)
奴维新(247) 噻吗心安滴眼剂(248) 散瞳药水(248) 眼圣眼滴
眼剂(249) 地灵确超眼/耳悬液(249) 强力珍珠眼药水(249) 保健眼
药水(250) 天鹅眼药水(250) 安妥碘(250) 素高捷疗眼膏(251)

第十七章 其它药物

吡斯的明(252) 甲氮酰胺(252) 喉灵糖(253) H痔疮特配锭剂
(253) 恶涕完(253) 阿莫散(253) Ribatran(254) 和泉奇
应丸(254) 强力痔根断(255) 环孢霉素(255) 青霉胺(256)

附录一、各国名称英汉对译表(257)

附录二、进口药品国家主要药厂一览表(258)

附录三、汉英月份对译表(265)

附录四、药物剂型、批号、期限辨认(265)

附录五、老幼剂量折算表(267)

附录六、进口药物品种及其有效期(268)

中文索引(271)

外文索引(293)

第一章 抗生素

(一) 青霉素类

苄星青霉素G Benzathine penicillin G

【又名】 长效西林, 长效青霉素, 比西林, Extencilline (法国), Dibencil, Longacillina, Bicillini, Tardocillin, Longicil, Penidural, Penzaethinum G。

【作用与用途】 本品适用于对青霉素敏感菌所致的轻、中度感染或须长期使用青霉素作预防措施的患者。

【剂型与规格】 粉针剂: 120万u。

【用法与用量】 深部肌注: 每次60万u, 每半月1次, 或每次120万u, 每月1次。

【注意事项】 (1) 可发生过敏性休克, 用前须做过敏试验。(2) 长期使用可影响肠道内维生素B的合成。(3) 肌注会引起局部触痛。(4) 不可供静脉注射。

利本他 Retarpen (澳大利亚)

【又名】 二苄乙二胺青霉素, Dibenzylethylenediaminedipenicillin。

【作用与用途】 本品为长效青霉素, 用于预防对青霉素

敏感菌（嗜血链球菌A，梅毒螺旋体等）所致疾病，如：风湿热、心内膜炎、猩红热等。

【剂型与规格】粉针剂：120万u，240万u。

【用法与用量】深部肌注：每次120~240万u，每月1次；重症患者，每次240万u，每周1次。

【注意事项】（1）可发生过敏性休克，用前须做过敏试验。（2）长期使用可影响肠道内维生素B的形成。（3）肌注会引起局部触痛。（4）不可供静脉注射。

强化“都美”长效西林 Diamine Penicillin Fortified(丹麦)

【作用与用途】本品由三种青霉素组合而成，具有速效和长效抑菌作用。主要用于预防风湿病的复发以及防止心脏瓣膜病人的细菌性心内膜炎发生。

【剂型与规格】针剂：每瓶含苄星青霉素60万u，青霉素G钠30万u，普鲁卡因青霉素30万u。

【用法与用量】深部肌注：每次1~2支，每2~4周1次。

【注意事项】（1）可发生过敏性休克，用前须做过敏试验。（2）长期使用可影响肠道内维生素B的合成。（3）肌注会引起局部触痛。（4）不可供静脉注射。

赛米西林 Semicillin(匈牙利)

【又名】氨苄青霉素，安比西林。

Penbritin(英国), Ampicillin[I], Ampi-co, Omnipen, Ampilan, Amcillin, Ampleril, Nuvapen, Amplinova, Eurocillin, Polycillin, Doktacillin, Binotal, Totapen。

【作用与用途】广谱半合成青霉素。用于大肠杆菌、变形杆菌、肺炎球菌等引起的感染。

【剂型与规格】粉针剂：0.25g，0.5g，1.0g。胶囊：0.25g，0.5g。

【用法与用量】肌注，静滴或口服：每次0.25~1.0g，每日4次。视病菌及病种而异，可用至每日6~12g。

【注意事项】（1）肌注宜深，宜慢。（2）用前作过敏试验。（3）忌与碱性药物配伍。

卡比西林 Pyopen（英国）

【又名】羧苄青霉素钠，Carbenicillim disodium, Carbenicillin [I]，Carbapen, Carbecin, Geopen, Hyper, Microcillin。

【作用与用途】广谱半合成青霉素，用于绿脓杆菌、变形杆菌、大肠杆菌等引起的各种感染。

【剂型与规格】粉针剂：1.0g。

【用法与用量】肌注：每次1.0g，每日4次。静滴、静注：每日10~20g，分2~3次给予。重症，每日30~40g。

【注意事项】（1）与青霉素有交叉过敏反应，用前须作过敏试验。（2）与丙磺舒合用可提高血药浓度。（3）与庆大霉素合用宜分开注射。

卡他西林 Kedacillin（日本）

【又名】磺苄青霉素，Sulbenicillin [I]，Sulfocillin, Lilacillin。

【作用与用途】抗菌谱与羧苄青霉素相似，但对绿脓杆

菌作用较强。用于绿脓杆菌、大肠杆菌等引起的感染。

【剂型与规格】粉针剂：1.0g，2.5g。

【用法与用量】静滴：每日4～8g。静注：每日4～8g，分2～4次给予。

【注意事项】（1）皮试同羧苄青霉素。（2）与庆大霉素合用宜分开注射。

阿莫西林 Amoxil（英国）

【又名】羟氨苄青霉素，Amoxicillin〔I〕，Daxipen, Amoxipen, Larocin, Larotid（瑞士），Polymox（美国），Trimox（美国），Sawacillin。

【作用与用途】广谱抗生素，作用比氨苄青霉素强。用于溶血性链球菌、肺炎球菌，对青霉素G敏感的金葡菌、白喉杆菌、破伤风杆菌等引起的感染。

【剂型与规格】粉针剂：0.25g，0.5g，1.0g。胶囊、片剂：0.25g，0.5g。

【用法与用量】口服：每次0.25～0.5g，每日3次。静注：每次0.5～2g，每日4～6次。肌注：每次0.25～0.5g，每日3次。

【注意事项】（1）个别可出现嗜酸性粒细胞增高和白细胞降低，偶见念珠菌二重感染。（2）其它同氨苄西林。

哌哌西林 Piperacillin Sodium（日本）

【又名】氧哌嗪青霉素钠，氧哌嗪青霉素，哌氨苄青霉素，Piperacillin〔I〕，Orocin, Pipril。

【作用与用途】广谱抗生素，对绿脓、变形和肺炎杆菌

等作用比磺苄青霉素强，对肠球菌、厌氧菌等也有效。主要用于敏感菌引起的各种感染。

【剂型与规格】针剂：0.5g。

【用法与用量】肌注、静注或静滴：每日2~4g，最多可用16g，分2~4次给予。

【注意事项】（1）用前作过敏试验。（2）少数病例可见肝功能异常和血象改变，反应严重时应停药。

呋苄西林 Furbenicillin（日本）

【又名】呋脲苄青霉素，呋喃酰脲苄青霉素，呋氨西林。

【作用与用途】作用类似氨苄青霉素，但对绿脓杆菌的作用比羧苄青霉素强4~6倍。用于敏感菌所致感染。

【剂型与规格】粉针剂：0.25g。

【用法与用量】静注或静滴：每日4~8g，分2~4次给予。

【注意事项】（1）用前作皮试。（2）应现用现配。（3）有消化道不良反应。

密沙西林-S Methocillin-S（日本）

【又名】氯唑西林，邻氯青霉素，邻氯苯甲异恶唑青霉素钠，氯苯西林，Orbenin（英国），Cloxacillin〔I〕，Tegopen，Ankerbin，Austrastaph，Bactopen，Gelstaph，Penstaphon。

【作用与用途】半合成青霉素，耐酸耐青霉素酶。用于抗药金葡菌引起的各种严重感染，如心内膜炎、败血症、骨

髓炎、脑膜炎、尿路感染、肝脓肿、创伤及手术后感染等。

【剂型与规格】针剂：0.25g，0.5g。胶囊剂：0.25g，0.5g。

【用法与用量】口服：每次0.5~1.0g，每日4~6次。肌注：每次0.25g，每6小时1次。静注：每次0.5g，每4~6小时1次。

【注意事项】（1）用前作皮试。（2）本品宜空腹（饭前1小时或饭后2小时）服。（3）丙磺舒可提高其血药浓度。

羧苄青霉素苄满酯钠 Carindacillin Sodium [I]

【又名】羧苄青霉素酯钠，卡丹青霉素，羧苄青霉素，Geocillin（美国），Carindapen，Indaryl Carbenicillin Sodium，Indaryl ester of Carbenicillin。

【作用与用途】在体内释出羧苄青霉素。适用于绿脓杆菌、大肠杆菌和变形杆菌所致的尿路感染等。

【剂型与规格】片剂：0.5g。

【用法与用量】口服：每次0.5~1.0g，每日4次。

【注意事项】（1）口服可引起过敏性死亡，青霉素过敏者忌用。（2）可能出现血小板、中性白细胞减少，转氨酶升高，最好定期检查肝、肾及造血系统机能。

氨苄青霉素酞酯 Talampicillin [I]（日本）

【又名】酞氨苄西林，酞氨苄青霉素，TAPC，Talpen。

【作用与用途】为氨苄青霉素的酯化衍生物，在体内水

解为氨苄青霉素，具有口服吸收完全、水解速度快、分布广泛等特点。临床主要用于呼吸系统感染和泌尿系统感染，如扁桃体炎、咽喉炎、急慢性支气管炎、肺炎、膀胱炎、肾盂肾炎、盆腔炎等。

【剂型与规格】胶囊：0.125g，0.25g。

【用法与用量】口服：每次0.125~0.25g，每日3~4次。

【注意事项】（1）可能发生过敏反应，对青霉素过敏者禁用。（2）有皮疹、胃不适、皮肤瘙痒、腹痛等不良反应。

氨苄肟青霉素 Selexidleo（丹麦）

【又名】Mecillinan〔I〕，Selexid，Coactin。

【作用与用途】本品的作用点与其它 β -内酰胺类不同，对细菌细胞膜上的结合蛋白-2亲和力很强，对某些肠道细菌有较强的活性，对革兰阳性菌作用甚微。因其抗菌谱窄，抗菌活性强，作用模式独特，临床上主要与其它 β -内酰胺抗生素合用于某些耐药菌感染，此外对大肠杆菌引起的尿路感染疗效较佳。

【剂型与规格】针剂：0.4g。

【用法与用量】肌注或静注：每次0.4~0.6g，每6小时1次。

【注意事项】（1）个别病例可出现皮疹、嗜酸性粒细胞增多。（2）可能发生过敏反应，用前应做皮试。

氨苄肟青霉素双酯 Pivmecillinam〔I〕

【又名】吡呋氮苄肟青霉素 Melysin（日本）。