

# 常见皮肤病中医疗法

陈树榕

福建科学技术出版社

一九八五年·福州

# 目 录

第一 章 概論	( 1 )
第一节 皮肤病的中医文献概要	( 1 )
第二节 皮肤病的病因病理	( 2 )
第三节 皮肤病的症状	( 4 )
第四节 皮肤病的诊断与辨证	( 6 )
第五节 皮肤病的治疗	( 8 )
第二 章 变态反应性皮肤病	( 13 )
第一节 荨麻疹	( 13 )
第二节 接触性皮炎	( 16 )
第三节 药物性皮炎	( 17 )
第四节 湿疹	( 20 )
附一：婴儿湿疹	( 23 )
附二：乳晕部湿疹	( 26 )
第三 章 物理性皮肤病	( 28 )
第一节 植物-日光性皮炎	( 28 )
第二节 夏季皮炎	( 29 )
第四 章 职业性皮肤病	( 30 )
第五 章 神经功能障碍性皮肤病	( 32 )
第一节 痒痒症	( 32 )
第二节 神经性皮炎	( 35 )
第六 章 红斑鳞屑性皮肤病	( 39 )
第一节 银屑病	( 39 )

第二节	结节性红斑.....	( 40 )
第三节	多形性红斑.....	( 42 )
第四节	玫瑰糠疹.....	( 43 )
第七章	结缔组织疾病.....	( 45 )
第八章	疱疹性皮肤病.....	( 49 )
	天疱疮.....	( 49 )
第九章	球菌性皮肤病.....	( 51 )
第一节	脓疱疮.....	( 51 )
第二节	疖.....	( 52 )
	附：蝼蛄疖.....	( 55 )
第三节	丹毒.....	( 56 )
	附一：大头瘟（颜面丹毒）.....	( 58 )
	附二：赤游丹.....	( 60 )
	附三：流火（下肢丹毒）.....	( 61 )
第十章	杆菌性皮肤病.....	( 62 )
第一节	寻常狼疮.....	( 62 )
第二节	硬红斑.....	( 63 )
第十一章	霉菌性皮肤病.....	( 65 )
第一节	头癣.....	( 65 )
第二节	体癣.....	( 66 )
第三节	手癣.....	( 67 )
第四节	足癣.....	( 68 )
第五节	甲癣.....	( 69 )
第六节	花斑癣.....	( 70 )
第十二章	病毒性皮肤病.....	( 72 )
第一节	单纯疱疹.....	( 72 )
第二节	带状疱疹.....	( 73 )

第三节 疣.....	(74)
第十三章 色素障碍性皮肤病.....	(77)
第十四章 皮肤附属器疾病.....	(79)
第一节 斑秃.....	(79)
附一：早年秃发症.....	(80)
附二：其他脱发症.....	(82)
附三：早年白发症.....	(82)
第二节 皮脂溢出.....	(83)
第三节 脂溢性皮炎.....	(84)
附一：全身性脂溢性皮炎.....	(85)
附二：皮脂缺乏症.....	(85)
第四节 寻常痤疮.....	(86)
第五节 酒渣鼻.....	(87)
第六节 臭汗症.....	(88)
第十五章 血管性皮肤病.....	(90)
第一节 血小板减少性紫癜.....	(90)
第二节 过敏性紫癜.....	(91)
附一：内服方剂.....	(93)
附二：外用方剂.....	(113)

# 第一章 概 论

## 第一节 皮肤病的中医文献概要

中医文献关于皮肤病的记载很早就有。远在《黄帝内经》中，就有“痛痒疮”等记载。后汉张仲景的《金匱要略》也载有“浸淫疮，从口流向四肢者，可治；从四肢流来入口者，不可治”。隋朝巢氏元方等所撰的《诸病源候论》中，对于皮肤湿疹症状的记载更加详细，如“……湿热相搏，故头面身体皆生疮，其疮初疱，须臾生汁，热盛者则变为脓，随愈随发”；又如“肤腠风湿搏于血气生病。若风气少，湿气多，其疮痛痒，搔之汁出……”再如“疥者有数种，有大疥、有马疥、有水疥、有干疥、有湿疥，多生手足，乃至遍体……湿疥者，小疮皮薄，常有汁出，并皆有虫，人往往以针头挑得，状如水内病虫”。唐朝孙思邈的《备急千金要方》对麻风病的症状和治疗，论述尤为精深。宋代王怀隐等编的《太平圣惠方》，以及陈自明的《外科精要》等书，都记载了许多有关皮肤病的疗法和处方。元代齐德之著《外科精义》，其中对皮肤病的治疗已有新的发展。明代陈实功著《外科正宗》所记载皮肤病，有些是以前医书中所无者，如白屑风等等。清代祁坤著的《外科大成》叙述各种疮疡的辨证治疗方法。吴谦等集体编著的《医宗金鉴》，其中《外科心法要诀》部分，记载了近百种皮肤病，内容比较系统扼要。此外，如《疡科心得集》、《外科证治全书》均载有杨

梅结毒、天疱、疥癣之类皮肤病，内容各有特色。

在祖国医学文献中，皮肤病的命名很不一致，而且名称极多。单以《疡科心得集》、《医宗金鉴》、《外科全生集》三书所载，就有五十一种之多。在古医籍中，以疮、疡二字命名中医外科，称“疮疡科”，认为“疮者皮外也，疡者皮内也”。发生在皮肤上的病变，多用“疮”来命名。《医宗金鉴》说：“疽由筋骨阴分发，肉脉阳分发曰痈，疡起皮里肉之外，疮发皮肤疖通名”。也就是说，“疮”是发生在皮肤上的，例如杨梅疮（梅毒）、浸淫疮（湿疹）、火赤疮（天疱疮）、猫眼疮（多形红斑）、漆疮（漆性皮炎）、胎敛疮（婴儿湿疹）、鹅口疮（口腔粘膜念珠菌病）、摄领疮（神经性皮炎）等。

## 第二节 皮肤病的病因病理

人体的组成，外有皮、脉、肉、筋、骨，内有五脏六腑，内外相应，形成一个整体。所以，皮肤和内脏是互相联系，不能分割的。

皮肤和内脏是通过经络而互相联系起来的。经络外应皮肉，内应脏腑。《内经》说“肺之合皮也，其荣毛也”，故皮毛属肺；“脾之合肉也，其荣唇也”，故肌肉属脾。又云“诸痛痒疮，皆属于心”。因此，可以说，皮肤与肺、脾、心的关系最密切。

### 一、风、湿、热

皮肤病的原因很多，主要是由风、湿、热相搏而成的。《内经》说：“诸痛痒疮，皆属于心。”心主热，火之化，热甚则疮痛，热微则疮痒；热近则痛，热远则痒。《诸病源

候论》说：“肺主气，候于皮毛，脾主肌肉。气虚则肤腠开，为风湿所乘；内热则脾气温，脾气温则肌肉生热也。湿热相搏，故头面身体皆生疮也。”又云：“地之湿气感之则害皮肉筋脉。”“汗出见湿，乃生痤痱。”这说明了皮肤病的主要原因和机转。

由于病因不同，临床症状也有差异。因风燥而发者，风性善行，袭入肌肤则走窜四肢，故常遍体瘙痒，如虫虱之行于肌肤之中。风胜则燥，虽皮破血溢，亦能随破随收，不致化腐，干疥、风疹、瘾疹、丹痧之类皆属此证。因湿郁生热而发，则血浊不清，流溢肌表，生湿蕴热，其痒尤剧，且浸淫四窜，黄水频流，最易蚀腐传染，黄水、脓疱诸疮皆属湿热之证，难求速愈。

## 二、虫

虫是引起皮肤病的主要原因之一，甚至是直接的因素。由虫引起的皮肤病，一类是感染了虫，在受损害的皮肤中可以找到小虫，如疥疮的疥虫，引起肛门湿疹的蛲虫等；另一类是从症状上，推测其可能与虫有关，如《医宗金鉴》“癣”中说：“此证总有风热湿邪，侵袭皮肤，郁久风盛，则化为虫，是以搔痒之无休也”。

## 三、其他因素

除以上原因外，还有其他因素，如气候：天热易生疖疮、天疱疮，天冷引起冻疮等；禀性：禀性不耐者可生膏药风、漆疮、红花草疮、沥青疮等；虫类毒液：因蚊、虱、蜂叮引起斑疹；传染：因接触病毒，如麻风、梅毒等；职业：因手足多摩擦，如皲裂疮。

祖国医学对皮肤病病因学的认识，是从整体观念出发的。不仅注意到外因六淫（风、寒、暑、湿、燥、火），以

及虫毒、疫疠侵袭等，而且重视内因七情，即喜、怒、忧、思、悲、恐、惊等情志的表现，以及饮食、劳倦等致病因素，并兼顾到内因和外因的相互影响。机体在各种内外致病因素作用下，发生邪正消长，阴阳失调，气血、津液和脏腑功能紊乱，均可在体表出现皮肤病变。

人的气血虚，又逢可致病的内因、外因，皆可发生全身疾病或局部皮肤病。《诸病源候论》说：“内热外虚，为风湿所乘则生疮……”又说：“凡人血气虚为风邪所伤则起痒疹，寒多则色赤，风多则色白，甚者痒痛，搔之则成疮……邪气客于肌，则令肌肉虚，真气散去，又被寒搏皮肤，皮外发腠理闭，毫毛淫邪与卫气相搏，阳胜则热，阴胜则寒，寒则表虚，虚则邪气往来，故肉痒也。”这说明是外因通过内因而起变化，先由人体腠理不密、卫气不固，风邪得以乘隙侵入皮肤之间，而引发皮肤病。

### 第三节 皮肤病的症状

皮肤病多种多样，症状各不相同。除瘙痒、灼热、疼痛、麻木等自觉症状外，常见有以下他觉症状（即皮肤损害，又称皮疹）：

#### （一）水疱

疱内有水，分小疱与大疱二种。针头大到半个粟粒大的小疱，隆起皮面，如缠腰火丹；大疱如天疱疮，或疱含黄水，如黄水疮。

#### （二）脓疱

含有脓液，有原发性及继发性炎症，疱破后形成糜烂，或结痂，如脓窠疮。

### (三) 斑

为皮肤色泽的改变，或红或白，微有高肿，但摸不到隆起，白色的叫风斑，红色的叫红斑或紫斑，又有因汗渍而成的汗斑。

### (四) 疣

形如小丘，呈孤立的小粒突起，高出皮肤表面。

### (五) 痘

状如麻豆，甚者渐大，发亮光泽，形如水疱，搔之成疮，如暑疖。

### (六) 结节

独立的大丘疹，位于真皮或皮下组织内。大小不一，大者如桂圆，小者如豆粒，如痰核流注。

### (七) 风团

轻微隆起，呈宽阔平塌，游走不定，来去迅速，消退后不遗留任何痕迹，如风疹。

### (八) 鳞屑

皮疹上干燥的表皮附着如鳞状，又称为皮屑，如猩红热、鱼鳞病。

### (九) 结痂

含有纤维蛋白的分泌物，与空气接触干燥而成，有脓痂、血痂之别。

### (十) 鳞裂

皮肤沿皮纹断离，形成深浅不等的裂口，如手足皲裂，每易见于渔民、染布工人。

### (十一) 瘢痕

乃结缔组织与上皮所形成。如只损伤表皮，不会形成瘢痕；必伤及真皮层，治愈后才会遗留瘢痕。

### (十二) 疣

是较常见的病毒性赘生物，发于皮肤浅表，又称赘疣，俗称“老鼠奶”、“瘊子”或“竖头肉”。

### (十三) 痘

皮肤上生凸起的斑点，有黑色、紫色等。几乎人人都有，不过有多少或大小之别。

### (十四) 肋胝

手足皮肤厚硬，多发生在摩擦部位，如脚前掌，每易见于体力劳动者。

### (十五) 色素沉着

多数是继发于慢性皮肤病之后，局部变褐色、暗褐或黑色，有的可能逐渐消失，亦有永久不退的。

## 第四节 皮肤病的诊断与辨证

### 一、皮肤病的诊断

中医诊断上的四诊八纲，是一个整体的观念。皮肤病的诊断也是如此，除一般内科常规诊断以外，还须注意皮肤局部的改变。

(一) 皮肤局部颜色的改变 皮肤病因颜色不同而有种种名称，如皮肤有白块叫白斑，白块较大的叫白癞；皮肤有黑块叫黑斑，颜色发红叫红斑；色白者多属于寒，偏于气分，而色红者属于热，偏于血分。

(二) 皮肤局部形态的改变 比皮肤表面隆起，由针头大到豌豆大的，其顶端为圆的、尖的或圆锥形的叫丘疹；内含有液体的叫浆液性丘疹；内含脓液的叫脓疱；由豌豆大以上到胡桃大的半球形隆起叫结节。

丘疹与结节多由体表腠理疏松，受风侵袭而发生，而内含有液体的疱疹等，多为体内有湿。若皮肤突然发生急性肿胀而局部高起，大小不一，多成圆形，或白色或红色，其特点是发生快，消退也很快，叫风团，或称风疹块。

## 二、皮肤病的辨证

(一) 风证 风善行多变，如风痒疮(荨麻疹)，风湿之病如痈疮(手背湿疹)，肾囊风(阴囊湿疹)。风易化燥，伤血伤阴，如白屑风(牛皮癣)。

(二) 湿证 湿证有外湿、内湿之分。外湿多系居处潮湿或水中作业所引起的；内湿皆因脾虚运化不健，水湿停滞，或多饮茶酒，或多吃油腻辛辣的食物，以致使脾胃内蕴湿热。湿表现于皮肤，轻则起疱，重则浸淫成片。浸淫成片的则生脚湿气(足癣)、湿毒疮(限局性湿疹)、浸淫疮(泛发性湿疹)、水毒(水田性皮炎)等；湿热下注则生坐板疮(臀部皮炎或湿疹)。

(三) 热证、火证 热与火均与疮疡有关，表现于皮肤则为焮热、红、肿。热自外来的，如外受暑热而生疮疖、痈毒及日晒疮(日光性皮炎)；皮肤直接受热易致烫火伤；接触辛热有毒的东西如生漆则生漆疮(漆性皮炎)；火自内生者，心火妄动则生赤疮；肝火妄动则生缠腰火丹(带状疱疹)。

(四) 血分异常 血虚则形成脱发(斑秃)；血虚生风，风胜血燥则生白屑风(头皮糠疹)、风燥痒(皮肤瘙痒症)；年少血热，则头发变白或变黄；血瘀则生梅核丹(结节性红斑)。

总之，局部皮肤突然发红，有痛感，偏于热盛。若局部

皮肤发痒，有浆水，不发红，表面粗糙的，为湿盛。热毒盛者，病变发生，多在上肢；湿毒盛者，病变发生，多在下肢。若局部发红，红似流火，边缘不清楚，时而发痛，此属湿热挟风。

## 第五节 皮肤病的治疗

皮肤病的致病因素是比较复杂的，临床症状各有其特征。在辨证治疗时，必须运用四诊八纲，抓住主要矛盾，确定治疗方法。

皮肤病的种类很多，对症治疗占有重要位置。张仲景曰：“皮毛治法者，感轻之症病也，未深入营卫故从皮毛上治之……此等不必用汤药。”皮肤病虽病在皮肤外表，但与整个身体密切相关。某些皮肤病是全身疾病的一种表现，若单纯治疗局部皮肤损害，收效不大，还必须内服药与外用药并进。但运用内服药时，应注意标本缓急和其他的一般治疗，如休息，注意饮食，通畅大便，除去病原等。

### 一、皮肤病的一般处理原则

1. 对初诊病人，尤其是急性患者，应了解其用药经过、疗效和有否过敏反应等情况，然后才能决定用药处方。

2. 皮肤病虽属外生疮疡，但皆由脏腑内毒蕴结于中，而发于外，故应依据整体观念论治。

3. 任何初诊病人，病急而元气实者，先治其标；病缓而元气虚者，先治其本；若病急而元气又虚者，必先治本而兼以治标。

4. 在治疗过程中，若原用药物疗效好，不可随便更换其

他药物。

5.皮肤病虽然为局部表皮的病变，但综合性治疗，如饮食的调配，情绪、环境的调整，也是必要的。

治疗的方法很多，但内治不越养血祛风、化湿清热、凉营解毒；外治以止痒润燥，收水清火为主。

## 二、内服药的运用

1.风证：皮损呈干性，游走不定，泛发全身，瘙痒无常。风有外风（风寒、风热）、内风（血虚生风）之别，虽同样以祛风为主，但在辨证用药上各有不同。外风宜散，多用荆芥、防风、羌活、蝉衣、薄荷、牛蒡子、升麻、独活、白蒺藜、秦艽、威灵仙、白附子、菖蒲、苍耳子之类；内风宜息，多用乌蛇、蜂房、蜈蚣、全蝎等。但祛风剂中，每兼用养血、活血药，取“血行风自灭”之意。常用方剂如消风散。

2.湿证：皮损常呈湿性，湿润糜烂，破流脂水，或起水疱。具有“湿”的证候者，多用理湿药。风与湿相兼者，多用风药以胜湿，如羌活、独活、防风、苍耳子、豨莶草、地肤子之类；湿热相兼者，多用苦寒燥湿药，如苦参片、白藓皮、黄连、黄柏之类，或用清热利湿药，如车前子、泽泻、苍术、苡仁、茯苓、蚕砂、木通、滑石之类。湿有寒湿、湿热之分，临床以湿热为多见，有些方剂中，虽然用平胃散之类的燥脾除湿药，但多与寒凉药同用，因为皮肤病有寒湿发生者极少。常用方剂如萆薢渗湿汤、当归拈痛汤。

3.热证：皮损潮红而热，甚则糜烂疼痛，或起丘疹、红斑。具有“热（火）”证候者，多用寒凉药。热在气分的，应以清热解毒，如银花、连翘、黄芩、黄连、黄柏、山栀、花粉、石膏、知母、生甘草之类；热在血分的，应以清热凉

血，如赤芍、丹皮、生地、元参、犀角之类。常用方剂如芩连解毒汤。

4.燥证：皮损干燥脱屑，甚则粗糙发裂。具有“燥”的证候者，多用养血、滋阴润燥药，如当归、熟地、白芍、川芎、首乌、菟丝子、胡麻仁之类。“燥”不是致病的直接原因，一般是由风邪郁于皮肤，日久风胜血燥，而逐渐出现燥证，因此在养血润燥处方中，多兼祛风药。常用方剂如①滋燥养营汤：生地、熟地、当归、白芍、黄芩、防风、秦艽；②地黄饮：生地、熟地、首乌、当归、丹皮、元参、红花、甘草、僵蚕、白蒺藜。

5.瘀血证：此证多用活血化瘀药，如当归、桃仁、红花、赤芍、丹皮之类。

6.虫证：此证多用虫类祛风药，如僵蚕、蜈蚣、白花蛇、乌梢蛇之类。虫的化生，是由风邪或湿热所致，故处方中，又必兼用祛风或清利湿热之药。

以上说明了皮肤病辨证施治是有一定的规律的。如反复发作的皮肤病，常用黄芪以固表；因湿产生的皮肤病，有时需要补脾；风胜血燥的皮肤病，在养血润燥的同时，多兼用补肾滋阴；还有斑类、赘疣类及某些皮肤杂病，多以外治为主。

### 三、外用药的运用

治疗皮肤病，着重在外用药。外用药治疗皮肤病，每因用法的不同，即使用同样的药物，疗效也不一样。所以，应视证候的差异，选择适宜的疗法。

外用药的应用原则：有浆水渗出者，用油调敷药粉；无浆水渗出者，用软膏；发病暴急者，用洗剂。

外治方药有以下剂型：

1. 粉剂：一种或多种药物研制而成的干燥均匀细末。例如：用于痱子，具有清凉解热作用的玉女英<sup>(1)</sup>；用于足湿气，具有燥湿止痒作用的枯矾散<sup>(2)</sup>；用于汗斑，具有消退斑迹作用的密陀僧散<sup>(3)</sup>等。

2. 糊剂：用药末，以蜂蜜、丝瓜叶汁、菊花叶汁、芙蓉汁、大青叶汁，调成糊状使用。它一般具有清热消肿、活血止痛等作用，如金黄散<sup>(4)</sup>、青敷药<sup>(5)</sup>之类。

3. 酒剂：将药物浸于酒中，待药性渗出后，滤去药渣用酒，或将能溶于酒的药物，放于酒内，待溶后使用。它一般具有杀虫止痒祛风的作用，如治虱病的百部酒<sup>(6)</sup>，治癣用的羽液膏<sup>(7)</sup>或土槿皮酒<sup>(8)</sup>等。

4. 油剂：将药放入麻油（亦有用米糠、大豆烧熏所取的油）中浸煎，滤去药渣后即成。它与油膏的区别，在于不加入蜡，保持流动的油液。它一般具有杀虫止痒、祛风、润燥的作用，如治疗鹅掌风的红油<sup>(9)</sup>，治疗湿毒疮的青竹大豆油<sup>(10)</sup>等。

5. 油膏：一种是将药物放入麻油中浸煎，去渣后加入蜡，溶解冷透而成；另一种是用有脂肪的生药捣和而成。如具有清热解毒作用的黄连膏<sup>(11)</sup>，有滋肤润燥作用的润肌膏<sup>(12)</sup>，有杀虫止痒的臭灵丹<sup>(13)</sup>等。

6. 水剂：将药物放入水中煎煮后，去渣用药液。它一般具有清热解毒燥湿的作用，如清凉汁<sup>(14)</sup>，湿敷、涂布、浸泡皆可，多用于局部有糜烂化脓渗液的皮肤病。

7. 油粉调和剂：药粉加入麻油调和成稀糊状使用。它一般具有杀虫止痒、清热解毒燥湿的作用，如治疗黄水疮的一黄散<sup>(15)</sup>，治疗湿毒疮的青黛散<sup>(16)</sup>等。

8. 水粉调和剂：在水或醋内加入20~30%的药粉调和而

成。它一般具有清热解毒、杀虫止痒的作用，如治疗湿毒疮及癣病的二味拔毒散<sup>(17)</sup>、羊蹄根散<sup>(18)</sup>等。

9. 肥皂剂：以肥皂角为主药，加入其他药物配制而成，有的配成粉末，有的制成泥膏。多用于斑类皮肤病，如治疗汗斑的汗斑肥皂<sup>(19)</sup>。

10. 熏洗剂：将药物放入水中煎煮，乘热熏洗患处。它一般具有清热散风、杀虫止痒等作用，如治疗肾囊风的蛇床子汤<sup>(20)</sup>等。

11. 烟熏剂：将药研成粗末，与等量之艾绒拌和后，放在盆罐内燃烟，熏患处，或做成艾条使用。它一般用于顽固癣疾，如治疗干癣的熏癣药条<sup>(21)</sup>。

## 第二章 变态反应性皮肤病

### 第一节 荨 麻 疹

荨麻疹是变态反应引起的一种常见皮肤病。我国民间俗称“风疙瘩”、“痒疙瘩”、“泛疙瘩”、“鬼风疙瘩”等。祖国医学称为风疹块、痦瘤。

**【病因】**本病患者体质多属禀赋不耐，其发病不外内因、外因两个因素。内因脏器病变，气血不和，阴阳失调；外因卫表不固，汗出当风，感受风寒或风热之邪，郁于肌肤而发为本病。此外，如饮食不节，心情不畅，虫积脾胃，冲任不调等，均可为本病之成因。现代医学认为，本病可以由食物（鱼、虾、蟹、蛋等）、药物（青霉素、磺胺类、菌苗、各种血清等）、肠寄生虫、植物花粉、动物羽毛、昆虫叮咬等因素而引起，也可因感染病灶、内分泌障碍以及冷、热、光、压力等因素而发生。

在辨证论治上，本病除包括急性荨麻疹和慢性荨麻疹外，还与丘疹状荨麻疹、血管神经性水肿以及划痕症等相似。一般认为，它是风邪所致，故起病迅速，消退也快，游走不定，奇痒。但风邪致病往往有兼证，急性的一般有风寒证、风热证之分；慢性的有虚实寒热以及内风，外风之分。

**【症状】**开始疹子为局限的大小不等的扁平隆起，形如豆瓣，皮色鲜红或淡红，有热感。疹子随皮肤瘙痒而突然出现，并迅速增多增大，可融合呈大片，存在不久，骤然消