

謝玉瓊編撰 朱禮棠評注

麻科活人全書

上海衛生出版社

內 容 提 要

此書彙輯了有关麻疹的論証处方,和經驗方法,而增損編訂为四卷。卷一概括的說明了麻疹辨治方法,尤其着重在用藥方面,对于应用藥性,逐味詳述,并指示宜忌;卷二至卷四,从麻疹的初潮至已出、已收、收后,对每階段、每症候的辨証論治处方,用歌訣及說解寫出一百另八條,作了詳尽的介紹。最后一卷,附錄刘輯麻疹論及医案数則。

从來專述治療麻疹的医書很少,而能博採众長、詳細完備的更少,本書就有了这一特点,可供兒科医师研究和参考之需。

麻 科 活 人 全 書

謝 玉 瓊 編 撰

朱 礼 棠 評 注

*

上 海 衛 生 出 版 社 出 版

(上海淮海中路1670弄11号)

上海市書刊出版業營業許可証出 083 号

上海中和印刷廠印刷 新華書店上海發行所总經售

*

开本 787×1092 1/32 印張 7 字數 131,000

1957年5月第1版 1957年5月第1次印刷

印數 1-8,000

統一書号 14120·217

定价 (9) 0.80 元

麻科活人全書目次

卷一

麻疹骨髓賦	一
靜遠主人麻疹西江月	五
麻証条目法旨用藥要訣	九
增訂治麻問答捷要	一四
麻疹形式要旨証治祕訣	二一
麻疹証治大略括	二二
密齋治法大略括	二二
驗麻色吉凶	二二
麻疹輕証	二三
麻疹重証	二三
麻疹不治証	二三
麻疹死証括	二四
应用藥性	二四
麻后宜用藥性	三八

卷二

四方麻名第一	四八
歲氣第二	四八
預解宣毒第三	五〇
諸潮亦能發麻第四	五二
初潮認証第五	五四
初熱未明是否勿峻發表第六	五八
避風寒第七	五九
忌恣食生冷物驟用寒涼藥第八	六〇
忌食辛辣熱物誤用辛熱藥餌第九	六一
忌食諸肉雞魚鹽醋五辛等物第十	六三
忌兼用補澁第十一	六四
升發清涼解毒當分先后第十二	六五
倉麻當分天時第十三	六六
補中第十四	六七
正麻奶麻風癰不同第十五	六八
溫麻第十六	六九

痘夾麻出第十七	七一
蓋痘解毒麻第十八	七一
痘后出麻第十九	七二
閉症第二十	七三
首尾調和第二十一	七四
熱有遠近而出第二十二	七五
不熱第二十三	七六
微熱第二十四	七七
乍熱第二十五	七七
壯熱第二十六	七九
潮熱第二十七	八一
渴熱第二十八	八二
口渴恣飲致成水蓄第二十九	八三
復熱第三十	八四
始終潮熱第三十一	八六
煩燥第三十二	八六
出不快發不出第三十三	八七

过期不出第三十四	八九
已出熱甚不減第三十五	九一
已出紅腫太甚第三十六	九二
不透表第三十七	九三
尽透表第三十八	九四
一齐湧出第三十九	九五
麻色分治第四十	九五
陰陽两部多少第四十一	九七
紅潤不起已出不紅第四十二	九八
鮮紅色淡紅色第四十三	九九
粒紅膚白麻如肌白第四十四	一〇〇
紫黯色第四十五	一〇一
粒头焦第四十六	一〇二
雲头片第四十七	一〇三
發熱而發斑屑是成癰疹第四十八	一〇四
易收早收難收第四十九	一〇五

卷三

咳嗽第五十……………一一一

气促發喘鼻扇胸高第五十一……………一一九

胸膈第五十二……………一二三

痞啞聲音不清第五十三……………一二三

呃逆第五十四……………一二五

噴嚏第五十五……………一二六

鼻通多涕鼻干无涕第五十六……………一二七

微汗自汗大汗无汗第五十七……………一二八

衄血諸失血第五十八……………一三二

嘔吐第五十九……………一三五

吐痰麻后有痰胸口痰甚第六十……………一三六

吐蛭虫第六十一……………一三七

吐沫口中流涎不止第六十二……………一三九

泄瀉第六十三……………一三九

糞渣水瀉第六十四……………一四二

瀉清第六十五……………一四四

瀉而腹痛脹滿第六十六……………一四五

咳嗽鼻衄嘔吐泄瀉首尾治法總論第

六十七……………一四五

大便秘第六十八……………一四六

小便赤澀第六十九……………一四八

大小便不通第七十……………一四八

吐利并作下滯里急后重脫肛第七十一……………一四九

痢症第七十二……………一五三

下蛭虫第七十三……………一五七

卷四

眼光如水眼眶紅爛羞明赤腫眼淚生翳

第七十四……………一五八

眼閉第七十五……………一五九

眼多眵涕第七十六……………一六〇

白珠紅赤第七十七……………一六一

雀盲第七十八……………一六一

口气臭第七十九……………一六三

口瘡第八十……………一六四

舌生白珠第八十一	一六五
牙疳第八十二	一六六
狐惑第八十三	一七〇
咬牙第八十四	一七一
舌胎第八十五	一七二
唇燥第八十六	一七二
唇舌破裂第八十七	一七三
咽喉痛第八十八	一七四
头疼背强头项腫遍身痛第八十九	一七八
腹痛第九十	一七八
腰痛第九十一	一八〇
气痛第九十二	一八一
头温足冷下体冷过膝四肢身体冷如冰	一八二
第九十三	一八二
瘡疾第九十四	一八三
沉睡昏迷似寐非寐煩燥不眠第九十五	一八四
中惡第九十六	一八五

發搐第九十七	一八六
譫語第九十八	一八八
虛羸第九十九	一八九
妊娠出麻第一百	一九二
婦人出麻適值經行及經水非正期而來	一九二
第一百零一	一九四
產后出麻出麻胎墜第一百零二	一九五
產婦麻后无乳第一百零三	一九六
麻后遍身腫第一百零四	一九六
餘邪为殃第一百零五	一九七
不食吃食太早食食不厭第一百零六	一九九
麻后生瘡麻后遍身癢痒第一百零七	二〇二
見毒医毒勿泥麻法第一百零八	二〇五
附錄	
麻疹論(附案)	二〇六
瘡論(附証)	二一〇
麻症补論	二一三

麻科活人全書卷之一

麻疹骨髓賦 增補

麻虽胎毒。多帶時行。氣候暄熱。常令男女傳染而成。其發也與痘相似。其變也比痘非輕。愚夫愚婦。每視為泛常。若死若生。總歸于天命。不知先起于陽。后歸于陰。毒興于脾。熱流于心。臟腑之傷。肺則尤甚。始終之變。腎則無証。若得治法。方稱醫聖。閉門問途。不知途中尋徑。揚湯止沸。莫若釜底抽薪。

朱曰 抉出脾心肺三經。俾治者知所注意。

初則發熱。有类傷寒。眼胞腫而淚不止。鼻噴嚏而涕不干。咳嗽、少食。作渴發煩。以火照之。隱隱于皮膚之內。以手摸之。磊磊乎肌肉之間。其形似疥。其色若丹。出現三日。漸收為安。隨出隨收。喘急相干。无咳无汗。隱伏之端。根窠若腫兮。麻而兼癰。皮膚如赤兮。疹尤夾斑。似錦而明兮。不藥而愈。如煤之黑兮。百无一痊。此麻疹之順逆。須臨症以詳觀。

朱曰 自初發熱至色若丹。是歷歷指出外証。

麻毒最重。治法不同。微汗常出。熱勢越而不留。二便清調。邪氣行而无壅。腠理拂鬱兮。即

當發散。臟腑秘結兮。急與疏通。雖齟不必憂。邪從齟解。自利勿遽止。毒以利鬆。麻後變痢兮。熱毒移于大腸。咳嗽咽痛兮。痰氣滯乎心胸。口渴心煩。法在生津養血。飲食減少。治須調胃和中。余証无常。臨期變通。

且如出之太迟。發表為貴。出之太甚。解毒最宜。毋伐天和。必先歲氣。寒風凜凜。毒氣鬱而不行。赤日炎炎。邪氣乖而作癘。或施溫補。勿助其邪。若用寒涼。休犯其胃。制其過但取其平。誅其暴必欲其正。远寒远熱。陰陽之勝負不齊。責實責虛。人品之強弱或異。此乃麻之大旨。医家須當熟記。

至于藥性。更宜洞悉。防風荆芥。散腠理之寒邪。紫蘇葛根。解營衛之蘊熱。蘇子擅下氣之能。前胡有疏表之力。款冬消痰止嗽。紫苑通肺開結。石斛行血中之滯氣而用。樗根治麻后之白痢而設。葱白上升。而發散肺胃。桑葦治氣。可推牆倒壁。竹茹可止吐嘔。柿蒂專療呃逆。芥子降氣。生地涼血。黃連入心而瀉火。黃芩入肺定喘急。元參石膏。治邪火之浮游。梔子連翹。開惡毒之拂鬱。瓜壘潤肺止渴。須合麥冬。知母降火生津。必同黃柏。麻仁性能滋潤。花粉用以解渴。芍藥住腹痛。勿施于未收之前。白朮止脾泄。只用在收尽之日。欲行滯兮。須青皮枳殼而同檳榔。要分利兮。用赤苓車前而共滑石。尿若瀉兮。利以猪苓木通。咽常痛兮。治以大青惡實。元胡活血止痛。蒲黃逐瘀生血。丹皮破積生新。而引血歸經。紫草利腸涼血。而療疹紫黑。茅根止吐衄。降

除伏火。紅花解麻毒。而散腫赤。咽喉若閉兮。射干助以豆根。牙齒生疳兮。文蛤配乎溺白。心神驚恐兮。鎮以辰砂。臟腑閉結兮。利以大黃。葶藶杏仁。治喘氣之咈咈。薄荷竹叶。解膚熱之烱烱。火燒人屎。蜜炒麻黃。發斑毒之出現。令邪氣之舒張。枳實山查。助脾胃而化毒。兜鈴骨皮。清肺熱以回瘡。既識藥性。用亦有时。未透表則前胡葛根荊芥防風必用。而已透當除。若已出。則黃芩連梔仁黃柏宜使。而初潮勿施。便閉以丑牛易大黃。免塞胃府。喘急用葶藶桑麻。怕增吼嘶。麻色焦枯。生地歸尾為要味。症逢紫黑。紅花紫草正相資。此用藥之元机。則當擴而充之。用藥知時。治有成方。初熱欲出未出際。宜用宣毒發表湯（見第五條。除升麻桔梗甘草）劑。已出紅腫太甚者。當施化毒清表湯（見十六條。除桔梗甘草）。証輕者用瀉白散（見五十條。除甘草）。合乎消毒飲（見二十二條。除甘草）子。毒重者古方黃連解毒湯（見三十五條）大青湯（方見三十五條。除甘草）與啜嘗。若有泄瀉。用導赤散（見二十六條。除甘草）以分利。如遇嘔吐。命竹茹湯（見五十九條。除山查肉）而相將。庸工渾使苦寒辛熱之品。名師不蹈誅伐无過之殃。遵此秘旨。无偏涼誤熱之咎。守而勿失。致起死回生之祥。特舉一隅。約法三章。

朱曰 石斛甘治胃中虛熱。咸能益腎。用涼用散。全在已透表未透表。審証清楚。

麻疹既出。調理甚難。坐臥欲煖。飲食宜淡。風寒若受兮。為腫為熱。酸咸不禁分。為咳為喘。異氣縱威。變証宜參。便多膿血兮。倉廩夾熱。咳多痰沫兮。華蓋傷寒。口爛唇裂。心脾之邪火未

退。毛焦髮枯。營衛之津液將干。苟不明乎是証。何以見其折肱。

治此變証。各有奇方。身熱不除。生地骨皮湯（見三十條。除甘草）合四物湯（見二十五條）。口瘡若甚。秘本洗心散（見八十條除麻黃）對三黃丸（見四十八條）。消腫定喘兮。葶蘆丸（見五十條。除丑牛）取效。化痰行氣兮。加味二陳湯（見六十條。除半夏甘草）為良。咳嗽氣急（除熱）清肺湯（見五十條。除赤芍甘草）。解除肺熱而有驗。喉痛唇爛敗毒散（除柴胡白芍甘草桔梗）。清胃利咽而消殃。氣血已虛。八珍湯（見九十九條）增減而可飲。水谷不納。石斛清胃散（見五十九條。除赤芍甘草）以堪崇。利血兮清熱滯滯湯（見七十二條。除白芍查肉厚朴甘草）。加桃仁而增紅花。咳血兮元參解毒散（去甘草桔梗粉葛加桑皮貝母黃連）。加茅根而倍地黃。此治麻之大略。繼各條而再詳。大抵麻屬心火。必須解毒清涼。

敗毒散 治麻后口瘡唇爛咽喉疼痛

射干 天花粉 連翹 牛蒡子 石膏 生地黃 黃芩 黃柏 元參 淡竹叶 犀角磨汁

金銀花 丹皮 薄荷 柴胡 白芍 桔梗 甘草 燈芯引。水煎服。

元參解毒散 治衄血失血

元參 黃芩 梔仁炒 生地黃 荊芥 粉葛 桔梗 甘草 水煎。加茅根汁、京墨水對服。

靜遠主人麻疹西江月 刪訂

✓ 痧疹俗呼麻子。蓋因火熱薰蒸。遍身紅點朱砂形。發自心脾二經。最忌黑斑死証。極宜赤似朱紋。大抵治法喜涼清。不可辛甘犯禁。

麻子如何辨認。分明証似傷寒。此多咳嗽有紅斑。噴嚏眼中水現。或見腹中疼痛。或是吐瀉相兼。疹家吐瀉不須煎。正要毒除熱散。

麻与痘瘡異治。二家不可同方。痘宜溫解疹清涼。又要現形为上。若受風寒不出。其間凶險難当。急宜發散保平康。切忌神昏腹脹。

麻証因何咳嗽。只因肺与心通。肺金被火苦熬煎。以致咳嗽氣喘。治當清金降火。不宜誤用辛甘。譬如包子蒸籠然。只要氣鬆火煖。

凡遇麻子出現。詳看天令如何。假如日煖又風和。荊防敗毒差可。若是時行疫癘。芩連消毒宜多。用心調理救沉痾。莫學觀天井坐。

且說荊防敗毒散。此為發散仙方。防風荊芥生地黃。酒炒黃芩黃連二樣。赤苓干葛灯草。連翹枳殼牛蒡子。元參杏仁實為良。淡竹叶水煎停当。

又有芩連消毒飲。清金散火尤佳。黃芩黃連防風及梔仁黃柏。枳殼骨皮共把。石膏干葛知

母。連翹牛蒡子。天花粉。引用淡竹叶要多加。只个方儿值价。

若是發散不出。令人真个憂疑。麻黃酒蜜炒如煤。梔仁黃柏黃芩黃連一例。更加大黃酒炒。連翹牛蒡子相隨。石膏蟬蛻紅花子。不效命离塵世。

如見出時紫黑。這般証候多凶。急求人養路旁东。火煨存性取用。細研酒調吞服。須臾紫黑變紅。若还依旧黑朦朧。管取黃梁一夢。

麻子現形發熱。尋常只用化斑湯。石膏梔仁及元參。枳殼連翹牛蒡子靈驗。若是毒多熱甚。本連消毒为先。大便秘結丑牛漆。务使微瀉數遍。

麻証頻多咽痛。火邪薰灼无他。連翹豆根要多加。射干牛蒡子煎罢。外用十宣妙散（見八十八条）。吹喉休要吁嗟。假如見效莫爭差。本連消毒飲堪誇。

咳嗽声声气促。只消降火清金。黃芩梔子赤茯苓。葶藶石膏一定。知母貝母元參地骨皮。枳實仁麥冬杏仁。連翹牛蒡子妙如神。淡竹叶將來作引（一書有黃連）。

麻証若兼瀉痢。預先用藥調医。瀉時須用三苓散（見三十七条）宜。加上車前子滑石。如見痢兼赤白。加減黃芩湯（見七十二条）相隨。大都痢止便为奇。不效令人疑忌。

麻后須防四証。不治常致誤人。遍身余熱欠清宁（証一）。咳嗽連声牽引（証二）。牙齒疳生走馬（証三）。痢下赤白難禁（証四）。各求方法細論評。才是麻科医聖。

問甚身間壯熱。只因余毒留連。金華九子是靈丹。梔仁黃芩黃連龍胆草。鬱金雄黃解毒。灯心地骨皮湯吞。若还脾弱熱綿延。集聖丸胃苓湯任選。

集聖丸当归川芎。蘆薈五靈脂夜明沙。砂仁青皮莪朮加。黃連酒炙蝦蟆（即蛤蜊）。猪胆粟米粉糊丸。清晨米飲吞下。治疳肥儿功最大。这个丸儿堪誇。

平胃散五苓散相合。方儿名曰胃苓湯。蒼朮茯苓肉桂与猪苓。陈皮厚朴澤瀉分明。白朮須宜生用。去肉桂甘草煎成。浮腫泄瀉食積停。人口效应如神。

咳嗽頻頻不止。为因不禁酸咸。又加火毒肺家炎。尤恐胸高气喘。体实却用葶藶丸。神虛清肺神丹。如斯調理保平安。莫向風波弄險。

葶藶丸除肺熱。杏仁葶藶防己。牽牛萊菔子相隨。紅棗肉搗成为剂。清肺神丹降气。鹽水煮焙陈皮。黃芩黃連梔仁黃柏杏仁泥。苏子稀糊丸易。

口齒生瘡臭爛。此名走馬牙疳。金華九子內求安。外用除疳妙散。先取桶中尿白。火煨白色如鹽。五倍子銅綠退殼蚕（即蚕退紙）。再加礪砂冰片。

赤痢下成鮮血。黃連柏叶槐花。枳殼荊芥穗同加。痢止血除才罢。白痢茱萸滑石。樗根枳殼升麻。烏梅取肉作丸佳。赤白香連丸可下。

香連丸又名香橘。五錢木香陈皮。石蓮子取肉半數宜（等分用止一半）。一两黃連另制。外將

茱萸五錢。同黃連炒而用之。炒后去茱萸勿同施。神麴糊丸吞餌。

痘后麻疹卽現。治法从未講究。專用清肺是妙手。發散与补俱謬。藥用黃芩桑白皮。貝母牛蒡子同儔。更宜倍入西河柳。特为后学指授。

麻后如變瘡疾。清涼健脾为佳。麥冬薏苡仁粉干葛。白茯苓陳皮鱉甲。柴胡白芍淡竹叶。知母貝母山查。渴甚再把石膏加。不渴知母并罢。

更防四种死証。臨時休得殊差。毒多体熱瘦如麻（証一）。咳嗽面青声啞（証二）。走馬（牙疳）齧肉落（証三）。痢疾禁口吁嗟（証四）。這般卽是死冤家。不可騎牛覓馬。

妇人出麻时候。天癸正当臨期。血走氣虛難支持。伏陷恐成在斯。藥忌辛酸升發。養陰湯（見三十二條）加減最宜。用心調理莫待迟。臨危法无可施。

妇人麻初發熱。經行非期何因。毒火內迫血离經。元參地黃湯進。或將解毒湯四物湯。二方合用調停。服后天癸依然行。定變伏陷逆証。

元參地黃湯神方。丹皮生地元參。炒黑蒲黃梔仁漆。水煎入口灵驗。四物湯除去川芎白芍。解毒湯梔仁黃柏黃芩黃連。服后經止立便痊。不应中虛証變。

妊娠如逢出疹。熱蒸胎必墜傷。熱甚儿墜母安康。輕或兩全无恙。初潮宜用參蘇飲。減去半夏木香。或已現麻須更方。安胎飲用停當。

初潮宜用參蘇飲。加減全憑神醫。枳殼前胡與蘇葉。除去甘草桔梗陳皮。葛根白茯苓同煎。人參半夏香須忌。加入連翹牛蒡子貝母宜。勿學庸工執泥。

出現宜用安胎飲。川芎白芍當歸身。蘇葉甘草條子芩。大腹皮烏豆水浸。陳皮姜湯泡去白。姜汁炒連殼砂仁。人參白朮用時須當斟。糯米一撮為引。（白芍出現時須當并除）

【附秘本妊娠出麻括】孕婦如逢出疹。須防熱甚胎傷。川芎當歸白芍生地黃是主方。蘄艾條子芩多放。砂仁連殼姜汁炒。安胎清熱最良。用心調理莫倉皇。務保子母无恙。

產後如遇出麻。用藥使使寒涼。四君子湯（見七十二條）四物湯（見二十五條）十全大補湯。補養氣血為上。綿芪肉桂因人施用。全在良師審詳。若泥寒涼生氣傷。好似雪上加霜。且說十全大補湯。八珍湯加味成方。川芎當歸身生地黃。人參白朮甘草相將。肉桂白芍俱用酒炒。黃芪蜜拌炙為良。水煎濃汁與之嘗。加減听憑酌量。

麻証条目法旨用藥要訣 刪訂

初起已出及已收。証立条目治立方。不敢峻熱與用霸。隨時解毒萬無妨。

初潮証治 初起潮熱者。用宣毒發表湯（見第五條）。除升麻、桔梗、甘草。加紫蘇葉、葱白。已出潮熱者。用葛根疏邪湯（見三十三條）。加黃芩。或清熱透肌湯（見二十五條）。去甘草。加黃

芩、骨皮。寒熱似瘧者。用防風敗毒散（見第五條）。除桔梗、甘草。加前胡、赤茯苓。已收潮熱者。用生地骨皮湯（見三十條）。去甘草。加黃連、枳殼。或古方黃連解毒湯（見三十五條）。加地骨皮、連翹、牛蒡子、當歸。

煩熱証治 初潮煩熱。未出時煩燥者。用防風敗毒散（見第五條）。去桔梗、甘草。加麥冬、黃芩、葛根。已出煩燥者。用白虎解毒湯（見二十六條）。加骨皮、黃柏、連翹。已收煩燥者。用白虎解毒湯（見二十六條）。加骨皮、黃柏、牛蒡子、枳殼、木通。

譫語証治 初潮譫語者。用宣毒發表湯（見第五條）。去升麻、桔梗、甘草。加桂附、滑石、辰砂末。已出后譫語者。用加味導赤散（見四十九條）。調辰砂、滑石末。或古方黃連解毒湯（見三十五條）。調辰砂、滑石末。已收后譫語者。實屬凶兆。用古方黃連解毒湯（見三十五條）。合加味導赤散（見四十九條）。調辰砂、滑石末。

咳嗽証治 初潮咳嗽。乃屬美候。用宣咳發表湯（見第五條）。除升麻、桔梗、甘草。加桑白皮。如潮熱輕者。并除淡竹叶。已出咳嗽。亦屬美候。用薊氏清肺飲（見五十條）。除陳皮、柴胡、桔梗、甘草、貝母。加枳殼、連翹、牛蒡子。或除熱清肺湯（見五十條）。除甘草、赤芍。加枳殼、連翹、牛蒡子。或加味瀉白散（見五十一條）。除甘草、人參。加枳殼、連翹、牛蒡子。已收收后咳嗽者。用秘本門冬清肺湯（見五十條）。除甘草、桔梗、糯米。不作口渴者。并除石膏。

泄瀉証治 初潮泄瀉。乃屬美候。用宣毒發表湯（見第五條）。除枳殼、薄荷叶、淡竹叶、升麻、桔梗、甘草。加赤茯苓、車前子。已出泄瀉者。用猪苓湯（見六十三條）。除甘草。有用古方黃連解毒湯（見三十五條）。合三苓散（見三十七條）者。收后潮熱泄瀉者。用加味導赤散（見四十九條）。

嘔吐証治 初潮嘔吐者。用竹茹湯（見五十九條）。除山查。加荊芥、防風、前胡、葛根、連翹、牛蒡子、枇杷叶。已出嘔吐者。用竹茹湯（見五十九條）。除山查。加連翹、牛蒡子。收后嘔吐者。用石斛清胃散（見五十九條）。除丹皮、赤芍、甘草。加竹茹、枇杷叶、柿蒂。

大便不通証治 初潮大便秘者。用前胡枳殼散（見五十一條）。除大黃、甘草。加丑牛、連翹、牛蒡子、防風、葛根。已出大便秘者。用當歸潤腸湯（見六十八條通幽湯方尾）。除升麻、生熟甘草、熟地黃。加連翹、牛蒡子。收后大便秘者。用河間涼膈散（見二十六條）。除甘草。

小便不通証治 初潮小便閉者。用三苓散（見三十七條）。加防風、葛根、連翹、牛蒡子、木通、車前子、枳殼。已出小便閉者。用導赤散（見二十六條）。除甘草。收后小便閉者。用通關散（見七十條）。除人參、甘草、大黃。

大便出血証治 初潮大便秘者。用宣毒發表湯（見第五條）。去淡竹叶、升麻、甘草、桔梗。加生地黃、丹皮。甚者更加犀角。有用犀角地黃湯（見五十八條）。除白芍。加荊芥、防風、牛蒡子。