


1958年全国农业展览会安徽省展览资料

安徽药材

第二集

安徽省卫生厅编



安徽人民出版社

1958年全国农业展览会安徽省展览资料
安徽药材
第二集
安徽省卫生厅编

安徽人民出版社出版
(合肥市德胜门内繁华街)

安徽省书刊出版业营业登记证字第2号
燕湖新华印刷厂印刷 安徽省新华书店

书号:665·787×1092耗1/32·4印张·88千字

1958年9月第1版

1958年9月燕湖第1次印刷

统一书号:T14102·34 印数:1—5,100

定价:(6)0.31元

A1
700

前 言

为了向人民公社、农业生产合作社、国营农場、医院、学校、供銷合作社和国营藥材等單位的有关同志，提供一些栽培藥材的經驗和办法，以适应我省藥材生产发展的需要，我們已出版安徽藥材第一集，現在出第二集，今后还将陸續出版。

由于我們过去沒有注意总结本省栽培藥材的經驗，同时又缺乏栽培方面的实际經驗，因而只能以本省部分地区和兄弟省分的一些栽培經驗和加工方法作为根据，結合生物的生态习性来編写。显然的这种写法是不完善的，这些經驗是不完整的，只能供作参考。因此，我們希望大家在实际工作中充分結合当地的特点，創造新的經驗，以提高藥材生产的栽培和加工技术。并且希望讀者能將自己創造的經驗隨時告訴我們，以便我們改进工作，并作为今后编写时的参考。

書中的藥材基本上是根据藥品經濟价值及发展需要来排列的；而不是根据动、植物的分类或藥用特点来編定的。我們認為这样編排，对于发展本省的名貴藥材，具有較大的实际意义。同时，关于藥材的效用，一般是根据主要作用及临床經驗来写的。中藥的用法重在配合，我們所以要写出效用，是为了使大家了解它的藥用价值，并不是要求大家按着它的功用去开处方。在藥材保藏和加工方法方面，我們結合农村現有的条件，作了簡單的介紹，希望大家在工作中积极改进方法，創造更多的經驗。至于各种藥材的商品价格，也是以目前市場的價格为准，而非固定不变的，这里也帶說明。

由于編者缺少經驗，書內不妥的地方一定难免，希望同志們批評指正。

編 者

1958.9.

目 录

序 言 (1)

植 物 类

茯苓	(4)
丹皮	(6)
白芍	(8)
黄连	(10)
石斛	(12)
天麻	(15)
貝母	(17)
白术	(19)
菊花	(21)
宣木瓜	(23)
明党参	(25)
太子参	(27)
吳茱萸	(29)
杜仲	(31)
瓜蒌 (子名瓜蒌仁, 根名天花粉)	(33)
草烏头	(35)
枳壳 (枳实)	(37)

陳皮 (橘皮)	(3)
佛手	
酸棗仁	(3)
白芷	(45)
薄香 (小茴)	(46)
杏仁	(48)
桃仁	(50)
葛根	(52)
馬兜鈴 (莖名天仙藤, 根名青木香)	(54)
牛膝	(56)
樟腦	(58)
烏藥	(60)
山茱萸	(61)
蒼朮	(63)
紅花	(65)
牛蒡子	(67)
荆芥	(69)
薄荷	(71)
地黃	(72)
桔梗	(74)
金銀花	(76)
辛夷花	(78)
厚朴	(79)
白及	(81)
麥門冬	(82)
土茯苓	(84)

百部	(85)
青葙子	(87)
半夏	(88)
三稜 (荆三稜)	(90)
香附子	(92)
桑根白皮	(94)
狼毒	(96)

动 物 类

鹿茸	(97)
麝香	(99)
虎骨	(101)
豹骨	(102)
祁蛇	(103)
全蠍	(105)
蜈蚣	(107)
土鱉虫	(108)
蜂蜜	(109)
龟板	(111)
鱉甲	(112)
穿山甲 (鱗鯉)	(113)
編后記	(114)
参考書	(115)

序　　言

我省是中藥材的重要产区之一。我国最古的藥学文献“本草經”中所記的产地，其中屬於安徽的就有九处，产藥計十五种。唐宋以来，我省藥材生产有了更大的发展和更多的变化。象宣城（在汉代为丹阳郡，唐称为宣州），在“本草經”中記載是以产鱉甲著名，以后在“重修政和經史証类备用本草”的記載中，却以产黃連著名，現在則又以产木瓜著名了。有的藥材几千年前到現在还維持着生产，象六安专区霍山等地的石斛，歙县的白术等等。

根据藥材部門的調查，当前我省所产的藥材不下七百种。其中名貴产品有大別山的石斛、麝香、天麻、金銀花，銅陵鳳凰山的鳳丹皮，歙县、旌德、青阳的鹿茸，歙县的貢菊，滁县的滁菊，亳县的亳菊、亳芍，歙县、石埭的山萸肉，宣城的宣木瓜，皖南山区的黃連、祁蛇、穿山甲等等。尤其是霍山的石斛，鳳凰山的鳳丹皮，不仅在国内是稀有的，而且在国际上都很著名。另外，在我省产量較大的藥材还有桑皮、杜仲、狼毒、葛根、烏藥、青葙子、白芍、茯苓、生晒术、明党参、桔梗、半夏、白芷、棗仁、全蝎、瓜蒌、牛蒡子、龟板、鱉甲、香附子、牛膝等近二百种。这些品种除有藥用价值以外，还可做工业原料，如桑皮（野桑）可以造紙，杜仲可以提炼橡胶，狼毒、葛根等可以作淀粉，烏藥可以作电木，青葙子可以造酒等等。这些品种行銷国内外不仅对于防治人民疾病，保护人民健康有着重大意义；而且对支援社会主义建設，改善人民生活

也起着越来越大的作用。

但是，由于中医中藥在解放前长期受到国民党反动派的歧视与排挤，私营藥商只知操縱牟利，而不知保护生产，加上日本帝国主义者的侵略势力曾经一度加以蹂躏，就使我省藥材生产遭到极大的摧残与破坏。如鳳凰山等地的鳳丹皮，战前最高年产量为五千担，破坏后产量大大降低；近几年来虽经过党和群众的大力的恢复和培养，現在每年也只产一千八百余担，而邻近产地繁昌，竟已絕种。据了解，目前我省所产的茯苓、鳳丹皮、天麻、宣木瓜、石斛、菊花、鹿茸、麝香、全蝎、穿山甲、土鱉虫、龟板、鱉甲等近百种藥材，长年不能满足省内、外和国外的需要，藥材市場經常出現供应緊張和脫銷状态。因此，迅速地、大力地发展中藥材生产，是目前一項紧迫的任务。

我們知道，中藥材的品种很多，其中除一部份藥材是人工培植和飼养的外，另有很大一部份藥材是野生的动、植物，有的生长的年限还較长。这些野生的动、植物如果不用人工培植，只是无限制的采掘猎捕，終会有絕种的一天。如霍山的石斛，由于保护和培养的不够，1957年藥材公司全年只能購进几斤；大別山的獐子據說單1956年一年就猎杀四千头以上。这种情况都是极为严重的。为了維护人民身体健康，为了发展山区多种經濟，支援社会主义建設，我們必須根据农业发展綱要中所提出的要求，积极地、及时地发展藥材生产。我省自1955年以后，已經对藥材的生产与經營进行了有领导、有計劃的安排，并且有了一定的恢复与发展。为了进一步推动藥材生产，我們必須根据农业发展綱要中所提出的：“发展藥材生产，注意保护野生植物，并且根据可能逐步的改为人工培植”的精神，发动农业生产合作社、国营农場、医院、学校、供銷合作社和国营藥材公司等部门一齐动手，一方面扩大我省家种名貴藥材的生产，

一方面对野生的动、植物藥源严加保护，并且大力提倡普遍用人工栽培和人工飼养，使其取之不尽，用之不竭。这就是我們今后发展藥材生产的主要道路。此外，今后我們还要考慮引进亚热带的植物藥材（如枳榔、豆蔻、砂仁等），适当地分配我省各地栽培。根据皖南山区茶农培养白兰、茉莉等亚热带花木的經驗，这并不是不可能的。

我們相信，只要紧紧地依靠党的领导，充分地发动羣众，特別是發揮老藥农和藥剂人員的积极性，充分利用已有的經驗，我們一定能在栽培、繁殖、采收、加工、儲藏等方面，取得丰富的經驗，我們的工作也一定能够获得預期的效果。

安徽省卫生厅

1958年9月

植物类

茯 苓

我省金寨、霍山、岳西、太湖、潜山和至德等地均有出产。全体药用，为利尿剂。主治水肿及淋疾，兼有镇静作用，对于心悸失眠亦有效。

茯苓属于多孔菌科，全体呈块状，形略似山芋，大小不一，大的能长一百四十多斤。寄生于松树的腐朽部，常生在砂质土壤地区。鲜茯苓外皮淡褐色，内部白色，质柔。

生产季节与栽培方法：在农历腊月至正月间，将松树砍下，用斧削去树杆外皮，使成多边形柱状。削时，要注意不要全削去，要削成一条条的，每削一条，留一条不削。然后，将树杆锯断，每段约二尺五寸长，堆放干透，在向阳山坡挖堆窖料。到四月至六月间引种。引种，分木引和浆。



茯 苓

引二种。木引是将前次下窖的木料(菌絲未尽、木質是鮮黃色的),放在本年下窖的木料中間,混合平鋪兩层,相互靠緊,上面蓋一层沙土,約一寸厚。漿引是將鮮的嫩茯苓削成几片,以帶肉一面,貼在松木兩头,皮朝外、上蓋沙土寸余。蓋的沙土要薄,又要严密不透风。

采挖時間: 窖料一年以后, 即可長出茯苓。一般在五月到七月間起挖。

最近, 金寨生产茯苓(一个七十八斤, 一个一百四十二斤)两个大卫星的培植經驗:

- 1.選擇地位恰当, 方向朝西南, 朝阳。
- 2.整窖要深挖, 二尺到三尺深, 地內不要有杂草根, 宜沙質肥沃土地。
- 3.松树料子最好是前一年經過夏天干透的, 树料要五、六寸粗, 三尺长。
- 4.窖料提前十天, 三三月下旬到第二年八月起茯苓。
- 5.引子要好的, 窖料时要把引子紧貼在树筒上。
- 6.专人管理, 窖上要經常蓋沙土, 不使树筒露出土外, 每下一次雨, 都要疏沟排水, 防止积水浸坏。

加工和儲藏: 茯苓挖出, 放在避风室內, 不要挤压。每天早、晚翻一次, 七天后, 每天翻一次。上面生出絨毛隨即扫去, 以便水分蒸發, 不致霉烂。二十天后, 經過发汗的潮茯苓, 就可以切片, 或将发汗后的干茯苓蒸熟切块。农民如果不便加工, 挖出的潮茯苓即可出售。

儲藏: 放在干燥处儲藏, 防止潮湿发霉变質。

我省茯苓是全国最大的重点产区, 每年产量約三万一千担, 每担平均价約五十元, 总价一百五十五万多元。茯苓暢銷全国各地, 同时在国际市场上也很有声誉。

丹 皮



产于我省銅陵、南陵、青阳和涇县等地，已有三百多年种植历史。其中銅陵鳳凰山出产的鳳丹皮，比一般丹皮效力强，所以成为全国著名的珍品。它的特点是具有亮明銀星（針晶）；煎汁为乳白色，夏天久放不变味，藥用部份为根部的皮，可以和血涼血，治血中伏火、鼻衄、吐血、无汗骨蒸、除痨热瘀血、女子經脈不通等。

鳳丹皮屬於毛茛科，是栽培的木本植物，高約三至四尺。叶互生，初生时紅色，长大为淡綠色，叶背带白色，連柄長約一尺。

牡丹
余。清明前后开花，花形大而美丽，顏色分深紅、淡紅和白的三种。

生产季节与栽培方法：人工栽培有播种与分株两种，山地容易排水的砂質紅壤土，或类似土壤均适宜生长与栽培。播种：六月間摘下牡丹种子，八月間打穴点种，至第二年秋分移栽幼苗。分株：秋分至立冬收获丹皮时，将牡丹的大根剪下作藥用；同时将带芽的小根分开，阴干两天再栽，伤口便不易腐烂。在移植四年後，可在

秋季九月采挖。这时它含粉足，质量好，产量高。如在夏季六月采挖，不但质量差，含粉少，而且产量也低。

加工和储藏：将根剪下，趁鲜润时，用小刀顺皮根划开一直缝，剥去中间木心，再用手捻直，捏紧合齐刀缝，放板上晒干；如用碎碗片刮去外皮就成为商品上所谓“利丹”，价值更高。贮藏：用竹筐装，内衬干荷叶，放置干燥处，防止潮湿发霉。

我省年产量约两千担左右，平均每担约二百八十多，总值约五万七千余元。此药畅销国内各地，并有出口任务。目前国内外市场需求量在八千至一万担，历年来供不应求。

白芍

白芍为我省亳县特产的著名藥材，已有三百多年历史。藥用部份为去掉皮的根。功用为鎮痙、鎮痛、通經，妇科諸病及腹痛、胃痙攣、风湿痛等症服用也有效，并有利尿作用。

白芍属于毛茛科，是多年生的草本植物。根部肥大多肉，每年早春由老根上发出新芽，長約二尺高，叶子似牡丹，但顏色較綠。

生产季节与栽培方法：芍藥怕澆，宜生长于土层深厚、肥沃、溫燥、黃泥沙土。在立秋后寒露前，将挖起的老芍藥根切下作藥用，留基根（就是蘆头部分）和芽子再栽种。先将土地深耕細作，相距一尺五寸至二尺打穴，把基根和芽子栽入穴內，深約四、五寸。冬天要封土，不要冻坏芽子；春天再扒开，讓芽子露出。另外，把芽子貯藏在紅芋窖內，到来年三月再栽亦可。栽植后四、五年，在秋分后白露前采挖为最好（天阴不能挖）；如到寒露以后采挖，则芍根退粉，質量較差。



白 芍

加工和儲藏：将芍藥根洗淨，下鍋煮熟（煮时要翻匀）。煮过后刮去外皮，晒干，如遇阴天可用火炕。然后将芍藥放在干燥处，避免受潮、发霉、变質、风喚裂心。如发现变色，应立即用硫磺薰白。

此藥我省年产量达三万二千担，每担平均价一百四十元，总值四百四十八万元。除留部分供应省内和国内应用外，大部分出口。

黃連


我省歙县黃山、青阳九华山等地所产的黃連質量最好，經檢驗含有川黃連的成分占80%，較其他各地出产的黃連为优。根莖做藥用。為內外科清热消炎的特效藥，治伤寒、溫病（腦炎）、痢疾、肿瘍、眼結膜炎及嘔吐、口疮等症。

黃連屬於毛茛科，从生于林間或山阴之处。叶常綠，从生根际，叶柄长。早春向上抽花莖，長約三四寸，上部生着白花數朵。花單性，雌雄異株（雌株結果），果实从生，每兜三至九個。

生产季节与栽培方法：黃山、九华所产黃連原系野生，产量很

少。黃連的医疗价值很大，目前供應不足，需要大力发展生产，将野生改为家种。根据四川的黃連栽培經驗：栽种黃連宜选择土壤厚黑、腐殖質較多、排水良好的竹林地；栽培方法有扦插、播种两种。

扦插：在立秋后的九、十月間用老黃連的枝条做苗秧，用鐵叉将苗秧插入土內，深約寸余；行距二寸，以細碎土盖在苗秧基上。上搭棚架遮蓋，避免日光直射。冬季将架放下，复盖苗叶上以防霜雪，春天雪化后，再将架搭起。每年要鋤草壅土。



黃連

播种：五月下旬采收培植三年以上的黃連种子，放通风处，至六月间，将种子撒于山坡树草丛生的土壤中。第二年正月把杂草除去，搭三尺高棚架，二月种子发芽，待苗高二、三寸时除草。同时稍加牛、馬粪肥料。在第三年四月间，选阴雨天挖秧苗移植，打穴一寸深，相距二寸，将秧苗栽下，壅土复平。在移苗以后每年鋤草二、三次，第一年施基肥，用草皮、树叶等堆烂肥或用草木灰，以后每年于鋤草后追肥一次，以馬粪最佳。采收时间：野生黃連，秋季采挖质量好。家种黃連在移植后第五年冬季（下雪以前）收获。

加工与储藏：去净沙土晒干，放置干燥处，防潮湿。

我省野生黃連年产量約五担左右，每担約值九百五十元，总值四千七百多元。目前不能滿足本省需要，大部分由外省調进，有时还脱銷。