

第三編 小兒科類症

一、口腔病

治小兒口出白痧方 廣州 黎達英

【處方】 人中白錢，五倍錢，熟礪砂錢，正川連錢，正青黛錢，生白礬錢，正梅片三分，烏梅炭三只，正神砂錢，正珍珠末五分，另地蟬子十只（用新瓦炒干煨有性）。

【製法】 共爲細末。

【用法】 將散吹入口內，流出涎而愈。

【適應】 小兒生出兩三個月後胎熱毒口出白膜痧不能吃乳。

註：據獻方者謂該方經用效驗云。

走馬牙疳方 潮安 辜寬文

【處方】 砒石一分，珍珠末一分，人中白二分，硃砂五分，黑側柏二錢，梅片五分。

【製法及用法】 砒石用瘦豬肉四面切片共槌爛，沙鼎煨成炭，研盡爲度，同上藥共研爲細末用適量敷患處。

【適應症】 本病又稱口頰壞疽，多發生於兒童，口腔粘膜牙齦發生壞疽性病變，急速蔓延附近組織如顏面等處，（中醫稱走馬牙疳，形容迅速變化）急性型蔓延極快，且全身症狀劇烈，幾天內即呈極度衰弱，併發腹瀉，譫妄，昏迷，很快歸於死亡，年齡愈小預後愈不良。

走馬牙疳效方 黃舉昌

【處方】 人中白錢，兒茶錢，青黛錢，礪砂錢，薄荷五錢，元明粉五錢，馬勃五錢，上梅片五分。

【用法】 共爲細末，塗上患處。

【適應範圍】 走馬牙疳，咽喉疼痛，舌腫齦臭，並牙出血爛及於口等。

又 方

潮安縣 王子貞

【處方】 人中白二錢，煨礪砂二錢，川黃連二錢，煨蜂房一錢，製油虫二錢，正青黛五分，梅片五分。

【用法】 共研爲細末敷患處。

【適應症】 潰瘍性口內炎，亦稱牙疳，瘍科心得把牙疳分爲二種，一是稱，（風熱牙疳）（指本方應用），一是稱（走馬牙疳）（口頰壞疽）風熱牙疳多發生於身體衰弱小兒，而口腔衛生欠佳的小孩更爲多見，係一種特發型牙齦炎，發病部位有的局限一處，有時蔓延全口和舌面。

又 方

潮安縣 陳英東

【處方】 礪砂三分，川連三分，冰片三分，人中白一錢。

【用法】 共研爲細末敷患處。

小兒鎖喉散

廣州 趙思兢

【處方】 全椒梢六分浸淡炒，僵蠶一錢炒，甘草六分，瞿麥一錢，川烏尖製六分，蜈蚣三條去頭足。

【用法】 爲末先用些少吹入鼻內，但得嚏者極重猶可治，後用薄荷七片煎湯送服藥末每次二分。

【適應症】 嬰孩三朝七日不飲乳，撮口口噤症狀。

臍風內服方

封開 鄧瓊林

【處方】 紫蘇，僵蠶各二錢，前胡錢半。

【用法】 水煎，分多次灌服，外治仍須補用搽臍藥末，間有挽回。

【適應】 小兒三朝七日，症見撮口啼哭，面色青或紅，口吐涎

沫。如遇撮口不能灌藥時，可用枝子，桃仁，生地各錢半搗爛敷兩頰車，約三點鐘口開，才灌此臍風內服方。

〔附〕摻臍法 封開 鄧瓊林

- 【處方】 枯礬二錢半，礪砂三錢半，硃砂五分，冰片，射香，各五厘。
- 【用法】 共研細末，在嬰兒臍帶斷後，即以藥摻之，可免臍風。
- 【適應】 預防臍風。

二、吐 乳

治小兒吐乳方 雲浮 葉滿枝

- 【處方】 馬尾蔞取核四至五錢，煎水內服，即止。

小兒嘔乳方（風熱嘔痰嘔乳同用）封開 陳鏡周

- 【處方】 地鷄虫（又名豬仔，生長在屋內爛桶底，盆底等處，灰藍色，像半邊豆形，找得三二十只，加些生鹽同搗爛，沖滾水或人乳給兒飲。如寒痰用銅壳炙焦研末，煎陳皮燈心薄荷湯沖服，或乳汁開亦可。

三、泄 瀉

治小兒水瀉方 雲浮 曾仲鍊

- 【處方】 楊桃一兩，水煎服。

治小兒夏日泄瀉方 雲浮 李茂釗

- 【處方】 黃土（土穴中的）一兩，薄荷（後下）八分，竹葉三錢，陳倉米三錢，麥芽四錢，南豆衣五錢，蓮梗二錢，水煎，內服。

治小兒泄瀉屢效方 雲浮 趙裕才

- 【處方】 白茯苓，車前子各三錢，壁實三錢，老蓮肉五錢，破故紙二錢，黃白朮三錢，慢火濃煎，內服。

治小兒泄瀉方 雲浮 保民診所

- 【處方】 藿香錢半，丁香一錢，白朮二錢，水煎服。

治小兒水瀉單方 廣州 陳敬紹

- 【處方】 管仲心六錢，防風一錢，金蟬蛻廿只，白磁片四塊（即江西磁碗破爛者）
【用法】 清水二碗煎至一碗，每日分三次服食。
【適應】 急性腸炎，及流行起之急性胃炎，舉凡水瀉下痢腹痛，渴水厭食，體溫達 39 度至 40 度。

治小兒腸炎泄瀉下痢方 豐順 王就成

- 【處方】 百草封臍膏：——乾羊屎二十五枚，薄荷末一錢
【用法】 二味滴入適量米酒共搗成餅封臍，宜冷用，有驅風止痛止瀉作用，屢試屢效。

小兒慢驚水瀉方 封開 邱水和

- 【處方】 黃牛屎，車前草，舊早米，老產粟，（四味同炒過炭為度）同陰湯水煎服，即止泄瀉。
陳鏡周也是用這幾味藥治此症，但陳君於方後註得較詳，茲節錄之如下「四味藥炒過炭，以青烟起完為止，用清水大湯碗傾落鍋內，隨手溜起，澄清，給兒連飲四五次，生津止渴止痢，再飲三四次即愈」云。

四、疳積（包括蛔虫）

治胃吐酸，消化不良等驗方

豐順 陳名中

- 【處方】 春砂仁錢半，川厚樸錢半，炒白朮二錢，明黨參錢半，南木香一錢，雲山樵一錢，炒麥芽一錢，赤茯苓二錢，藿香葉二錢，製蒼朮錢半，上神機錢半，京三稜錢半。
- 【用法】 共研極幼末，每天服三次，每次服七分，調以等量，白糖，沖水飯後服。

治小兒腹脹方

潮安縣 吳志弘

- 【處方】 生柚皮晒乾瓦上煨黑
- 【用法】 研為細末，每天服二至三次，每次二至三分。
- 【適應症】 對乳兒消化不良，胃腸充氣有効。

小兒疳積散方

雲浮 曾兆懷

- 【處方】 蛤殼三錢，淡古三錢，珍珠一分，枯凡錢半，胆凡錢半，米砂三錢，鷄內金錢半，共為細末，為十八包。
- 【用法】 一至二歲服五厘，三至五歲每次服二分，七至八歲服三分。（經試屢驗）

治小兒疳積方

雲浮 蘇善卿

- 【處方】 人中白三錢，鷄內金三錢，淡古三錢，為末內服。

治小兒五疳散方

廣州 鄧智卿

- 【處方】 硃砂一錢，海螵蛸三錢，水仙子二錢，淮山二錢，土炒白朮二錢，夜明砂六分，蜆肚六分，珍珠末五分。熱翻

砂六分，黃皮蟬蛻二隻（去鴨肝、眼睛）存性，破阻勿用。

【用法】共爲細末，用羊肝二兩（去淨筋膜）煎水，於晨早時開散五分服之有奇效。並常用蟬蛻，麥冬，甘草，菊花等煲茶常服。

【適應】小兒五疳，（即心肝肺脾腎疳，痘癰後眼膜睛。）

疳積眼經驗方

封開 鄧瓊林

【處方】海螵蛸，蛤粉，金蟬蛻，正辰砂，穀精草，夜明砂，石決明，粉甘草各三錢，白茯苓五錢。

【用法】共研細末，蒸豬肝食，每次用三錢。

【適應】肌肉羸瘦，眼胞重垂，艱澀難開，翳膜遮睛等症。

疳積退翳散

封開 羅祜馨

【處方】水仙子，使君子，各三錢，淮山，海螵蛸，各二錢，正辰砂，金蟬蛻各一錢。

【用法】共研細末，每用七分，蒸豬、雞、鴨肝，加些酒和生鹽，不放油，或開粥食亦可。

【適應】疳積眼上雲翳，艱澀難開，黃昏雞盲等症。

小兒疳積或麻疹愈後眼上翳膜方

封開 佚名

【處方】海螵蛸，使君肉，水仙子，煨石決，薏苡仁，各錢半，夜明砂，口米砂，各二錢，熟礬砂八分，正珍珠二分。

【用法】共爲細末，硃砂，珍珠二味後入。

治小兒疳積傷目方

豐順 譚江衡協

【處方】草決明，石決明，生寒水石，各三錢，谷精錢半，海螵蛸錢半，夜明砂二錢，淘淨。

【用法】共研末，和豬或雞肝燉服。

治小兒夜盲症方 豐順 譚江衛協

【處方】 蒼朮二錢，煲豬或雞肝食之愈。

靈效疳積散 廣州救濟分會 趙良杰

【處方】 金錢草二兩，黃花蠟菜一兩均曬乾量。

【用法】 火炕存性研成細末約分 100 包，每天服二次，飯後服，先將散入豬肝內蒸熟服之，或用稀粥調服，輕症連服六天即愈，重者半月，服後檢查糞便，每混有大量幼虫。

【適應】 殺虫，消積，退熱，健脾。

奇效疳積散 雲浮 方全診所

【處方】 炒厚朴一兩，廣陳皮八錢，粉甘草七錢，真蘆薈七錢，白蘆薈五錢，真青礬三錢，百草霜二錢，旋覆花錢半。

【用法】 共為細末，每一歲用藥一分，用燈心水，於早上空腹時送服，愈後，仍當用藥理脾。

【適應】 小兒疳積，面黃肌瘦，小便如米，大便瀉黃酸臭，頭皮乾枯，毛髮稀疏，甚至目澀羞明，睛生雲翳形骸骨立，夜熱早涼，等症。

小兒疳積方 雲浮 蘇善卿

【處方】 人中白三錢，鶴內金三錢，淡古三錢，為末內服。

小兒疳積方 雲浮 趙友昌

【處方】 爐甘石（煨飛過）五錢，冬君肉三錢，礞砂五分。

【用法】 共為細末，一至二歲每服五厘，三至五歲每服一分，餘可酌量小兒大小酌給之。

治疳積方 雲浮 六合診所

【處方】 煨牡蠣一兩，煨魚古二兩，熟礞砂五錢，炒土別五

錢，煨甘石一兩，炒冬君一兩，炒梔子三錢，熟白朮一兩，山楂五錢，口米砂一兩，炒水仙子一兩，枯礬五錢。

【用法】 共爲細末，米飲送下一錢。

小兒蛔虫病方

潮安縣 許瑞雍

【處方】 苦楝根二層皮六錢至八錢。

【用法】 用於三歲至四歲小兒。 水煎一次服

【適應症】 小兒與成人蛔虫病均適用，對蛔虫病合併勾虫感染服此根皮并能同時驅除勾虫，小有不快副作用，且同時無需服瀉劑。

肥兒丸

雲浮 趙裕才

【處方】 炒神曲五錢，胡黃連五錢，炒麥芽五錢，肉芫荳二錢，（麴裏煨去油）尖檳榔（去臍）一只，廣木香一錢，史君肉（去淨壳）二錢半，荆三稜二錢，莪朮二錢，鷄內金三錢。

【用法】 共爲細末，蒸餅丸如黍米大，米飲送下五分，漸增至一錢爲限。

治疳積上眼白翳遮眼驗方

雲浮 彭冠卿

【處方】 肉蓯蓉二只，史君子去殼五只，胡黃連一錢，白蒺藜炒去刺一錢，蘆薈一錢，共爲細末，鷄肝一具，酒漿少許，同搗爛去滓，入前藥末，調勻，蒸熟食之，吃一二服，立愈，本方經治愈多人，確有奇驗。

註： 本方傳自名醫周鶴仙，屢試屢驗，並治小兒肚大泄瀉，面黃肌瘦等症。神效。

治小兒疳積上眼方

雲浮 江潤標

【處方】 淡魚古五道，鷄內金五錢，密蒙花六錢，金蟬退五錢，

冬荊肉五錢，煨草決明一兩半，煨石決明一兩半，猴骨五錢，蕉薏六錢，蛇蛾四錢共研爲細末，每服二錢，蒸豬肝或雞肝食之。

五、夜啼

治小兒夜啼方

潮安縣 陳德友

- 【處方】 金蟬（去上截）十個，硃砂三分。
- 【服法】 上藥爲細末，分爲二次，每次用勾藤一錢，燈心十條，煎水沖服，每天早晚各服一次。
- 【適應症】 哺乳小兒易發夜啼，每突然在睡眠中驚醒，啼哭尖銳，面容恐怖，號泣不止，心悸不安。

六、驚風

治小兒急驚痰癇

潮安縣劉隆瀉

- 【處方】 正真珠末七分，壁虎一錢，羌活一錢五分，全蠍一錢，胆星一錢五分，防風七分，天麻一錢五分，製白附一錢五分，硃砂一錢，辰砂一錢，射香五厘，九節一錢，古板金薄五張，大黃一錢，雄精一錢五分，蘇荷七分，麵乳粉七分，川連一錢，蘇半夏一錢，川貝一錢，囊縮一錢五分，竹黃一錢，乙金一錢。
- 【用法】 上藥研爲極細末，二歲小兒用藥二分五厘，五歲三分，以足銀器一件，燈心十五條，車前草三葉煎水沖服。
- 【適應症】 各種腦炎神經症狀發作期。

又方

潮安陳明昭

- 【處方】 正真珠末五分，粒牛黃五分，川射香二分，煨蒙石二錢，雙勾藤三錢，上壁虎一錢五分，童胆星一錢五分，明竹黃二錢，正硃砂一錢五分，川天麻一錢五分，白附

子一錢五分，沉香一錢，淨全蠍十個，占板金十片。

【製用法】 研爲極細末，每日服一次，一歲以下服三分，三歲服五分，五歲服七分，五歲以上服八分至一錢，用滾水沖服。

【適應症】 同上方。

七厘散

順德縣容奇鄉李庭芬

【處方】 大板金六張，牛黃八分，香附三分，勾藤八分，珍珠末五分，礞砂四分，血珀三分，金礞退八分，寸香分半，菖蒲八分。

【服法】 一歲以下小兒每次服量二分，用滾水沖上開藥末。

【適應症】 治小兒昏迷厥脫手足抽搐。

保赤丹

順德縣容奇鄉李庭芬

【處方】 雙胆星五錢，寸香分半，牛黃一分，薄荷葉一錢，礞砂二錢半，上梅片一分半，炒牙皂七分，炒羌蠶一錢二分。

【服法】 以上各藥共爲極細末，一歲以下嬰兒每次服量二分，用滾水一湯匙沖服。

【適應症】 同上方。

治小兒慢驚風

順德縣齊杏呂秉衡

【處方】 熟地五錢，焦朮三錢，炙芪二錢，炙黨參三錢，當歸一錢，固紙一錢，炒棗仁二錢，杞子二錢，山萸肉一錢，炙甘草一錢，胡桃肉連壳二個打爛，南桂七分歸，炮薑七分，生薑三片，南棗三枚。

【服法】 用灶心土二兩先煎水去渣，取水加附子二錢同煎頻頻灌服重症照方日夜服二次。

【適應症】 治患急慢驚風抽搐昏迷。

治小兒驚風方

曹順 羅泮三

- 【處方】 僵蠶錢二，牛蒡錢半，防風錢三，條芩錢半，金竭一錢，知母一錢，天麻一錢，胆星七分，金蟬三只，荊芥五分，川足一條（焙酥研末沖）竹黃八分，硃砂沖四分原八分，水一盞二，煎四分服。

小兒驚痰散

廣州 劉月山

- 【處方】 熟地凡四分，珍珠五分，硃砂五分，地鼈（又名肥猪）四錢焙干爲末。
- 【製法】 將藥搗爛研爲細末。
- 【用法】 日服一次，每服五厘，小兒每服一分，滾水沖服。
- 【適應】 小兒身熱痰鳴，連聲咳急驚。

急驚風方

封開 鍾毓芬

- 【處方】 胆星，竹黃，薄荷，甘草各一錢，浙貝錢半和硃砂八分川連五分，蟬蛻七只。
- 【用法】 水煎，未服此方前，先用蕉根蚯蚓二條，搗爛沖滾水飲以救急。
- 【適應】 面紅，眼斜，口動，手足發熱。

急驚風

封開 陳秀峯

- 【處方】 竹魚胆（小兒一歲用整個四分之一，二歲用半個，三歲用四分之三，研爲末）勾藤，生枝，僵蠶，木通，竹黃各四錢。
- 【用法】 煎湯，乘熱放入魚胆末搗勻給兒飲。

驚風痰迷方

封開 張岐山

- 【處方】 羚羊角錢半，（先煎）天竺黃二錢，川連錢半，射香五厘或一分，梅片末，牛黃末各一錢，珍珠末一分，珠，

射，牛，冰四味同研末。

【用法】先以水碗許，煎羚羊至半碗，才放竹黃川連二味，煎至一大茶盅，斟出碗後，以少半盅開射，牛，冰末給兒飲，如牙關已閉，用竹筷撬開灌藥。

【適應】小兒驚風痰迷不語高熱。

小兒通關散（又名一六千金散）

封開 伍學傳

【處方】雄黃，硃砂川連，牙皂，細辛，白蘞各八分，川貝一錢金蝎，天麻各六分，珍珠，牛黃，冰片各三分，胆星四分，甘草二分，僵蠶六分。

【用法】十五味共爲細末，密貯，遇此症用一分至二分，量兒大小，開滾水或茶灌下即甦。

小兒慢驚方

封開 莫瀚洲

【處方】熟地三錢，麗參三分，白朮，炙草，雲苓淮山各一錢，黃肉八分，玉桂二分，羌炭六分，黑棗二只，水煎服。

【適應】面唇淡白，或泄瀉手足冰冷，等症。

又方

封開 鍾毓芬

【處方】石柱參，炙甘草各一錢，玉桂三分，白朮，茯苓各二錢，全蝎錢半，水煎服。

【適應】面唇淡白，或泄瀉手足冰冷，等症。

小兒慢脾方

封開 彭秋元

【處方】丁香，炙草各錢半，胡椒八分，烏梅二只，玉桂二分，乾羌五分，水煎服。

【適應】泄瀉不止，神色疲倦等。

小兒發高热不退方

封開 梁雲山

- 【處方】 鵝不食草，（一大握）約重半斤，杵爛放盆中，加入炒至老黃色的，生鹽二兩，隨用滾水沖，隨沖隨將藥和鹽攪勻，約水大熱不灼手時，與兒洗身，並將藥液擦兒額上及手足，高热就漸退。

熱清鎮驚散

- 【處方】 連翹五分，柴胡五分，地骨五分，絲草五分，勾藤五分，黃連五分，黑枝子五分，雲苓五分，寸冬五分，木通五分，黃芩五分，車前五分，甘草三分，薄荷三分，竹葉三分，燈心十條。
- 【服法】 共爲極細末，用滾水分數次服。
- 【適應症】 治小兒急驚初起身熱面赤，搖擺上視，牙關緊硬，口鼻中氣熱，痰涎潮湧，忽然而發生。

小兒急驚風方

封開 黃會周

- 【處方】 用七星草搥幼沖滾水服，可開竅及省人事。

又方

封開 徐海汪

- 【處方】 鷄兒勒洞苗，和鷄蛋白搥勻擦四肢卽止抽搐。

治小兒中熱發抽方

豐順 王就成

- 【處方】 胆草錢半，生枝一錢，柴胡七分，防風八分，羌黨七分，川連八分，條芩八分，雙鉤七分，車前六分。

治小兒中風冷抽搐，口角流涎，

角弓反張方

豐順 王就成

- 【處方】 生薑錢半，白朮一錢，川芎二錢，炙草五分，陳皮六

分，半夏六分，附子五分，干羌三分，肉桂五分，羌活七分，勾藤八分，防風八分水煎服。

七、咳嗽（包括百日咳、奶哮）

治慢性氣管發炎並治百日咳方

潮安 謝平山

- 【處方】 枇杷葉三十片，百部五錢，白前三錢，薏苡八錢，蘇子二錢，雪蜜八兩，饴糖四兩，豬腦二匙。
- 【製法】 將百部、白前、薏苡、蘇子研成末，將杷葉煎成濃汁半碗與以上各藥混和成羔，最後加入生羌汁二匙和勻。
- 【服法】 每天服三次，每次服半匙，以愈為度。
- 【適應症】 久咳多痰，百日咳。
- 【禁忌】 忌食蝦、蟹、蛋、及刺激性食物。

治小兒百日咳方

潮安 林濟川

- 【處方】 款冬花一錢，川貝一錢，茯苓一錢五分，紫苑一錢五分，北杏二錢，桑白二錢，五味三分，烏梅二只（煎爛搗碎取仁用）。
- 【服法】 清水煎服，咳血加茅根藕節各二錢。

又方

封川開建

- 【處方】 天冬五錢，麥冬五錢，百部根三錢，鮮竹茹二錢，瓜蒌仁二錢，橘紅皮二錢，如鼻齶加白茅根五錢藕節五錢。
- 【服法】 用水200西西，煎成90西西，二至三歲小兒，分三次服，四小時服一次。

又方

封川江口 梁雲生

- 【處方】 杏仁三錢，桔梗二錢，陳皮錢半，竹茹二錢，麻黃八分

冬花二錢，法夏二錢，甘草錢半。

- 【服法】 用水二碗煎成一碗，分二次溫服，每四小時服一次，服後咳嗽氣味均減少，即服第二方。

第二方

- 【處方】 腹皮二錢，陳皮錢半，薤仁三錢（去油），麻黃八分，杏仁三錢，石羔二錢，竹黃二錢，蘇子二錢，苡米三錢，冬花二錢，川貝二錢，甘草錢半。

- 【服法】 照前方分服，服後痰咳已少，面脚浮腫亦消，接服下第三方。

第三方

- 【處方】 杏仁三錢，苡米四錢，冬瓜仁三錢，枝子仁二錢，葶藶二錢，桔梗二錢，冬花三錢，陳皮錢半，桑白二錢，法夏二錢，紫苑三錢，甘草錢半。

- 【服法】 同上方，咳痰等減少後，仍須連服三劑。才能全愈。

又方

河源 彭其昌

- 【處方】 白前三錢，百部五錢，薤仁二錢，桔胎錢半，天冬三錢，麥冬三錢，紫苑三錢，冬花二錢，百合二錢，竹茹六分。

- 【服法】 共煎水分三次服。

小兒風熱咳嗽痰喘驚惕的藥

封開 蘇卓活

- 【處方】 魚腥草，味腥微辛，色白輕揚，入手太陰清肺熱，化痰治咳嗽，蘊蔓以筋，故並能和肝舒筋絡，爲小兒風熱咳嗽痰喘之良藥。

小兒百日咳

何煒山

- 【處方】 葦草三錢，冬瓜仁三錢，川貝三錢，公英二錢，金銀花藤四錢，生杭菊二錢，馬鞭草二錢，桃仁錢半，百步根二錢，丁力子一錢，錦黃錢半。
- 【服法】 用水二盅煎至半盅服食後排便極臭。
- 【適應症】 中醫名頓哈，甚至面目浮腫，眼白睛發紅點，口鼻出血，甚至連鼻而有驚厥，窒塞之象。

又方

林濟川

- 【處方】 款冬花一錢，川貝一錢，茯苓一錢五分，紫苑一錢五分，北杏仁二錢，桑白二錢，五味三分，烏梅二個（爛搗核取仁用）。
- 【服法】 清水煎服，咳血加茅根、藕節二錢（上方是七歲小兒份量）。
- 【適應症】 同上。

治小兒百日咳

謝平山

- 【處方】 生枇杷葉去淨毛三十片，百步五錢，白前三錢，薏苡八錢，蘇子二錢，上四味共研極細末，雪蜜八兩，飴糖四兩，豬腦二匙。
- 【製法及用量】 先將枇杷葉用水一碗煎五分，與上藥末混和成羹，最後加入生薑汁二匙，每天服三次，每次服半匙。
- 【適應症】 小兒百日咳并治慢性氣管炎，忌食刺激性食物，及蝦，蟹等。

百日咳方

梁澤民摘錄「江西中醫藥」五五年六月號
馮享陽同志所寫「天門冬合劑對百日咳的療效」

【處方】（係依照張炳光同志原方畧爲加減而組成）

天門冬五錢，麥門冬五錢，百部根三錢，鮮竹茹二錢，瓜蒌仁二錢，橘紅皮二錢，（按）鼻鯨加白茅根五錢，藕節五錢，水二百西西煎成九十西西。（煎二次）

【服法】二至三歲分三次服，四小時服一次，每次三十西西。四至六歲分二次服，四小時服一次，每次四十五西西。七至十歲一次服完，一日一劑。

【適應】患兒咳嗽時顏面浮腫，呈青紫色，頸項靜脈努張，咳甚嘔吐痰涎，淚汗交加，有時口鼻出血，尿尿失禁或直腸脫出，咳得轉不過氣來，如雞啼的聲音，特別是在痙攣性咳嗽時，雙眼臉結合及球結合膜下鬱血，幼小的兒童，往往於痙攣性咳嗽發作後疲倦入睡，也有在發作時暈厥或窒息而趨於死亡，一般的感冒或肺結核的咳嗽絕不致如此的重篤。

百日咳

封川 梁雲生編

【處方】杏仁三錢，（去皮）桔梗二錢，陳皮錢半，竹茹二錢，麻黃八分（去節）冬花二錢，法夏二錢，甘草錢半。

【用法】先將藥味放入瓦煲內，後放清水二碗，煎至一碗，分二次溫服，此症咳嗽減少，止嘔吐化痰順氣，再服下方。

【適應】咳嗽頻頻，痰多嘔吐，咳如雞啼之狀，不發熱，呼吸困難，有眼胞面部浮腫之狀。

再方

【處方】腹皮二錢，陳皮錢半，桔梗二錢，薤仁三錢（去油）麻黃八分，杏仁三錢，石羔二錢，竺黃二錢，蘇子二錢，苡米三錢，冬花二錢，川貝二錢，甘草錢半。

【用法】照前方，此症已痰咳減少，面部浮腫已消，連服二劑後服下方。