

兒科病中藥療法

孫允中 編著

上海衛生出版社



兒科病中藥療法

孫允中 編著

內 容 提 要

本書採用中西對照形式，以兒科常見的疾病為主。計分新生兒疾病、消化系統病、營養障礙病、呼吸系統病、心臟及血液病、泌尿系統病、神經系統病、傳染性疾病，及驗方選錄、小兒病單方等十章，其中對各項疾病着重在治療方面。書末並附錄「處方篇」，以利查閱。適合臨床醫工參考之用。

兒 科 病 中 藥 療 法

孫 允 中 編 著

*

上 海 衛 生 出 版 社 出 版

(上海淮海中路1670弄11號)

上海市書刊出版業營業許可證出080號

上海市印刷五廠印刷 新華書店上海發行所總經售

*

開本 787×1092 毫米 1/32 印張 4 1/9 字數 87,000

(原千頃堂版印 6,000 冊)

1956年5月新1版 1956年5月第1次印刷

印數 1—2,000

統一書號 14120·67

定價 (10) 0.58 元

兒科病中藥療法目次

前言

第一章 新生兒疾病……………一一一九

一 早產兒……………一

二 不啼……………二

三 不乳……………四

四 眼不開……………五

五 吐不止……………五

六 二便不通……………七

七 臍濕臍瘡……………八

八 臍風……………九

附：撮口瘻風

九 馬牙……………一二

一〇 重舌、木舌……………一三

附：重齦

一一 鵝口瘡……………一四

一二 螻蛄子……………一五

一三 胎黃……………一六

附：胎

一四 胎毒……………一七

一五 赤遊風……………一八

一六 夜啼……………一九

第二章 消化系統病……………二一—三一

一 牙疳……………二一

二 走馬牙疳……………二二

三 乳蛾……………二三

四 疳 腮	二四
五 嘔吐與腹瀉	二五
六 腹 脹	二六
七 腹 痛	二七
八 積 滯	二八
九 癰 病	二九
一〇 便 祕	三〇
一一 疳 病	三一
第三章 營養障礙病	三八—四三
一 解 顏	三八
二 顴陷、顴腫	三九
三 雞胸、龜背	四〇
四 五 軟	四一
五 五 羶	四二
六 五 遲	四三

七 變 蒸	四三
第四章 呼吸系統病	四四—五二
一 咽 痛	四四
二 喉 痺	四五
三 咳 嗽	四六
四 喘 急	四八
五 肺風痰嗽	四九
六 胸 痛	五一
七 肺 癰	五二
第五章 心臟及血液病	五二—五五
一 怔忡、心悸動	五二
二 驚 悸	五四
三 虧 血	五五
第六章 泌尿系統病	五六—五八
一 水 腫	五六

二 癰 症	五七
三 遺 尿	五八
第七章 神經系統病	五九—六二
一 急驚風	五九
二 慢驚風	六一
三 搐 搦	六一
四 慢脾風	六二
第八章 傳染性疾病	六四—七三
一 感 冒	六四
二 麻 疹	六五
三 猩紅熱	六七
四 水 痘	六九
五 頓 咳	六九
六 霍 亂	七二
七 瘧 疾	七二

八 白 喉	七三
第九章 驗方選錄	七四—八〇
一 治抽風方（又治破傷風）	七四
二 小兒抽風藥	七五
三 胎毒特效藥	七五
四 治乳蛾方（扁桃腺炎）	七五
五 吐瀉藥	七六
六 小兒泄瀉方	七六
七 和中丸	七六
八 消疳散	七七
九 糊疳藥	七七
一〇 軟骨病方	七八
一一 咽喉藥	七八
一二 止嗽藥末	七八
一三 治肺炎方	七九

一四	治感冒方	七九
一五	安全透表散	七九
一六	利驚丸	八〇
一七	治順咳方	八〇
一八	清喉散	八〇
第十章	兒科病單方	八一—八六
附錄	處方篇	八七—一〇四
一	新生兒疾病	八七

二	消化系統病	九六
三	營養障礙病	一一五
四	呼吸系統病	一二〇
五	心臟及血液病	一二五
六	泌尿系統病	一二七
七	神經系統病	一三〇
八	傳染性疾病	一三三

兒科病中藥療法

孫光中編著

第一章 新生兒疾病

(一) 早產兒

〔定義〕 在四十星期以前所產生的小兒，叫「早產兒」。他雖然能維持最低限度的生活，但其發育不成熟，對於外界環境缺乏適應的能力，雖加意護理，也難望其成長。其生活的運命與產期的遠近及原因，有密切的關係，發育越成熟，生活力越強。

〔原因〕 一、母體患慢性病（如結核、梅毒等）或慢性中毒（如酒精、鉛中毒等）。

二、母體患急性性病（如肺炎、傷寒、猩紅熱等）或神經素質、外傷等；或雙生兒、過勞，及其他母體生活不良等現象。

〔症狀〕 皮膚弛緩，皮下脂肪少，毛細血管可透視而潮紅，皺紋多為灰白色而現貧血狀態；指甲比較短，哭聲柔弱，有時像貓叫；呼吸微弱，淺而間斷；不能保持體溫，或常常不夠，或隨外界冷熱而改變；哺乳能力薄弱，或不會哺乳；對疾病缺乏抵抗力。大多數是從母體所得到的礦物質和維生素比較少的原因（如鐵、鈣、維生素A D和K等），他們就很容易

患貧血、軟骨病和自然出血等的疾病。

〔護理〕 因為早產兒有以上種種的弱點，必須針對這些弱點來適應他的生活條件。

一、保溫：溫度在二十五度—三十度，用人工保溫法。在兒旁置暖瓶，以布包之，以免燙傷，或以懷抱之。

二、營養：要按二、三小時哺乳一次，最好避免感染，注意消毒；兒體須保持清潔，要常常沐浴。看護人必須帶上口罩，事先要把手洗淨，禁止接觸多數人，也不要搬動太勤。此外水分的補充和多種維生素的供給，都是必要的事。

〔預防〕 普通根據初生兒的體重和身長就可以測知他們的成熟的程度是怎樣，無論是一個足月的初生兒，或是不足月的早產兒，如果他們體重在二·三公斤以下（二三〇〇克），身長在四十五釐以下，皆屬不良。

（二）不啼（俗名草迷）

〔對照〕 假死。

〔原因〕 在小兒降生以後，馬上啼哭，由口腔把氧氣吸進去，把碳氣呼出來，形成瓦斯的交換作用，心臟隨之波動，血液得以循環，以及一切臟器肌肉皮骨等，莫不藉此以營生活的

狀態。不啼的原因是：

一、在臨產發生痙攣性陣痛時，把胎兒逼到產門，進退不得，時間太久，才爲娩出；或羊水泄出過早等。

二、因患難產，經過手術時間太久而取出的小兒，以致氣息閉塞。

三、臨產時天氣太冷，被寒氣所迫。

四、在懸壅垂之間，有毒泡堵塞氣道。

〔症狀〕 生後沒有啼聲，呼吸極微，心音聽不出來，奄奄像死兒一樣。

〔療法〕 一、用手輕拍兒背，使肺部舒張，氧氣得以吸入，自能啼哭。（舊法用葱一束，鞭打兒背，亦卽此意。）

二、如前法不效時，可提起小兒兩腿，倒懸而甩動之，必能生效。

三、薰臍帶法：先將降生的小兒，用棉絮包裹，抱在懷裏，用艾絨點火放在臍帶上灸之，把寒氣驅出，再爲剪斷臍帶。

四、先看口腔深部，如有毒泡堵塞氣道時，可用消毒後的鋼針或銀針把泡挑破，用消毒棉把惡血拭淨，自能出聲。

〔預防〕 除去妨礙胎兒呼吸的原因，可減少本病。

(三) 不乳

〔原因〕 小兒降生後，就有吮乳的本能，若不能吮乳，是爲病態。但有因口腔有病（如鵝口、馬牙、重舌、木舌、咽喉腫痛等）和因臍風而不能吮乳的區別。

〔症狀〕 一、早產兒與生後衰弱的小兒，有類似的症狀或不乳，或吮乳力量不足。

二、臍囊不下，所謂胎飽，胸腹脹滿，氣滯嘔逆。

三、胎中受寒，面色青白，四肢厥逆，口鼻冷，出冷汗，屈腰腹痛。

〔療法〕 一、生後衰弱兒，用參苓白朮散補之。

二、臍囊不下，嘔吐不乳，應用一捻金。

三、胎中受寒，用勻氣散調之；如四肢厥逆，口鼻冷，出冷汗，屈腰腹痛，用理中湯以溫之。

〔預防〕 哺乳不可過多或過少。小兒在急欲吃乳時，不可給乳太急，也不可多給，應以適當爲度。生後衰弱兒吮乳無力時，可用人工哺乳法，或以膠皮乳頭代替。總之人乳最好，尤其是母乳更好，每天給十次或十二次。

〔預後〕 面色青白，四肢厥冷，呻吟多啼，不能進點滴乳汁的小兒，預後不良。

(四) 眼不開

〔對照〕 膿漏眼。

〔原因〕 小兒生後，兩眼不開，多因胎毒內蘊，或穢水侵入眼中，以致眼胞赤腫。又有因產母陰道的淋菌侵入小兒的眼睛裏，以致兩眼不睜。

〔症狀〕 小兒生下二、三天或六、七天之間，眼瞼及結膜發紅腫脹，或有黃白色膿樣的液體的炎症，再進一步侵入角膜，形成雲翳斑點或潰瘍。

〔療法〕 內服生地黃湯；外用2%硼酸水洗之，然後用消毒滅菌的藥布，熱敷於眼皮上，或用熊膽洗法及黃連膏抹眼內。

〔預防〕 一、乳母應忌食一切辛辣動火的食物。

二、或以清涼眼藥滴入眼中。

三、應避免室內強烈的光線，或塵埃烟氣，或過熱的刺激，以免傳染等。

(五) 吐不止

〔原因〕 一、腹中穢惡不淨。

二、生產時感受寒邪，內侵腸胃。

三、胎前受熱。

四、胎前受寒。

〔症狀〕 一、穢惡不淨，積在胃中，腹部脹滿，氣濁便秘。

二、屈腰而啼，口吐白沫。

三、胎前受熱，面色赤黃，手足溫和，口吐黃涎，特別酸粘。

四、胎前受寒，面色青白，四肢厥逆，口吐白沫，特別清稀。

〔鑑別〕 吐不止，吐出黃粘涎，或白清沫。黑吐病（西醫）以吐血及血便為主。

〔療法〕 一、穢惡不淨，用一捻金下之，生薑汁調服。

二、感受寒邪，用香蘇飲以溫散。

三、胎前受熱，用二陳湯加黃連以清解。

四、胎前受寒，用理中湯以溫之。

五、或有吐乳直出而不停止的，是由吃乳過多，消化不良；又兼新生兒胃腕括約筋弛緩，沒有收縮能力，所以嘔吐，用參砂和胃散。

〔預防〕 一、用生薑汁塗兒舌，能止嘔。

二、在哺乳時先把乳頭消毒，給乳要適合其量，不可過飽。

三、浴兒時，室內要嚴密，以免風邪侵入。

〔預後〕 吐始終不止，如發現有急驚慢脾的癇癇症候時，預後多不良。

（六） 二便不通

〔原因〕 一、小兒初生不小便，係胎熱移於膀胱，所以宣明五氣篇上說『膀胱不利爲癰』，正是指此而言。

二、小兒生後，一天至二天即大便，俗名叫「下臍屎」，這是胃腸通暢的表現。若二、三天不大便，這叫「鎖肚」，是由胎中蘊熱鬱結不通的緣故。

〔症狀〕 一、輸尿管或膀胱發生障礙，以致小腹脹滿，小便不通。

二、面赤腹脹，口乾舌燥，小便赤澀，大便始終不解。

〔療法〕 一、小便不通用葱乳湯，方頗平淡而有效；或以食鹽炒熱裹以消毒的藥布，熨於臍中。如小腹脹滿，用消毒的針略刺小腹數下，刺出紫血少許，小便必通。此外用導赤散或八正散皆可。

二、大便不通，用萬應丸或三黃湯加大黃服之即通。

三、如大小便皆不通時，可用口嘔「五心臍下法」(註)。

〔預防〕 一、乳母忌食厚味，平時以燈心、竹葉煎湯飲之。

二、用蓖麻油少量與之，能以滋潤腸胃，不致大便不通。

〔預後〕 一、小便不通，腹中脹急，胸滿而喘者，多不能救。

二、腹中膨脹，不能食乳，作呻吟聲，大便閉塞，到七天時則死。

(七) 臍濕臍瘡

〔原因〕 小兒斷臍後，處置不當，容易引起病毒走竄，釀成各種臍病。

〔症狀〕 一、臍濕：斷臍不慎，或衣服尿布受濕，侵及臍眼，即使局部腫濕不乾。

二、臍出血：在臍帶脫落前後時，因繫結不良，遂致臍中出血。

三、臍膿漏：臍中先流臭水，漸漸的出膿汁，如時間長了，容易引起敗血症。

四、焮腫成瘡或生瘰肉。

五、臍疝氣：俗名叫「氣肚臍」，由於小兒過於啼哭，使肚臍努張而突出。

(註) 五心臍下法：用口吮嬰兒的兩手心、兩足心、前胸及臍下，以皮膚成紫紅色爲度。這和針灸的作用相同，是祖國的民間經驗療法有效之一種。

六、臍壞疽：因臍部潰瘍形成蜂窩織炎，陷於壞疽，有惡臭之滲出物流出。

〔療法〕 一、臍濕：滲臍散敷之，或硼酸水洗滌。

二、臍出血：上珍珠散。

三、臍膿漏：先以消酸銀棒腐蝕之，或生理食鹽水洗之，或用乾性綑帶。

四、焮腫成瘡或生瘰肉，金黃散敷臍部。

五、臍疝氣：用綑帶纏肚臍，如化膿時用外科手術切開。

六、臍壞疽：消酸銀棒腐蝕之。

〔預後〕 以上諸種臍病，如百日不愈時，可能引起內風，發生痙攣而死亡。

（八） 臍 風

〔對照〕 破傷風

〔原因〕 初生兒在斷臍的時候，應當謹慎，不可被水濕寒氣侵入；因手術不潔，消毒不良，感染破傷風菌，混入血中；或斷臍以後，包紮不嚴，以致受病；或因臍帶脫落過早受傷等，這些原因，都能引起臍風病。所以說臍風是初生小兒第一重要的疾病。這個病西醫叫「破傷風」，我國俗名叫「四六風」。患了這個病以後，若不急速治療以致病毒走竄，死亡

率最高。在初起時急速救治，猶恐難望其保全，所以有臍風難治之說。由此可見，初生斷臍，必須十分注意爲要。

〔症狀〕 一、在臍風發作的時候，小兒啼叫，顯出不安的狀態，吮乳口鬆。若檢查腹部，略有膨脹，臍部作腫，兩眼角及挨眉心處有黃色出現，症狀較輕，治之尚可。如黃色到人中、承漿部位，治之稍難。再有口不撮而微似吹噓的形態，或可治愈。

二、再如臍風的變症，寫在下面：

(1) 重症的發爲驚搐，肚腹脹硬，大便不通，這是臍風兼實的症狀。

(2) 面色青白，四肢厥冷，二便不實，這是臍風兼虛的症狀。

(3) 痰涎壅盛，氣高喘急，這是臍風兼痰的症狀。

(4) 身體發熱，面赤口乾，這是臍風兼熱的症狀。

(5) 屈腰多啼，這是臍風兼寒的症狀。

(6) 口撮唇青，抽搐不止，這是臍風兼驚的症狀。

〔療法〕 一、內治方法：

(1) 臍風初起作抽的，用驅風散。

(2) 臍風兼實的症狀，用黑白散。