


国外市售成药介绍



国外市售成药介绍〈4〉

消化、呼吸及神经系统药物

北京市医药情报所 编译

北京市药材公司印刷所 印刷

1981年10月

目 录

一、消化系统药物

1. 抗酸剂, 胃溃疡药物..... 1 —33
2. 含镇静剂的抗酸剂, 胃肠道调节剂.....35—52
3. 解痉药..... 53 —102
4. 轻泻药, 催泻药.....103—119

二、呼吸系统药物

1. 呼吸系统兴奋剂.....121—123
2. 止喘制剂.....125—171
3. 咳嗽感冒药.....173—254

附注: 由于内容过多, 影响装订, 故将呼吸系统药物中的减充血剂、其它鼻用制剂以及神经系统药物等在本册中编辑出版。

ACTAL

【中文名】聚羟铝单碳酸钠己糖醇

【剂 型】片剂

【生产厂】Winthrop

【成 分】聚羟铝单碳酸钠己糖醇360mg

【适应症】减轻消化性溃疡引起的胃酸过多，消化不良和疼痛。

【用 法】需要时吞服 1—2 片。

【包 装】20片 (0.70)，100片 (3.30)，1,000片 (15.00)

ALUCAP/ALUTAB

【中文名】氢氧化铝

【剂 型】胶囊，片剂

【生产厂】Riker

【成 分】干氢氧化铝凝胶

【适应症】非并发的消化性溃疡，胃酸过多。

【用 法】遵医嘱。

【包 装】片剂：600mg×100 (7.20)。

胶囊：400mg×100 (5.00)。

ALUDROX

【中文名】（铝镁合剂）

【剂 型】混悬剂，片剂

【生产厂】Wyeth

【成 分】氢氧化铝，氢氧化镁。

【适应症】胃酸过多和消化性溃疡。

【用 法】暂时控制胃酸过多：根据需要服 1—2 茶匙混悬剂或咀嚼 1—2 片。

减轻消化性溃疡疼痛：1—2 茶匙混悬剂，或 1—2 片，5—6 次/日，在就餐之间或就寝时服用。

【包 装】混悬剂：12 呖（2.90）

片剂：100 片（3.20）

10,000 片（276.70）

AMPHOJEL

【中文名】（中性铝胶）

【剂 型】混悬剂，片剂。

【生产厂】Wyeth

【成 分】混悬剂：氢氧化铝凝胶

片 剂：氢氧化铝0.3gm

【适应症】治疗非并发性消化性溃疡和胃酸过多。

【用 法】每日在两餐之间和就寝时共服5—6次，
每次服混悬剂1—2茶匙或1—2片。

【包 装】混悬剂：12两（0.29）。

片 剂：100片（3.30）。

A—M—T

【中文名】 (安胃)

【剂 型】 混悬剂，片剂。

【生产厂】 Wyeth

【成 分】 混悬剂：12.5%三硅酸镁氢氧化铝凝胶。

片 剂：相当于0.15gm氢氧化铝的干品氢氧化铝凝胶和0.25gm三聚硅酸镁。

【适应症】 胃酸过多和消化性溃疡。

【用 法】 暂时减轻胃酸过多：需要时服1—2茶匙混悬剂或1—2片。可重复5—6次/日，在就餐之间及就寝时或需要时服用。

【包 装】 混悬剂：12啊 (2.90) 。

片 剂：100 片 (4.10) 。

ANDURSIL

【中文名】（胃舒）

【剂 型】混悬剂

【生产厂】Geigy

【成 分】每5ml内含氢氧化铝 200mg，氢氧化镁 200mg，用150mg聚甲基硅氧烷活化的氢氧化铝/碳酸镁共干凝胶200mg。

【适应症】可减轻由消化性溃疡引起的腹胀，胃灼热，气胀和呕吐，食管裂孔疝，胃炎和肠胃功能紊乱等症状。

【用 法】5—10ml/次，3—4次/日及就寝时服用。

【包 装】300ml（6.30）。

ASILONE

【中文名】（亚西隆）

【剂 型】混悬剂，片剂，婴儿用混悬剂。

【生产厂】Berk

【成 分】婴儿用混悬剂每 5 ml：二甲基硅油25mg，
干品氢氧化铝凝胶84mg，氧化镁14mg。
每 5 ml混悬剂：二甲基硅油125mg，干品
氢氧化铝凝胶 420mg，氧化镁 70mg。
每片：二甲基硅油 250mg，干品氢氧化铝
凝胶500 mg。

【适应症】腹胀，气胀，食管裂孔疝，反胃，胃炎，
婴儿消化不良。

【用 法】婴儿：1 茶匙/次，3—4 次/日，饭前或
与食物同时服用。

混悬剂：1—2 茶匙，饭前及就寝时服用。

片剂：1—2 片，饭前及就寝时服用。无
毒性。

【包 装】婴儿用混悬剂：100ml (3.40) 。

混悬剂：100ml(2.90),300ml(8.50)。

片 剂：100片 (13.80) 。

BIOGASTRONE

【中文名】生胃酮

【剂 型】片剂

【生产厂】Berk

【成 分】 3β -羟基-11-氧代- 20β -齐墩果-12-烯-29-羧酸氢丁二酸酯

【适应症】胃溃疡

【用 法】第一周2片/次，3次/日，饭后吞服，以后1片/次，3次/日，直至溃疡痊愈。

【包 装】24片（11.60），100片（41.20）。

BISCASIL

【中文名】（复方矽炭银）

【剂 型】片剂

【生产厂】Waldemar Weimer

【成 分】铝酸铋12.5mg，碱式碳酸铋12.5mg，次硝酸铋12.5mg，碳酸钙37.5mg，碳酸氢钠135mg，薄荷油0.75mg，硝酸银50mg，活性炭50mg，磷酸镁5mg，二氧化硅5mg。

【适应症】胃及十二指肠溃疡，胃灼热，胃粘膜炎症，消化不良，胃肠气胀。

【用 法】2—3片/次，3次/日。

【包 装】100片。

CAMALOX

【中文名】（克酸乐）

【剂 型】混悬剂，片剂。

【生产厂】W·H·Rorer

【成 分】每片或每 5 ml混悬剂合氢氧化镁200mg，
氢氧化铝225mg，碳酸钙250mg。

【适应症】消化性溃疡，胃炎，胃酸过多，食管裂孔
疝，消化性食管炎，胃灼热等。

【禁忌症】严重虚弱或患肾功能衰竭者禁用。

【用 法】成人：每次 2—4 片或 1/2—1 汤匙混悬
剂，饭后半小时至 1 小时及就寝时服用。

【包 装】100片（5.30），1,000片（46.60）。

混悬剂：12啊（3.60）

DE—NOL

【中文名】（退胃疡）

【剂 型】溶液

【生产厂】Brocades

【成 分】二柠檬酸络铋酸三钾。

【适应症】消化性溃疡，十二指肠溃疡。

【禁忌症】严重肾机能不全，妊娠。

【用 法】5 ml用水稀释至20ml，4次/日，饭前半小时及晚饭后二小时服。

【包 装】120mg/5ml×560ml（32.90）。

DIGENE

【中文名】（胃得静）

【剂 型】片剂

【生产厂】Boots

【成 分】干品氢氧化铝凝胶300mg，硅酸铝镁50mg，氢氧化镁25mg，甲基聚硅氧烷10mg。

【适应症】消化性溃疡，食管炎，胃酸过多，食管裂孔疝，胃肠气胀。

【用 法】需要时服1或2片，就寝时服2片。

【包 装】500片（8.80）。

DISFATYL

【中文名】（消胀）

【剂 型】片剂

【生产厂】Solco Basle

【成 分】二甲基聚硅氧烷40mg，二氧化硅 2 mg。

【适应症】随各种胃病并发的胃气胀，手术后的气胀，吞气症，功能性消化不良。

【用 法】饭后及就寝时嚼碎服 1 或 2 片。

【包 装】30片（2.20），100片（5.60）。

500片（25.30）。

DOGMATIL

【中文名】（舒宁）

【剂 型】胶囊、针剂、糖浆。

【生产厂】Delagrang

【成 分】5—氨磺酰基—N—（1—乙基—2—吡咯烷基）甲基—2—甲氧基苯甲酰胺50mg/胶囊，100mg/2 ml安瓿，25mg/茶匙糖浆。

【适应症】胃和十二指肠溃疡，溃疡性结肠炎，节段性回肠炎，结肠功能紊乱，消化型偏头痛。

【用 法】遵医嘱。以消化性溃疡为例：发作时每日2—3支，连用1—2周。维持疗法为每日三粒胶囊或六茶匙糖浆，连用三周。预防复发则每日1—3粒胶囊或2—6茶匙，连用三周。

【包 装】胶囊：30粒（13.50）300粒（115.00）。

针剂：6支（6.7），60支（56.00）。

糖浆：200ml（9.30）

DUOGASTRONE

【中文名】（溃得宁）

【剂 型】胶囊

【生产厂】Berk

【成 分】 3β -羟基-11-氧代- 20β -齐墩果-12-烯-29-羧酸氢丁二酸酯。

【适应症】十二指肠溃疡。

【用 法】1粒/次，4次/日，饭前15—30分钟服用。
至少连续服药六周。

【包 装】28粒（22.00）。

GASTEEL

【中文名】（胃气脱）

【剂 型】片剂

【生产厂】Shinfuso

【成 分】二甲基聚硅氧烷40mg

【适应症】消除肠胃内气体。

【用 法】1—2片/次，3次/日，饭前或饭后服。

【包 装】1,000片（16.00）。

GAVISCON

【中文名】（胃维康）

【剂 型】片剂

【生产厂】Reckitt & Colman

【成 分】每片：藻酸（英国副药典）500mg，三硅酸镁25mg，干品氢氧化铝凝胶100mg，碳酸氢钠170mg。

【适应症】反胃，逆流性食管炎，胃灼热，食管裂孔疝，胃肠气胀。

【用 法】成人：饭后及就寝时服1—2片。

儿童：成人之 $\frac{1}{2}$ 量。充分咀嚼。

【包 装】3×20片（6.30）。

GELUSIL

【中文名】（克酸）

【剂 型】片剂

【生产厂】William Warner

【成 分】三硅酸镁0.5gm，氢氧化铝0.25gm。

【适应症】胃酸过多及消化性溃疡。

【用 法】1—2片，可嚼碎或吞服或需要时服。

【包 装】50片（1.60），500片（10.80），
2,500片（32.00）。

GELUSIL—M

【中文名】（克酸—M）

【剂 型】溶液、片剂。

【生产厂】Warner Chilcott

【成 分】氢氧化铝，三硅酸镁，氢氧化镁。

【适应症】抗酸剂。

【用 法】根据需要服 1—2 片或 1 茶匙。

【包 装】片剂：100片（4.90），500片（11.30）。

溶液：12 呖（3.00）。

GELUSIL—MPS

【中文名】（克酸—MPS）

【剂 型】溶液，片剂。

【生产厂】Warner Lambert

【成 分】每片或 5 ml 溶液：甲基聚硅氧烷 50mg，
干品氧化铝凝胶 250mg，氢氧化镁 250mg。

【适应症】胃肠气胀，胃酸过多，消化性溃疡。

【用 法】饭后及就寝时服用 1—2 片或 1—2 茶匙。

【包 装】片剂：100片（5.70），500片（21.30），
3,500片（93.00）。

溶液：12 呖（2.80）。