

# 麻风病驗方集錦

沈上洋 編



上海科学技术出版社

## 前　　言

麻风病在我国流行已經二千多年了，人們對它並不生疏。在祖国的医学遗产中，早就有了非常丰富的宝贵的治疗經驗，历代先賢著述了不少理論及防治方法，如文献上記載采用大楓子治愈本病的治疗經驗，已經有几百年历史。中医中药对治疗本病的效果确实很大，而且极为安全(很少麻风反应与恶化作用)，不但受到患者的欢迎；还引起世界各国医学家的注意。据报載印度麻风病专家毛氏，单用大楓子油治疗麻风病，曾在印度和非洲治愈許多患者，仅仅在他国内就治愈了6万多麻风病人。

自从党中央提出的1956—1967年全国农业发展綱要中第26条的规定，要求在12年内消灭麻风病的号召，各地先后加紧展开对麻风病的防治工作。目前全国各地治疗麻风病机构都采用中医中药来治疗本病，治愈了不少患者，收到很大成績。单以广东一省來說自1954—1957年的統計(广东卫生厅发表材料，报載)，就用中医中药治愈了400多名。根据1958年10月11日健康报第682期报导，到現在治愈的已有1104人(包括上述数字在內)。因此，在目前的新形势下，进一步来加强推广与钻研中医中药对本病的防治是十分必要的。一方面以繼承发扬祖国医学遗产；另一方面使中医中药发挥更多效能提高医疗质量，为早日消灭麻风病而貢献出它的力量。

防治本病的中医中药是非常广泛的，不但只是医学文献上的記述，还有許許多流傳在民間的秘方、驗方，同样有很高的疗效。近年来，各省紛紛出版关于中医驗方秘方的

书籍，可是对于治疗麻风病这方面的驗方、秘方介紹得很少，不能滿足临牀上参考研究的需要。笔者有鉴于此，特此着意搜集，迄至目前为止，已經集得 77 方，其中有的已經經過試用，具有显著疗效者（并已发表的），一般都是通过个别地区或个别临床实用而得来的，經加整理，編成本书。由于時間仓促及个人水平有限，錯訛之处，在所难免，請讀者給予指導和批評！

本书主要是提供医务人员在临幊上作参考研究。希望各地有关医疗机构在采用或試用时，必須要以积极慎重的态度，方中刷毒藥如信石、汞丹、蜈蚣等等，更須謹慎小心。方內剂量請勿擅自加減，切勿两方同时兼用，以防意外。患者如要采  
用时应与中医師研究征得同意后方可。

〔附注〕 麻风病古方未經試用获效者，概未編集。

1958年10月15日

# 目 录

一、愈风膏丸	1
二、龟苓膏丸	2
三、大楓子膏丸	3
四、三仙丹丸	4
五、砒霜散	4
六、皂角刺散	5
七、蠍蛇治风丸	5
八、蒼耳膏	6
九、諸蛇驅風丸	6
一〇、麝楓解毒丸	7
一一、苦參丸	7
一二、赤銀丹	8
一三、胡麻油	8
一四、大楓子油	9
一五、万安五服方	9
一六、蜈蟾丸	10
一七、脾經丸（复方麻 风片第一方）	11
一八、五經丸（复方麻 风片第二方）	11
一九、励风丸（复方麻 风片第三方）	12
二〇、防风通經丸（复	
方麻风片第四方）	12
二一、漆黃蠟酥丹	13
二二、麻风丸	13
二三、百刺膏	14
二四、黑白蛇丸	14
二五、皂黃丹	15
二六、忍冬藤膏	15
二七、大小胡麻散	16
二八、魚胆根（粤称了哥 王又名地巴麻）膏	16
二九、扫风丸	17
三〇、松香散	17
三一、和县烏江勝汝申 國藥局藥方	18
三二、全椒縣張國权藥 方	19
三三、菖蒲根膏	19
三四、白毛鴨子方	20
三五、鷄子方	20
三六、虾蟆鷄	20
三七、治麻風驗方	21
三八、歸退丸	22
三九、銀蒲丸	23

四〇、加味漆黃蟾酥丹	24	六〇、退风散	34
四一、解毒湯(散)	25	六一、白花蛇散	34
四二、蒼耳子湯	25	六二、苦參散	35
四三、疏風解毒湯	26	六三、楓子丸	35
四四、麻風丸	26	六四、五參烏蛇散	36
四五、何首烏酒	27	六五、加味胡麻丸	36
四六、五子十白散	28	六六、薄荷漆叶散	37
四七、側柏叶丸	28	六七、虎蛇龜膏	38
四八、苦參酒	29	六八、復方荆芥丸	38
四九、馬鞭草膏	29	六九、二號扫風丸	39
五〇、蝮蛇酒	30	七〇、易老祛風丸	39
五一、万靈丹	30	七一、蟾蜍酒	40
五二、神應消風散	31	七二、四六湯丸	40
五三、追風散	31	七三、黃芪防風湯	41
五四、磨風散	31	七四、羌翹楓油丸	41
五五、醉仙散	32	七五、天麻散	42
五六、再造散	32	七六、蔓荊子散	42
五七、換肌散	32	七七、防風散	43
五八、補氣泻榮湯	33	[附] 服藥時應注意的 事項	43
五九、扫風散(丸)	33		

# 麻风病驗方集錦

## 一、愈風膏丸

〔主治〕 瘤型及結核样型麻风病。

〔处方〕 1. 鮮蒼耳全草一百斤(如无, 可以蒼耳子減半代替) 鮮忍冬藤三十斤(如无, 可用金銀花五斤代替) 鮮土茯苓十斤(如无, 可以土茯苓片五斤代替) 鮮皂角刺三斤(如无, 可用角刺片一斤八两代替) 鮮土菖蒲根七斤(如无, 可以土菖蒲干片三斤代替) 以上五种均是生草藥, 最好用生鮮者, 但如无时, 可以干藥或片藥代替。

2. 白花蛇三斤 苦參片五斤 牛蒡子 胡麻仁 連翹子 紫草莖 白蒺藜 双鈎藤 浮水萍 白鮮皮 大楓子 地肤子 地骨皮 海桐皮 炮山甲 山梔子 百部根 冬瓜仁 川大黃 黃柏皮 桑寄生 五加皮各一斤八兩 赤芍 薄荷 元參 水仙子 防風 北荆芥 升麻各一斤 生鮮白鱠蛇三斤(干者一斤) 大生地二斤(另熬)

3. 全蠍虫 西川連 白姜蚕 金蟬退 北天麻 川貝母 血琥珀各八兩 白芨子十二兩 正冰片一兩 牛黃五分至五錢 鱉鯉胆十至二十個(如无者, 則多加穿山甲一斤八兩, 总共三斤, 同上一起熬)

〔制法〕 将1.类生草藥切碎混合放入鍋內熬煎, 每在8—12小时, 濾取熬好的藥水一次, 复加入清水再熬煎如上, 連續濾取熬好的藥水有三次后, 便將三次所得的藥水調勻, 去渣過濾后, 又將這些藥水用慢火再熬煎, 煎至收膏為度, 似凡士令狀為妙。复将2.类中藥磨碎混合同熬煎, 如同1.类生草藥一

样熬法，連續滤取三次以上熬好的药水之后，又将其如前法熬成膏。另将大生地单独一味熬煎 $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ 小时，去渣留药水（此味不能久熬，久熬即成熟地水，失掉清血、凉血作用）。最后将生地水、1. 类生草药膏、2. 类中药膏三样共和一起调匀，慢火再熬1—2小时左右，以收膏象凡士令状为最标准。

再将3. 类中药，共为细末，以最后熬好的膏调为丸，烤干或晒干后，以鲮鲤胆汁（如无胆无汁者，可用生地水调好，如无胆者，或以生地水或白鱠蛇之油代替均可）湿丸皮，以牛黄作裹衣，每丸重2市钱，阴干后，妥为保管，勿洩气。

如调得过湿时，可以晒干或烤干一些再为丸，必要时可以酌加3. 类中药粉亦得；如过干时便以生地水调和为度。

〔服法及剂量〕 每日三次，每次服3—6丸，白糖或红糖调开水送服，空肚或饭后服均可，如服后疗效不大，可根据患者具体情况，逐渐增加，据一般经验，日服最高量为45丸，最低为9丸。如发生食慾不振时，可以甘草、红枣湯送下。

〔来源及说明〕 該方是根据古方“愈风膏”及民间流传经验良方，与我家家传多年来的临床实验相结合而整理拟成的，名为“愈风膏丸”，是独家经验秘方，对于治疗麻风病，疗效很好，今特公开献出，以供参考研究。

## 二、龟苓膏丸

〔主治〕 初起或结核样型麻风病。

〔处方〕 红肚（英咀）活龟一只 土茯苓一斤 金銀花四两 赤芍药 翻尾 白丑 黑丑 正蕲蛇 怀牛膝 大生地 川紅花 川大黃 炮甲珠 浙貝母各二两 苦参片 胡麻仁 各六两 角刺片 乳香 没藥 黄芩 蛇床子 甘草节各一两 遼翹子 牛蒡子各一两五錢 射干 黃藤 地丁草各一

## 兩二錢

〔制法〕先以活鱼和土茯苓同熬成膏后，又将以上各味共为細末，以膏調为丸，如梧桐子大。

〔服法及剂量〕每日2—3次，每次5—7市錢，开水送服。

〔来源及說明〕該方是民間流傳单方，疗效很好，但只宜于初期較輕病症者，或将近痊愈的患者。

## 三、大楓子膏丸

〔主治〕瘤型及結核样型麻风病。

〔处方〕大楓子二斤

初服方：北天麻 白芷片 川續斷 西秦艽 北防风  
怀牛膝 連翹子 北荆芥 川羌活 全当归片 煎苡米 汉  
蒼朮 陈皮 凤藤 海桐皮 川木香 苦參片 桂枝 甘草  
各三錢 黑枣二枚 生姜一片

二服方：胡麻仁 白蒺藜 苦參片各一斤四两 大胡椒  
大生地各一斤 防风 北荆芥各八两 蒼朮 当归各六两  
煎苡米 川續斷 怀牛膝各四两

〔制法〕先将大楓子去壳取仁，放在銅鍋內炒，炒至三分紅色，七分黑色为最标准，炒得太过黑則无效，炒得紅太多則服后伤肝損眼。炒后研搗成細膏状，如紅沙糖一样，再加上清水熬煎20—30分鐘，倒出去其水分，放在地面上打地气，以解火毒，密盖听用。初服方是煎剂，用清水煎妥便得。二服方內各药共为細末，米糊为丸，如梧桐子大。

〔服法及剂量〕先服煎剂4—6剂，每天服1剂，日服2—  
3次，服时加大楓子膏3—5市分冲服，每服1碗。后服丸剂，  
每日3次，每次3—5錢。每重1两药丸，则加大楓子膏1錢  
(即十分之一)，混合攪和同服，用开水送下，饭前后服均可。

〔来源及說明〕 該方來自日本人編著的“漢醫驗方”一書中，療效頗佳，但方內有用燥藥，最適應于潰瘍性者，如破口流黃水等情況。如在用水劑很適應時，即可大膽用丸劑。

#### 四、三仙丹丸

〔主治〕 瘤型麻風病及潰爛性梅毒病。

〔处方〕 三仙丹（水銀、生研、銀硝等分制成）四兩 輕粉  
琥珀各二兩 牛黃 珍珠 麝香各三至五分 百草霜適量

〔制法〕 共為細末，米糊為丸，以百草霜裹衣，陰干勿晒，密藏勿泄氣。丸大如黃大豆一樣即可。

〔服法及劑量〕 每日早晚飯後各服1次，每次1.5—2市錢，用紅棗肉包夾丸吞服，開水送下。

〔來源及說明〕 此方是根據古方“三仙丹方”，經過整理擬成，對於瘤型麻風病，很有效力。此方是猛劑，非嚴重病症者，切勿輕投。

#### 五、砒霜散

〔主治〕 严重瘤型麻風病。

〔处方〕 冬取松樹之花尖 紫荊樹皮各三斤 陳酒十二斤 信石十二兩

〔制法〕 以松樹之花尖及紫荊樹皮同放入瓶內，用陳酒浸之，約一年左右即可用。又將信石研為極細粉末。

〔服法及劑量〕 先將浸好的酒暖過，每服酒1—4兩，加信石2—5分沖服，日服2次。

〔來源及說明〕 此方原是一道士所傳，用來治療嚴重瘤型麻風病，很收奇效。但此方是猛劑，尤以信石為劇毒藥物，不是辨別認清其症，不宜投此劑。一般初服小量為妙，次後逐漸增多，以適應患者脾胃為原則。

## 六、皂角刺散

〔主治〕 初期瘤型及結核样型麻风病。

〔处方〕 皂角刺三斤 川大黃適量

〔制法〕 将皂角刺炒存性(半焦黃样子)，再放入鍋內蒸之，或放在地面打地氣，以解火毒，再晒太阳(勿烤干)后，研为細末。

〔服法及剂量〕 每日以川大黃2—3錢煎水。每次服皂角刺粉2—3錢，日服2次，早晚飯后服，用大黃濃湯調送下。

〔来源及說明〕 此方是民間流傳方，經試用之后，亦有疗效，但須炮制得当，以免失效。同时更須研得末細如尘方可。

## 七、蠍蛇治風丸

〔主治〕 瘤型及結核样型麻风病。

〔处方〕 全蠍虫 真蘄蛇 金蟬退 白美蚕 苏薄荷  
川獨活 赤芍各八兩 当归 白芷 北天麻 金毛狗脊(以上均酒浸)各六兩 大楓子肉 苦參片各七兩 防風 汉防己 何首烏 白菊花 炮山甲各四兩 金頭蜈蚣 黃梔仁  
連翹子 大川芎 白鮮皮 牛蒡子各二兩

〔制法〕 共為細末，米粉加酒煮成糊，以糊調為丸，如梧桐子大。

〔服法及剂量〕 每日服2—3次，每次服8錢—1.2兩，空心服，用开水冲酒各半送服。

〔来源及說明〕 此方來自日本人編著的“驗方新編”一書中。此方初服时会引起一时性惡化，如紅紫更为緊張，此乃酒刺激之作用，可勿惊慌。此方最适应于有嗜濁癖的麻风病人，或皮肤很为厚硬，非借酒力不能引帶藥力的病者。此方有劇毒藥物——蜈蚣，最好从小量服起。

## 八、蒼耳膏

〔主治〕 初期和晚期麻风病。

〔处方〕 蒼耳全草五十至一百斤

〔制法〕 秋季时，将蒼耳全草收集切碎，用大鍋煮熬成膏。（熬法見上“愈風膏丸”方）

〔服法及剂量〕 每日服2次，每次服5—8錢，加紅、白糖冲开水，当茶飲。

〔来源及說明〕 此方是民間流傳方，許多麻风患者，均以此膏冲开水，加上一些紅、白糖送下，当作茶飲，久而久之，自然而然愈。此方最为平稳，并沒有什么副作用，也沒有恶化之弊，最为麻风病人欢迎。

## 九、諸蛇驅風丸

〔主治〕 瘤型及結核样型麻风病。

〔处方〕 白花蛇 白鱗蛇 土蠻蛇 烏梢蛇各一斤 胡麻仁 苦參片 炮山甲 大楓子 地丁草 牛蒡子 連翹子 金銀花 冬桑叶 浮水萍各一兩五錢 北防風 大生地 北天麻 苏薄荷 赤芍藥 白姜黃 海桐皮 大元參 清風藤 双鈎藤 北荆芥 川獨活 山梔子 北黃芩 川大黃 西黃柏各一兩 川羌活 全蠍虫 金蟬退 川白芷 川芎 蘿归 尾 怀牛膝 汉防己 白蒺藜 白菊花 何首烏 槐花 天花粉 金狗脊 川杞子 角刺片 汉蒼朮 白鮮皮 川木瓜 威靈仙 川黃連 蔓荆子 西秦艽 川續斷 晉黃芪 白附子 千年健 北細辛 麻黃 川枳壳 薤苡米 赤小豆 烏藥 銀柴胡 漏芦 甘草節 地骨皮各五錢

〔制法〕 共为細末，炼蜜为丸，如梧桐子大。

〔服法及剂量〕 每日服2—3次，每次5—10錢，飯前服。

均可服食，开水送下。

〔来源及說明〕此方是民間流傳經驗良方，方中有燥藥，只要認清症狀，屢收奇效。此方為兩廣民間常用治療麻風病之要劑，尤以治療皮膚破爛、時流黃水的瘤型麻風病為最有效。

## 一〇、麝楓解毒丸

〔主治〕瘤型及結核樣型麻風病。

〔处方〕麝香五分 大楓子二斤(去油) 全蠍蟲 北天麻 赤芍藥 牛蒡子 甘草 漢蒼朮各一兩五錢 苦參片 小胡麻 山甲片 知母 金銀花各四兩 当歸 怀牛膝 川地骨各二兩 防風 元參 麥門冬 白蒺藜 黃柏皮 皂角刺 猪苓 川黃連 生黃芪 威靈仙 蟬虫退 川白芷 洋參 何首烏各一兩 蕲蛇 大生地各十兩 蒜苡米六兩

〔制法〕共為細末，煉蜜為丸，陰干，切忌火烤。

〔服法及劑量〕每日服2次，早上起床時及晚上臨睡時各服1次，每次服1—3市兩；空肚用開水送服下。

〔来源及說明〕此方原是古方，經整理後，通過臨床實驗而擬成，功效極佳。該方無偏熱偏寒之弊，臨床沒有什麼惡化及大的副作用。

## 一一、苦參丸

〔主治〕結核樣型及瘤型麻風病。

〔处方〕苦參一斤 大楓子八兩 北防風八兩 北荆芥一兩 白芷八兩 当歸五錢 川芎三錢 皂角 威靈仙 蕤薢子 怀牛膝 連翹子 川杜仲 全蠍蟲 川杞子 胡麻仁 何首烏 白花蛇 清風藤 北天麻各三錢 川羌活 川獨活 草烏(川產者) 白附子 蔓荆子 西砂仁 甘草 漢蒼朮 白蒺藜各二錢 人參一錢

〔制法〕先将大楓子去壳去油，同胡麻仁、何首烏、北天麻、漢蒼朮四味共炒黃，其余晒太陽后，全部混合一起，研成粉末，過篩，醋糊為丸，如梧桐子大。

〔服法及劑量〕早飯前晚飯后各服1次，每次2—5錢，開水或清茶送下，避風。

〔來源及說明〕此劑是古方。據報載各地采用後療效很好，其中以遼寧麻風病院效果最顯著。

## 一二、赤銀丹

〔主治〕初起結核樣型麻風病。

〔處方〕赤小豆 金銀花 土茯苓各二兩 元參 麦冬 各一兩 丹皮 生人參 沙參各五錢 白芥子 升麻各三錢 白芷 甘草各一錢

〔制法〕共為細末，煉蜜為丸；或用水煎劑亦得。

〔服法及劑量〕飯後每服5—8錢，日服二次，開水送下；煎劑照原方用量減半，每日服1劑，分3—5次服。

## 一三、胡麻油

〔主治〕結核樣型及瘤型麻風病。

〔處方〕胡麻仁五斤

〔制法〕將胡麻仁洗淨榨油，過濾候澄清後再過濾，以純淨為佳。

〔服法及劑量〕將胡麻仁渣炒香，用芭蕉包下吞服，或淨服此渣，日服三次，開水送下，每次約服3—5錢；胡麻油不能口服，因其澀也，可將此油注射，同時兼服其渣。

〔來源及說明〕古方只記載口服，但近人因用其油口服，往往引起瀉下，現用其油注射（深肌肉或靜脈注射，一般用量從3毫升起，可逐步增加至15毫升為度），兼口服其渣，初步

試用有效，故特列出，以便參考研究。

## 一四、大楓子油

〔主治〕 結核样型及瘤型麻風病。

〔处方〕 大楓子

〔制法〕 拣选好的大楓子去壳榨油，提煉純淨后听用（或取藥房已制成的）。

〔用法及服法〕 将大楓子油注射，同时口服大楓子渣或含有大量大楓子制剂之藥丸。服量和注射量均按情况酌量配剂。

〔来源及說明〕 用大楓子治疗本病，在我国元朝时就开始了，至今已有几百年的历史。一般注射大楓子油，最好同时口服大楓子渣，或含有大量大楓子制剂之藥丸，疗效更好。

## 一五、万安五服方

〔主治〕 結核样型及瘤型麻風病。

〔处方〕 1. 北荆芥 北防风 川羌活 汉蒼朮 元參  
銀柴胡 北黃芩 赤芍藥 白鮮皮 川枳壳 金銀花 甘草  
各三錢 水煎服二至四劑。

2. 北細辛二錢 川羌活 川白芷 川芎片 生地 黃芩  
知母 北防风 甘草各三錢 水煎服二至三劑

3. 金銀花 川枳壳 川桃仁 大元參 川大黃 芒硝  
(后下) 川黃連 北黃芩 黃柏各三錢 水煎服二至三劑

4. 白附子 白姜絲(二味均用姜汁蒸) 北荆芥 北防风  
大元參 草烏(四川产者先用童便浸后，再用米汁炒) 白蒺  
藜(炒黃去刺) 川獨活 火麻仁(土炒) 苦參 赤芍藥 黃  
柏 北天麻 金銀花 川枳壳 大楓子 甘草各三錢 水煎  
服四至八劑

5. 大楓子 白蒺藜 胡麻仁各一斤 蕲蛇十二兩 北防  
風十兩 大元參 金銀花 川枳壳 赤芍藥各三兩 白芷  
獨活 制川烏各五錢

〔制法〕 1.—4. 均為煎劑，最後5. 為丸劑。制法先將大楓子去殼去油，蕲蛇去頭尾用酒浸3—5日，以便松化，去骨蒸熟，共余藥全部晒干細研為末，過篩，煉蜜為丸，如梧桐子大。

〔服法及劑量〕 1.—4. 煎劑按照次序服飲，每日一劑，宜空肚服下。1. 方連服2—4劑後，接服2. 方，連服2—3劑後，再接服3. 方，也服2—3劑，最後接服4. 方，連服4—8劑。丸劑每日早午晚三次分服，飯後服，每次4—6錢，開水或淡茶送服。

〔來源及說明〕 此方原載“驗方大全”，試用效驗頗佳。此方如服第1方有效，再服第2方、第3方至第4方，按序服吃，如服煎劑效果大，惡性反應少者，即為適應，可續服第5方丸劑，如偶有小量反應亦無妨，如有大的惡化反應，即應採用其他方劑。

## 一六、蜈 蟚 丸

〔主治〕 結核樣型及瘤型麻風病。

〔處方〕 金頭蜈蚣三十條 蟻酥八分 川大黃 北黃芩  
川黃連 黃柏 皂角刺 乳香 没藥 川木瓜 全蠍蟲 金  
蟬退 赤芍藥 枳壳 怀牛膝 薄荷 鈎藤 防風 白芷各  
五錢 蕲蛇 牛蒡子 浮水萍 炮山甲 金銀花各一兩 人  
中白 琥珀 儿茶 冰片 北天麻各三錢 雄黃 麻黃 北  
細辛各二錢

〔制法〕 共為細末，米糊為丸，如梧桐子大。

〔服法及劑量〕 每日2次，早晚飯後服，每次5—7錢，芭  
蕉肉包下吞服，開水或淡茶送下。

〔來源及說明〕 此方是民間流傳方。方中以蜈蚣、蟾酥

为君，一般只适应于晚期結核样型及瘤型麻风病，对于較輕病症，很不相宜。惟于潰烂性麻风病及梅毒病却很适宜。

### 一七、脾經丸(复方麻风片第一方)

〔主治〕 結核样型麻风病(对高起損瘡最好)。

〔处方〕 汉蒼朮 浮水萍 黃柏 荸豆各十斤 茄根 白蓮叶各五斤 雄黃精三斤 硼砂四斤 朱砂二斤 輕粉六两 大楓子肉二十斤 笠紅根 笠黃根 蒼耳子根(以上三味均是生草藥)各五十斤

〔制法〕 将茄根用酒浸蒸2小时。将大楓子肉磨碎，放在鍋內熬煮，隨熬隨去油，去淨油后，又將生草藥分別熬煮4—6小时，去渣，把生草藥汁混和放入大楓子鍋內同熬煮24—48小时。再將其余藥物研成粉末，過篩，然后将熬好煮成的藥液与藥粉混和調勻，制成丸或片，晒干或燙干即可应用。

〔服法及劑量〕 每天服2—3次，每次1.2—2.0錢，飯后服吃。

〔来源及說明〕 此方經廣東省衛生廳麻風病防治處試用有效后公布發表的。

### 一八、五經丸(复方麻风片第二方)

〔主治〕 瘤型及結核样型麻风病。

〔处方〕 蒼耳子 白鮮皮各十二斤八两 白花蛇十斤八两 胡麻仁 木鱉子各六斤四两 白附子 汉蒼朮 海桐皮 鬚角刺各五斤 川桃仁 白蘂 川木瓜 五加皮 川紅花 制草烏 石南叶 桑寄生 鐘乳石 紅蘇木各三斤二两 二丑 独活各三斤 北天麻 白姜蚕各二斤五两 儿茶 川牛膝各二斤四两 石菖蒲 丁香 升麻 没藥 牙皂 蟬蛻各二斤 全蠍虫 黃柏各一斤四两 归尾一斤 朱砂四两 田

三七一两 大楓子肉二十斤 蒼耳子根 笠黃根 笠紅根  
(以上三味均是生草藥)各一百斤。(注:原方內有三仙丹一斤  
四兩,琥珀、雄黃各一斤,牛黃三兩,珍珠二兩,現已將其除去,  
但療效照常不变。)

[制法] 同脾經丸。

[服法及劑量] 日服2—3次,每次服1.5—2.0錢,均在  
飯后服吃。

[來源及說明] 同上方。

### 一九、勵風丸(復方麻風片第三方)

[主治] 瘤型及結核樣型晚期麻風病。

[处方] 烏梢蛇十二條 白花蛇三兩 蟬退一兩五錢  
北荆芥一兩二錢 全蠍蟲七錢 苦參 北防風 小胡麻 白  
蒺藜 西秦艽 白鮮皮各六錢 白附子 当归 白姜桑 草  
烏 川木瓜 川芎 青礞石 何首烏 牙皂 丹皮 百部  
漢蒼朮 桂枝皮 五加皮 白芷 離鈎藤 威靈仙 蕤絲子  
穿山甲 北天麻 黃柏 川牛膝 桑寄生 千年健 石南叶  
山梔子 肉桂 鑽地風 金銀花 公丁香 知母各三錢 白  
頭翁二錢 川黃連一錢 大楓子肉十二兩 加生草藥: 蒼耳  
子根十斤 笠黃根五斤 笠紅根 錫吊蘭各四斤 佛紅管根  
三斤

[制法] 同脾經丸。

[服法及劑量] 同五經丸。

[來源及說明] 同上方。

### 二〇、防風通經丸(復方麻風片第四方)

[主治] 麻風神經炎(神經痛)。

[处方] 白花蛇一斤 烏梢蛇十二條 川黃連五兩 蒼