

新疆白粉菌志

赵震宇 著

新疆人民出版社

内 容 提 要

《新疆白粉菌志》是一本资料性工具书。内容包括分布于新疆境内的白粉菌10个属、72个种（包括全国广生种50余个），其中有新种1个、新组合2个、全国新纪录28个。寄主范围有46个科、152个属、237个种，其中经济植物131种。每个种都有形态描述，并附有插图。本书是植物病害诊断中主要参考书之一。

本书的读者对象是从事植物保护工作的技术人员、科研人员以及中等农、林学校的老师，大学植物专业、植物保护专业的学生等。

新疆白粉菌志

赵震宇著

*

新疆人民出版社出版

新疆新华书店发行

新疆新华印刷厂印刷

787×1092毫米16开本 9 $\frac{3}{4}$ 印张

1979年1月第1版 1979年8月第1次印刷

印数：1—2,500

统一书号：13098·9 定价：1.04元

前　　言

新疆的白粉菌种类较多，到目前为止，已知有72种。由它所引起的白粉病给农、林、牧业等生产每年造成的损失是很大的。它寄生的范围很广，现在发现有46个科，152个属，237个种（种以下单位未统计）。在这237种植物中，经济植物占131种。如小麦白粉病（*Erysiphe graminis*），全疆分布有30多个县（市）^[52]，为害较重；甜菜白粉病（*Erysiphe betae*）在石河子垦区，1960年发病率达80—100%，发病指数在50%以上，占播种面积的43%；苹果白粉病（*Podosphaera leucotricha*）全疆已知有30个县（市）发生，1959年轮台县发病株率达100%^{[53]、[54]}；桃白粉病（*Sphaerotheca pannosa*）全疆各产桃区都严重^[53]，1973年伊宁市市场上李光桃果实发病率达50%以上。

关于新疆白粉菌的研究，解放前几乎是空白，仅在中国科学院微生物所标本室见到刘慎谔教授1930年采自骆驼蓬（*Peganum harmala L.*）上的鞑靼内丝白粉菌（*Leveillula taurica* (Lev.) Arn.）标本一份。苏联十月社会主义革命前，帝俄曾有许多“科学考察团”来我国新疆采集标本，同时也采了些真菌标本，但未见其文章。新中国成立后的调查多偏重于作物病害。从真菌出发进行考察的只有中国科学院新疆综合考察队，徐连旺同志在南疆采集了不少真菌标本，其中也有些白粉菌，我们仅见其1958年野外总结^[55]。

新疆八一农学院成立之后，我们结合学生实习，巡回指导生产或定点驻场等机会，曾采集了一批经济作物上的白粉菌，这为我们研究白粉菌打下了基础。1965年我曾将当时鉴定结果发表在《新疆植病文集》第二集和《新疆八一农学院学报》第一期上，由于水平低和缺乏资料，鉴定中有许多错误。文化大革命后，在1974年中国科学院召开的“三志”（动物志、植物志、孢子植物志）广州会议精神鼓舞下，这项研究才得以继续下去。

我们在新疆白粉菌研究的过程中，曾得到新疆八一农学院前院长涂治教授的关怀。文化大革命前，涂治教授曾指示我们花点时间研究植物病原真菌；文化大革命后，他曾数次亲听汇报，大力支持把这项研究工作坚持下去。他还打算组织有关单位编写《新疆真菌志》。中国科学院微生物所余永年、郑儒永、韩树金、陈桂清，八一农学院张翰文、黄大文以及贾中和、余俊杰等同志也给我以鼓励与支持。张翰文、贾中和、余俊杰等同志赠给了不少标本，安峥哲、杨昌友、崔乃然、田允温、阴知勤等同志帮助鉴定了部分植物标本，初稿完成后，植物病理教研组的同志们在百忙中抽空审阅，在此一并致谢。

由于作者水平低，又缺乏些相邻地区的资料，书中难免存在错误，希望读者提出宝贵意见。

著　者

1978年8月1日于八一农学院

目 录

白粉菌的形态	1
白粉菌在分类学上的地位	5
新疆白粉菌检索表	8
单囊壳属 (<i>Sphaerotheca</i>)	23
叉丝单囊壳属 (<i>Podosphaera</i>)	46
白粉菌属 (<i>Erysiphe</i>)	52
叉丝壳属 (<i>Microsphaera</i>)	82
长丝壳属 (<i>Trichocladia</i>)	92
双型叉丝壳属 (<i>Medusosphaera</i>)	99
节叉丝壳属 (<i>Arthrocladiella</i>)	101
钩丝壳属 (<i>Uncinula</i>)	103
球针壳属 (<i>Phyllactinia</i>)	108
内丝白粉菌属 (<i>Leveillula</i>)	111

附 录

寄主中名索引	130
寄主拉丁名索引	137
白粉菌中名索引	143
白粉菌拉丁名索引	145

白粉菌的形态

白粉菌科 (*Erysiphaceae*) 是寄生菌，它的形态包括菌丝体、吸器（营养体）、分生孢子梗和分生孢子（无性繁殖器官）、闭囊壳、子囊和子囊孢子（有性繁殖器官）。




图 1 白粉菌形态图

1. 菌丝体；2. 吸器；3. 分生孢子梗及分生孢子；4. 闭囊壳；5. 壳壁细胞；6. 附属丝；7. 子囊；
8. 子囊孢子；9. 寄主细胞横切面示意图

营养体：包括菌丝体和吸器。

菌丝体：大多数是表生在寄主的绿色组织上，以吸器在寄主表皮组织的细胞内吸取养

分。少数几个属（如球针壳属、内丝白粉菌属等）的菌丝体部分是内生的，菌丝体无色，有横隔。

吸器：是白粉菌从寄主内吸取营养物质的器官，它的形状有的是球形（如蓼白粉菌、柳钩丝壳等的吸器），有的呈掌状（如禾白粉菌的吸器）。




图 2 白粉菌吸器形态图

1.蓼白粉菌 (*Erysiphe polygoni*) 的吸器；2.柳钩丝壳 (*Uncinula salicis*) 的吸器；3.禾白粉菌 (*Erysiphe graminis*) 的吸器；4.榛球针壳 (*Phyllactinia corylea*) 的吸器

繁殖体：白粉菌的繁殖器官包括两个阶段，无性繁殖产生分生孢子梗和分生孢子；有性繁殖产生闭囊壳，子囊和子囊孢子。

分生孢子梗和分生孢子：分生孢子梗有单细胞的或多细胞的，多是棒状，垂直生于菌丝上，多数不分叉，在分生孢子梗上单生一个或串生许多椭圆形，圆柱形的分生孢子。无性繁殖由于分生孢子梗的形态、分生孢子数目和着生状态不同而分成六个类型。




图3 分生孢子梗和分生孢子形态图

1. 粉孢型 (*Oidium*)；2. 假粉孢型 (*Pseudoidium*)；3. 真粉孢型 (*Eu-Oidium*)；4. 拟粉孢型 (*Oidiopsis*)；5. 拟小卵孢型 (*Ovulariopsis*)；6. 旋梗型 (*Streptopodium*)

粉孢型 (*Oidium*)：菌丝体着生于寄主组织表面，吸器生长在表皮细胞内，多是球形，分生孢子梗单细胞、棒状，自菌丝上长出来，分生孢子腰鼓形，椭圆形，无色，数个排成链状，如白粉菌属 (*Erysiphe*) 的很多种（图3—1）。

假粉孢型 (*Pseudoidium*)：与粉孢型的不同点是分生孢子只有一个，生在分生孢子梗的顶部，如蓼白粉菌 (*Erysiphe polygoni*)（图3—2）。

真粉孢型 (*Eu-Oidium*)：与粉孢型的不同点是分生孢子梗的基部有一个椭圆形的膨大，吸器掌状，如禾白粉菌 (*Erysiphe graminis*)（图3—3）。

拟粉孢型 (*Oidiopsis*)：分生孢子梗分枝或不分枝，从气孔中长出来，分生孢子单顶生，初生分生孢子往往顶端尖，基部稍细，纺锤形，长椭圆形，脱落之后生次生分生孢子，它是圆柱形，如内丝白粉菌属 (*Leveillula*) 各个种（图3—4）。

拟小卵孢型 (*Ovulariopsis*)：分生孢子梗长，有隔，顶生一个椭圆形或纺锤形的分生孢子，如球针壳属 (*Phyllactinia*) 等（图3—5）。

旋梗型 (Streptopodium)：分生孢子梗基部螺旋状旋转扭曲，其它特征同拟小卵孢型，如多针壳 (Pleochaeta) (图3—6)。

分生孢子内有明显的液胞，液胞中有水分，只有含有液胞的分生孢子才能萌发。此外还有纤维体 (Fibrosine bodies)，它是盘状、新月状或其它形状的颗粒，只有通过透明和染色才能看见。

闭囊壳：是通过性结合后而产生的，幼小时无色或淡黄色，成熟时多是褐色到黑色，球形，无自然孔口，闭囊壳是由一层或两层细胞组成的，外壳细胞一般都明显 (图1—4、5)，在闭囊壳上生有一定形状的附属丝。附属丝的形状很多，常见的如下。




图4 附属丝形态图


1.丝状；2.钩状；3.双叉式分枝状；4. 2—3叉式指梗状；5.6.针状；7.棒状；8.球针状；9.帚状

子囊和子囊孢子：在闭囊壳内含有子囊，子囊内有子囊孢子。闭囊壳里有一定数目的子囊，有1个的，有3个的或许多个的区别，子囊多是广卵圆形，短粗棒形，多数有柄，无孔口。子囊内有子囊孢子，子囊孢子也是有一定数目的，大多是2—8个，最多不超过8个，个别有1个。子囊孢子单细胞，圆形，椭圆形，无色 (图1—7、8)。

白粉菌在分类学上的地位

真菌 (Fungi) 从林奈 (Linnaeus) 到本世纪五十年代的二百多年间，在一级分类上曾有过二界、三界、四界学说，真菌的分类地位也有过变动，但都未确立成单独一界。在其边缘学科中仍用两界学说。自1969年以后，惠特克 (Whittaker) 提出五界学说，他把真菌列为与植物界、动物界平行的独立的一界^[50]。

白粉菌属于真菌界 (Mycota)、真菌门 (Eumycota)、子囊菌亚门 (Ascomycotina)、核菌纲 (Pyrenomycetes)、白粉菌目 (Erysiphales)、白粉菌科 (Erysiphaceae)^[61]。



白粉菌科 (Erysiphaceae) 分属, 根据恩兹韦斯等所著的第六版《真菌学字典》(1971年)
(Ainsworth & Bisby's Dictionary of the fungi 6th.) 中记载有22个属, 现简介如下:

属名	分生孢子	闭囊壳	附属丝	子囊	子囊孢子	备注
节叉丝壳属 <i>Arthrocladiella</i>	<i>Oidium</i>	球形	2—3次双叉式分枝, 直, 指状, 两端膨大	多个	单细胞, 2个	单种属
<i>Astomella</i>	—	球形, 壁双层, 内层透明, 外层成熟时开裂	—	多个	双细胞 8个, 有色	不应属于白粉菌目
<i>Blumeria</i>	<i>Euoidium</i> 分生孢子梗基部球状膨大	扁球形	短, 无色或褐色, 个别分枝	多个	单细胞, 4—8个	模式种即 <i>Erysiphe graminis</i>
<i>Brasilomyces</i>	<i>Oidium</i>	球形	无	3—4个	单细胞, 2—4个	单种属
白粉菌属 <i>Erysiphe</i>	<i>Oidium</i>	球形	丝状	多个	单细胞, 2—8个	
<i>Ischnochaeta</i>	<i>Pseudoidium</i>	球形	丝状, 长	多个	单细胞	3个种
<i>Kokkalera</i>	<i>Oidium</i>	球形	无	1个	单细胞, 8个	单种属
<i>Leucoconis</i>	—	—	—	—	多胞	不应属白粉菌目
内丝白粉菌属 <i>Leveillula</i>	<i>Oidiopsis</i>	扁球形	丝状, 短	多个	单细胞 2个	
<i>Linkomyces</i>	<i>Pseudoidium</i>	球形	不多, 放射状或成束, 有的分叉	多个	单细胞, 2—8个	模式种即 <i>Erysiphe communis</i>
双型叉丝壳属 <i>Medusosphaera</i>	<i>Oidium</i>	球形	两种: ①顶部双叉式分枝, 蛇状; ②直棍棒状	多个	单细胞	单种属

叉丝壳属 <i>Microsphaera</i>	Oidium	球形	双叉式分枝	多个	单细胞	
直针壳属 <i>Orthochaeta</i>	Oidium	球形	直棒状，有一隔	多个	单细胞，2个	
球针壳属 <i>Phyllactinia</i>	Ovulariopsis	球形	两种：①球针状生于赤道带；②帚状生于顶部	多个	单细胞	
多针壳属 <i>Pleochaeta</i>	Streptopodium	球形	多，针状	多个	单细胞	
叉丝单囊壳属 <i>Podosphaera</i>	Oidium	球形	双叉式分枝，梗直	1个	单细胞	
Queirozia	—	扁球形	粗细不同分两种：①粗者顶端稍弯成钩；②细者顶端不规则分枝	多个	单细胞，2个	
无丝三囊壳属 <i>Salmonia</i>	—	球形	无	3个	单细胞，5个	单种属
单囊壳属 <i>Sphaerotheca</i>	Oidium	球形	丝状	1个	单细胞	
Toroa	—	桃形	无	多个，有侧丝	三胞，4个	不应属于白粉菌目
长丝壳属 <i>Trichocladia</i>	—	球形	很长，顶部双叉式分枝	多个	单细胞	
棒丝壳属 <i>Typhulochaeta</i>	—	球形	短棒状，无隔，无色，生于闭囊壳顶部	多个	单细胞	
钩丝壳属 <i>Uncinula</i>	Oidium	球形	顶端钩状	多个	单细胞	
Xenomyxa	—	—	—	少，粘成块	单细胞，8个	单种属

新疆白粉菌科分属检索表

1. 菌丝体部分内生或气孔腔生 2
- 1' 菌丝体全部外生 3
2. 菌丝体部分生体内，分生孢子梗成束从气孔伸出，分生孢子单项
生，子囊多个，附属丝丝状 内丝白粉菌属 (*Leveillula*)
- 2' 菌丝体生在体表或气孔腔中，子囊多个，附属丝球针状和帚状
..... 球针壳属 (*Phyllactinia*)
3. 闭囊壳内只有一个子囊 4
- 3' 闭囊壳内子囊数在二个以上 5
4. 附属丝丝状 单囊壳属 (*Sphaerotheca*)
- 4' 附属丝直，顶端双叉式分枝 叉丝单囊壳属 (*Podosphaera*)
5. 附属丝顶端双叉式分枝 6
- 5' 附属丝为其它形状 8
6. 附属丝有两种，一种生赤道带，波浪状，顶端双叉式分枝，另一种
棒状 双型叉丝壳属 (*Medusosphaera*)
- 6' 附属丝不是波浪状 7
7. 附属丝短，直 叉丝壳属 (*Microsphaera*)
- 7' 附属丝长，柔软 长丝壳属 (*Trichocladia*)
8. 附属丝顶端二或三叉式分枝，分枝指状，有的有节
..... 节叉丝壳属 (*Arthrocladiella*)
- 8' 附属丝其它形状 9
9. 附属丝钩状 钩丝壳属 (*Uncinula*)
- 9' 附属丝丝状 白粉菌属 (*Erysiphe*)

新疆白粉菌检索表

- 1 为害单子叶植物 (*Monocotyledones*) 2
- 1' 为害双子叶植物 (*Dicotyledones*) 6
- 2 为害小麦属 (*Triticum*) 各种，菌落灰白色，菌丝体厚，分生孢子 *Oidium* 型，分
生孢子梗基部膨大成球形，闭囊壳内子囊多个，子囊孢子在小麦生长期未成
熟 禾白粉菌 (*Erysiphe graminis*) *
- 2' 为害其它植物 3
- 3 为害黑麦属 (*Secale*) 各种，菌落白色，菌丝体较疏松，其它特征同上
..... 禾白粉菌 (*Erysiphe graminis*)
- 3' 为害其它植物 4

* 1958年高洛文 (Головин) 将此种定为一新属新种 *Blumeria graminis* Golov.

4 为害早熟禾属 (Poa) 各种, 菌落白色, 疏松, 其它特征同上	
.....	禾白粉菌 (<i>Erysiphe graminis</i>)
4' 为害其它植物	5
5 为害雀麦属 (Bromus) 各种, 菌落白, 疏松, 特征同上	
.....	禾白粉菌 (<i>Erysiphe graminis</i>)
6 为害小檗科 (Berberidaceae)	
小檗属 (Berberis) 植物, 生叶两面和嫩枝上, 菌落始白色, 后消失, 闭囊壳散生, 少数群生, 子囊多个, 附属丝双叉式分枝	
.....	小檗叉丝壳 (<i>Microsphaera berberidis</i>)
6' 为害其它科的植物	7
7 为害毛茛科 (Ranunculaceae) 植物	8
7' 为害其它科植物	15
8 为害唐松草属 (Thalictrum) 植物, 菌落生叶两面、叶柄、茎、果实上, 菌丝体稀疏, 闭囊壳生叶上, 散生, 生茎、叶柄、果实上, 往往群生, 子囊多个, 附属丝丝状	
.....	耧斗菜白粉菌 (<i>Erysiphe aquilegiae</i>)
8' 为害其它属植物	9
9 为害翠雀属 (Delphinium) 植物, 菌落生叶两面和茎上, 菌丝体稀疏, 消失, 闭囊壳散生, 子囊多个, 附属丝丝状	耧斗菜白粉菌 (<i>Erysiphe aquilegiae</i>)
9' 为害翠雀属植物, 症状不同	10
10 为害翠雀属植物, 菌丝体厚, 毡状, 闭囊壳埋生	
.....	毛茛内丝白粉菌 (<i>Leveillula ranunculacearum</i>)
10' 为害其它属植物	11
11 为害银莲花属 (Anemone) 植物, 菌落生叶、叶柄和茎上, 闭囊壳散生, 附属丝长, 子囊多个	耧斗菜白粉菌 (<i>Erysiphe aquilegiae</i>)
11' 为害其它属植物	12
12 为害毛茛属 (Ranunculus) 植物, 菌落生叶、叶柄和茎上, 菌丝体消失, 闭囊壳散生, 子囊多个, 附属丝丝状	
.....	耧斗菜白粉菌 (<i>Erysiphe aquilegiae</i>)
12' 为害其它属植物	13
13 为害铁线莲属 (Clematis) 植物, 菌丝体厚, 毡状, 闭囊壳埋生	
.....	毛茛内丝白粉菌 (<i>Leveillula ranunculacearum</i>)
13' 为害其它属植物	14
14 为害乌头属 (Aconitum) 植物, 菌落生茎下部, 茎叶交叉处, 菌丝体消失, 闭囊壳群生, 子囊多个, 附属丝丝状	
.....	耧斗菜白粉菌 (<i>Erysiphe aquilegiae</i>)
15 为害景天科 (Crassulaceae) 植物, 菌落生叶、茎上, 菌丝体稀疏, 消失, 子囊多个, 附属丝两两分叉	景天叉丝壳 (<i>Microsphaera umbilici</i>)
15' 为害其它科植物	16
16 为害蔷薇科 (Rosaceae) 植物	17

16' 为害其它科植物	34
17 为害山楂属 (<i>Crataegus</i>) 植物, 菌落始白斑, 稀疏, 后扩散开, 易消失, 子囊多个, 附属丝两种, 一种球针状, 另一种生闭囊壳顶部, 扫帚状	
..... 山楂球针壳 (<i>Phyllactinia mespili</i>)	
18 为害花楸属 (<i>Sorbus</i>) 植物, 菌落生叶两面、叶柄上, 菌丝体消失, 闭囊壳群 生或散生, 子囊一个, 附属丝两两分叉	
..... 花楸叉丝单囊壳 (<i>Podosphaera aucupariae</i>)	
18' 为害其它属植物	19
19 为害苹果属 (<i>Malus</i>) 植物, 菌落生叶、叶柄、嫩枝上, 叶变戟形, 向上, 闭囊壳簇 生成块状。子囊一个, 附属丝簇生顶部, 直线状, 少数顶部两分叉	
..... 白叉丝单囊壳 (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	
19' 为害其它属植物	20
20 为害梨属 (<i>Pyrus</i>) 植物, 菌落生叶上, 白粉长满叶, 稀疏, 闭囊壳小, 散生, 子 囊一个, 附属丝顶簇生	
..... 白叉丝单囊壳 (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	
20' 为害其它属植物	21
21 为害蔷薇属 (<i>Rosa</i>) 植物, 菌落生叶两面, 菌丝体消失, 附属丝两种, 一种大, 蛇状, 顶部两两分叉, 一种小, 直棍状	
..... 蔷薇双型叉丝壳 (<i>Medusosphaera rosae</i>)	
21' 为害蔷薇属 (<i>Rosa</i>) 植物, 症状与上述不同	22
22 为害蔷薇属 (<i>Rosa</i>) 植物, 菌落生叶、叶柄、嫩枝上, 菌丝体厚, 灰白色, 疣状	
..... 蔷薇单囊壳 (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	
22' 为害其它属植物	23
23 为害金老梅属 (<i>Dasiphora</i>) 植物, 菌落生叶、叶柄、花梗、花萼、茎上, 菌丝体消 失, 闭囊壳散生, 子囊一个	
..... 斗蓬单囊壳 (<i>Sphaerotheca alchemillae</i>)	
23' 为害其它属植物	24
24 为害萎陵菜属 (<i>Potentilla</i>) 植物, 菌落生叶两面和茎上, 菌丝体消失, 闭囊壳 群生或散生, 子囊一个, 附属丝长	
..... 斗蓬单囊壳 (<i>Sphaerotheca alchemillae</i>)	
24' 为害其它属植物	25
25 为害龙芽草属 (<i>Agrimonia</i>) 植物, 症状同上	
..... 斗蓬单囊壳 (<i>Sphaerotheca alchemillae</i>)	
25' 为害其它属植物	26
26 为害杏属 (<i>Armeniaca</i>) 植物, 菌落生叶上, 菌丝体稀疏, 白粉状	
..... 白叉丝单囊壳 (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	
26' 为害其它属植物	27
27 为害樱桃属 (<i>Cerasus</i>) 植物, 菌落生叶上, 菌丝体稀疏, 白粉状	
..... 白叉丝单囊壳 (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	
27' 为害其它属植物	28

28 为害桃属 (<i>Amygdalus</i>) 植物, 菌落生叶、叶柄、嫩枝上, 菌丝体厚, 毡状, 白色或灰白色, 埋生闭囊壳, 有子囊一个, 附属丝短	蔷薇单囊壳 (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)
28' 为害其它属植物	29
29 为害稠李 (<i>Padus</i>) 植物, 菌落生叶、叶柄上, 消失, 闭囊壳稀疏, 有一个子囊 附属丝顶簇: 顶部两两分叉	三指叉丝单囊壳 (<i>Podosphaera tridactyla</i>)
29' 为害其它属植物	30
30 为害斗蓬草属 (<i>Alchimilla</i>) 植物, 菌落生叶两面、叶柄、花柄和花萼上, 菌丝体消失, 闭囊壳群生, 子囊一个, 附属丝丝状	斗蓬单囊壳 (<i>Sphaerotheca alchemillae</i>)
30' 为害其它属植物	31
31 为害水杨梅属 (<i>Geum</i>) 植物, 菌落生叶两面, 菌丝体消失, 闭囊壳群生, 子囊一个, 附属丝丝状	斗蓬单囊壳 (<i>Sphaerotheca alchemillae</i>)
31' 为害其它属植物	32
32 为害地榆属 (<i>Sanguisorba</i>) 植物, 菌落生叶、叶柄和茎上, 菌丝体消失, 闭囊壳密, 群生, 极少是散生, 子囊一个, 附属丝丝状, 全褐色	铁锈色单囊壳 (<i>Sphaerotheca ferruginea</i>)
32' 为害其它属植物	33
33 为害合叶子属 (<i>Filipendula</i>) 植物, 菌落生叶、叶柄、茎上, 形成斑块中央褐色, 边缘白色, 菌落处膨大, 弯曲	铁锈色单囊壳 (<i>Sphaerotheca ferruginea</i>)
34 为害豆科 (Leguminosae) 植物	35
34' 为害其它科植物	54
35 为害骆驼刺属 (<i>Alhagi</i>) 植物, 菌落生叶两面, 白粉层稀疏, 消失, 散生闭囊壳, 子囊多个, 附属丝丝状	豌豆白粉菌 (<i>Erysiphe pisi</i>)
35' 为害骆驼刺, 症状不同	36
36 为害骆驼刺属 (<i>Alhagi</i>) 植物, 菌落生叶两面, 厚, 毡状, 埋生闭囊壳	豆科内丝白粉菌 (<i>Leveillula leguminosarum</i>)
36' 为害骆驼刺, 症状与上述不同	37
37 为害骆驼刺属 (<i>Alhagi</i>) 植物, 被螨类为害的叶、果实变成长条状, 菌落生在变形的叶、果、枝上, 散生闭囊壳	鱼鳔槐长丝壳 (<i>Trichocladia coluteae</i>)
37' 为害骆驼刺属 (<i>Alhagi</i>) 植物, 症状与上述不同	38
38 为害骆驼刺属 (<i>Alhagi</i>) 植物, 菌丝体消失, 闭囊壳散生, 附属丝丝状, 子囊多个	豌豆白粉菌 (<i>Erysiphe pisi</i>)
38' 为害其它植物	39
39 为害葫芦巴属 (<i>Trigonella</i>) 植物, 菌落生叶两面和茎上, 消失或留存, 闭囊壳散生, 子囊多个, 附属丝丝状	豌豆白粉菌 (<i>Erysiphe pisi</i>)
39' 为害其它属植物	40
40 为害草木樨属 (<i>Melilotus</i>) 植物, 菌落生叶两面, 菌丝体白粉状留存, 闭囊壳散生, 子囊多个, 附属丝丝状	豌豆白粉菌 (<i>Erysiphe pisi</i>)

40' 为害其它属植物	41
41 为害苜蓿属 (<i>Medicago</i>) 植物, 菌落生叶两面, 白粉层稀疏, 闭囊壳散生, 子囊多个, 附属丝丝状	豌豆白粉菌 (<i>Erysiphe pisi</i>)
41' 为害苜蓿属植物, 症状与上述不同	42
42 为害苜蓿属 (<i>Medicago</i>) 植物, 菌丝体很厚, 毡状, 闭囊壳埋生豆科内丝白粉菌 (<i>Leveillula leguminosarum</i>)	
42' 为害其它属植物	43
43 为害车轴草属 (<i>Trifolium</i>) 植物, 菌落生叶两面、叶柄和花梗上, 白粉状, 闭囊壳 散生, 子囊多个, 附属丝丝状	豌豆白粉菌 (<i>Erysiphe pisi</i>)
43' 为害其它属植物	44
44 为害豌豆属 (<i>Pisum</i>) 植物, 菌落生叶两面、叶柄上, 白粉状, 闭囊壳散生, 子囊多个, 附属丝丝状	豌豆白粉菌 (<i>Erysiphe pisi</i>)
44' 为害其它属植物	45
45 为害黄耆属 (<i>Astragalus</i>) 植物, 菌落生叶两面, 留存, 闭囊壳散生, 子囊多个, 附 属丝丝状	豌豆白粉菌 (<i>Erysiphe pisi</i>)
45' 为害黄耆属 (<i>Astragalus</i>) 植物, 症状与上述不同	46
46 为害黄耆属 (<i>Astragalus</i>) 植物, 菌落生叶两面, 菌丝体厚, 毡状, 闭囊壳埋生豆科内丝白粉菌 (<i>Leveillula leguminosarum</i>)	
46' 为害其它属植物	47
47 为害苦豆子属 (<i>Goebelia</i>) 植物, 菌落生叶两面, 菌丝体厚, 毡状, 闭囊壳埋生豆科内丝白粉菌 (<i>Leveillula leguminosarum</i>)	
47' 为害苦豆子属 (<i>Goebelia</i>) 植物, 症状与上述不同	48
48 为害苦豆子属 (<i>Goebelia</i>) 植物, 病菌只生在叶、果因螨类为害变成线形的部 位, 闭囊壳散生	鱼鳔槐长丝壳 (<i>Trichocladia coluteae</i>)
48' 为害其它属植物	49
49 为害苦马豆属 (<i>Swainsonia</i>) 植物, 菌落生叶两面, 消失, 闭囊壳散生, 子囊多个, 附属丝丝状	豌豆白粉菌 (<i>Erysiphe pisi</i>)
49' 为害其它属植物	50
50 为害岩黄耆属 (<i>Hedysarum</i>) 植物, 菌落生茎上, 菌丝体消失, 闭囊壳群生, 附 属丝长, 顶部双叉式分枝	弥散长丝壳 (<i>Trichocladia diffusa</i>)
50' 为害其它属植物	51
51 为害棘豆属 (<i>Oxytropis</i>) 植物, 菌落生叶两面, 菌丝体消失, 闭囊壳散生, 附属丝 长, 顶部双叉式分枝	黄耆长丝壳 (<i>Trichocladia astragali</i>)
51' 为害其它植物	52
52 为害芒柄花属 (<i>Ononis</i>) 植物, 闭囊壳散生, 附属丝丝状, 子囊多个豌豆白粉菌 (<i>Erysiphe pisi</i>)	
52' 为害其它植物	53
53 为害香豌豆属 (<i>Lathyrus</i>) 植物, 附属丝丝状, 子囊多个豌豆白粉菌 (<i>Erysiphe pisi</i>)	

53' 为害其它植物.....	54
54 为害牻牛儿苗科 (Geraniaceae) 老鹳草属 (Geranium) 植物, 菌落生叶和茎上, 菌丝体留存, 闭囊壳散生, 子囊一个, 附属丝丝状老鹳草单囊壳 (<i>Sphaerotheca fugax</i>)	
54' 为害其它科植物.....	55
55 为害亚麻科 (Linaceae) 亚麻属 (Linum)	
子囊一个.....亚麻单囊壳 (<i>Sphaerotheca lini</i>)	
子囊多个.....亚麻内丝白粉菌 (<i>Leveillula linacearum</i>)	
55' 为害其它科植物.....	56
56 为害旱金莲科 (Tropaeolaceae) 旱金莲属 (<i>Tropaeolum</i>) 植物, 菌落生叶两面 和茎上, 菌丝体厚, 污白色, 闭囊壳埋生旱金莲内丝白粉菌 (<i>Leveillula tropaeoli</i>)	
56' 为害其它科植物.....	57
57 为害凤仙花科 (Balsaminaceae) 凤仙花属 (<i>Impatiens</i>) 植物, 菌落生叶两面, 菌丝 体厚, 污白色, 毡状, 闭囊壳埋生风仙花内丝白粉菌 (<i>Leveillula balsaminacearum</i>)	
57' 为害其它科植物.....	58
58 为害蒺藜科 (Zygophyllaceae) 植物.....	59
58' 为害其它科植物.....	61
59 为害泡泡刺属 (<i>Nitraria</i>) 植物, 菌落生叶两面, 菌丝体厚, 毡状, 污白色, 闭囊壳 埋生.....鞑靼内丝白粉菌 (<i>Leveillula taurica</i>)	
59' 为害其它植物.....	60
60 为害骆驼蓬属 (<i>Peganum</i>) 植物, 菌落生叶、嫩茎上, 菌丝体厚, 毡状, 白色, 闭囊壳埋生.....鞑靼内丝白粉菌 (<i>Leveillula taurica</i>)	
61 为害大戟科 (Euphorbiaceae) 大戟属 (<i>Euphorbia</i>) 植物, 菌落生叶、叶柄、嫩枝上, 菌丝体厚, 浅褐色, 边缘白色, 闭囊壳埋生于菌丝体中, 子囊一个大戟单囊壳 (<i>Sphaerotheca euphorbiae</i>)	
61' 为害其它科植物.....	62
62 为害鼠李科 (Rhamnaceae) 鼠李属 (<i>Rhamnus</i>) 植物, 菌落生叶两面, 菌丝体 稀疏, 闭囊壳散生, 子囊多个, 附属丝顶部两分叉弗里斯叉丝壳 (<i>Microsphaera friesii</i>)	
62' 为害其它科植物.....	63
63 为害葡萄科 (Vitaceae) 葡萄属 (<i>Vitis</i>) 植物, 菌落生于叶两面、叶柄、枝条、卷须 和果实上, 果实开裂, 菌丝体白粉状, 闭囊壳群生, 子囊多个, 附属丝钩状葡萄钩丝壳 (<i>Uncinula necator</i>)	
63' 为害其它科植物.....	64
64 为害伞形科 (Umbelliforae) 植物.....	65
64' 为害其它科植物.....	68
65 为害胡萝卜属 (<i>Daucus</i>) 植物, 菌落生叶两面和茎上, 菌丝体消失, 闭囊壳散生或稍	