

福州市民間藥草

第一冊

福州市科學研究所

1959年10月1日

目 录

仙 茅	<i>Curculigo ensifolia</i> R. Br.	(2)
鋪地蜈蚣	<i>Lycopodium cernuum</i> Linn.	(4)
葎 草	<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.	(6)
鬼 鍼	<i>Biden pilosa</i> Linn.	(8)
苦 茄	<i>Solanum dulcamara</i> Linn.	(10)
鉄 莧 菜	<i>Acalypha australis</i> Linn.	(12)
勾 儿 茶	<i>Berchemia racemosa</i> Sieb & Zucc.	(16)
馬 蹄 金	<i>Dichondra repens</i> Forst (<i>D. evululaceae</i> (L.f.) Britt)	(18)
野 棉 花	<i>Urena lobata</i> Linn.	(22)
積 雪 草	<i>Centella asiatica</i> (Linn) Urb.	(26)
長叶冻綠	<i>Rhamnus crenatus</i> Sieb. & Zucc. (<i>Frangula crenata</i> Miq)	(30)
滿 地 菊	<i>Wedelia prostrata</i> Hemsl.	(32)
蛇 莓	<i>Duchesnea indica</i> Andrews (Focke)	(36)
土 人 參	<i>Talinum crassifolium</i> Willd.	(38)
牌 錢 樹	<i>Desmodium pulchellum</i> (L.) Benth. (<i>Hedysarum pulchellum</i> L. <i>Phyllodium</i>)	(40)
金 銀 茄	<i>Solanum xanthocarpum</i> Schradet Wendl.	(42)
蒲 公 英	<i>Taraxacum mongolicum</i> Hand-Mazt	(44)
海 金 砂	<i>Lygodium japonicum</i> (Thumb) Sw. (<i>Ophioglossum japonicum</i> Thumb)	(46)
天 冬	<i>Asparagus cochinchinesis</i> (Lour.) Merr.	(48)
山 荷 叶	<i>Diphyllia grayi</i> Fr. Schm. (<i>Diphyllia cymosa</i> Michx. Var <i>Grayi</i> Maxim.)	(50)
馬 齒 莧	<i>Portulaca oleracea</i> Linn.	(52)
射 干	<i>Belamcanda chinensis</i> (Linn.) Dc.	(54)
爵 床	<i>Justicia procumbens</i> Linn.	(56)
鱧 腸	<i>Eclipta prostrata</i> Linn.	(60)
馬 鞭 草	<i>Verbena officinalis</i> Linn.	(62)
水 蜈 蚣	<i>Kyllinga brevifolia</i> Rottb.	(66)
一 点 紅	<i>Emilia sonchifolia</i> DC.	(68)
秋 葵	<i>Abelmoschus manibot</i> (Linn) Medic. (<i>Hibiscus manibot</i> Linn.)	(70)
龍 芽 草	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb.	(72)
毛 大 丁 草	<i>Gerbera piloselloides</i> Cass.	(74)
茜 草	<i>Rubia cordifolia</i> Linn.	(76)
蚊 母 草	<i>Veronica pergrina</i> Linn.	(78)
鹽 膚 木	<i>Rhus chinensis</i> Mill.	(80)
白 叶 野 桐	<i>Mallotus apelta</i> (Lour.) Muell-Arg.	(82)
白 蕨	<i>Ampelopsis japonica</i> (Thumb) Makino.	(84)
仙 人 拳	<i>Echinopsis multiflex</i> (pfeiff) Zucc.	(86)
石 草	<i>Pyrrosia lingua</i> (Thumb) Farw. (<i>pyrrosia chinensis</i> mirbel)	(88)
翻 白 草	<i>Potentilla discolor</i> Bunge.	(90)
蕺 菜	<i>Houttuynia cordata</i> Thumb.	(92)
壯 荆	<i>Uitex cannabifolia</i> Sieb et Zucc.	(94)
高 良 薑	<i>Alpina kumatake</i> Makino (<i>A. chinensis</i> Rosco)	(96)
商 陸	<i>Phytolacca esculenta</i> Van Houtt.	(98)
貫 叶 蓼	<i>Polygonum perfoliatum</i> Linn.	(100)
破 銅 錢	<i>Hydrocotyle sibthoroides</i> Lamark.	(102)
車 前 草	<i>Plantago asiatica</i> Linn.	(104)
銀 錢 草	<i>Chloranthus japonicus</i> Sieb.	(106)
龍 葵	<i>Solanum nigrum</i> Linn.	(108)
酢 漿 草	<i>Oxalis corniculata</i> Linn.	(110)
酸 漿	<i>Physalis al. elengi</i> Linn (<i>Physalis glabripes</i> Po ark)	(112)
何 首 烏	<i>Polygonum multiflorum</i> Thumb.	(114)

仙 茅

Curculigo ensifolia R. Br.

〔异名〕：天棕，山棕（福州、漳州、同安）盘棕（平和）山兰花（漳州）土白芍，蛹梭葛，平肝薯，棕批仔（以上福州）独茅，茅瓜子，婆罗門参，乳洋，河輪勒陀（梵音）

〔科属〕：石蒜科 AMARYLLIDACEAE

仙 茅 屬 *Curculigo* Gaertn.

〔形态〕：是多年生草本植物，苗高尺許，至冬尽枯，春初生叶，春如茅而軟，葉腹略闊，面有纵紋，状似初生棕櫚，故称天棕，多生于山上溪澗潭边，半黃土处，二三月間开黃花，如梔子，花不結实，其根独莖而直，大如小指，下有短細肉相附，状如白芍，故称土白芍，外皮稍粗呈褐色，內肉黃白色，如薯类，又称平安薯，二八月采集晒干供药用。

〔产地〕：本市市郊鼓山、旗山，喜生于溪澗潭边。

〔药用部分〕：全株或根部。

〔性味〕：味辛苦而甘，性微温有小毒。

〔功用〕：平木清金，化痰潤燥，主治小儿肝火上炎，风痰气喘，肺癰咳血，骨蒸童癆，是入手足厥阴經及手太阴經之药。

〔主治及用法〕：

1. 童癆骨蒸：用天棕七株，冰糖少許，开水冲炖服。（福州市仓山区草药医王春惠报告7例有显效）。

2. 小儿痼风：天棕二两，冰糖一两，开水冲炖服。

3. 风痰气喘：天棕三两，冬瓜糖五錢，开水冲炖服。

4. 肺癰吐膿：天棕三两，冬蜜一两，开水冲炖服。

5. 肺癆咳血：天棕三两至五两，冰糖一两，开水炖服。可連續服用，无副作用。

附方：咳嗽出血：天棕切片四两，瘦肉四两，白菊花鮮一两，干五錢，冰糖一两，开水冲炖服。

6. 膀胱炎、尿道炎：用天棕根一两加冰糖少許炖服。

7. 吐血，下血，血崩及习惯性鼻衄：用棕衣及根莖一至二两，炖猪鼻服或将棕燒灰冲酒服。

8. 打伤：用天棕一錢水四两煎八分加冰糖二两，分三次服。

9. 頸淋巴結核：天棕一两，面根草一两炖番薯燒飯后服。

10. 淋巴結發炎：天棕七株，独脚蓮一两，全蠍虫五头，冰糖五錢，开水冲炖服，連服二至七周。

11. 蛇咬：用天棕同半边蓮搗烂貼患处。



1. 仙茅 *Curculigo ensitolia* R.Br.

鋪地蜈蚣

Lycopodium cernum Linn

〔别名〕：土木佳，土珊瑚，过山龙，筋骨草、水杉（日）

〔科属〕：石松科LYCOPODIACEAE

石 松 屬 *Lycopodium* Linn.

〔形态〕：陆生于强酸性土壤上，蕨类植物，茎条初为横走，后渐直立，直立部分高30—50厘米，或更长，侧枝多全株呈圆锥形，主枝带木质软骨样直立，径5厘米以上，叶螺旋排列，线状，钻形弯曲而向上，先端锐尖全缘呈淡绿色，根较少，呈白色鬚状，其外观颇秀丽，故有土珊瑚之称，孢子囊穗多数，自侧枝下垂，孢子叶与营养叶异彩，呈淡黄白色，三角形渐尖，边缘呈流苏状，孢子囊亚球形其二瓣不等。

〔产地〕：福州市郊山上，喜生于森林下阴湿石上。

〔药用部分〕：全株。


〔性味〕：苦辛微涩无毒。

〔功用〕：祛风，清暑，能发微汗，利尿，杀蛔虫，入足厥阴手太阴二经。

〔主治及用法〕：1. 蛔虫病：土木佳一两五钱至三两，冬瓜糖五钱开水炖服。

附方：土木佳五钱至一两，使君子十枚，苦楝根五钱至一两，（福州市人民医院治疗20例都有效，有效率达100%）。

2. 祛风清暑：鲜土木佳二两，红糖一两，开水炖分早晚服，服后有微汗。



2. 鋪地蜈蚣 (*Lycopodium*) *cernum* Linn.

葎 草

Humulus scandens (Lour) Merr.

〔异名〕：勒草，葛葎蔓，来莓草，葛勒子，割人藤，拉拉藤，（浙江）猪娘藤（浙江天台），有刺五叶藤，領扣刺（福州）。

〔科別〕：大麻科CANNABINACEAE

葎 草 屬 *Humulus* Linn

〔形态〕：多年生蔓性草本植物，莖长达数丈，纏繞他物生长，莖和叶柄均具倒生皮刺，作攀登之用，叶通常对生，但上部叶互生，叶片圓形呈掌状五裂或七裂，間或三裂，边缘呈粗锯齿，两面均具刺毛，叶柄細长，花单性，雌雄异株，雄花小，着生在圓錐形总状花序上，雌花和苞片結成圓形穗状花序，苞片卵状披針形具有白刺毛及黃色点，瘦果淡黃色扁圓形如黃麻子，7—8月間开花。

〔产地〕：喜生于野荒地，道旁或籬落間甚多。

〔药用部分〕：莖、叶、花及果均作药用。

〔性味〕甘：苦，寒、无毒，气清香。

〔功用〕：主瘀血，止精，益盛气，主五淋，利小便，止水痢，除疟虛热渴，治伤寒汗后虛热，疗久痢，疥癩，潤三焦，消五谷，益五脏，除九虫，辟瘟疫，傳蛇蝎伤。

〔主治及用法〕：

1.肺結核急性进行性发热：鮮葎草花球2—3两，干的3—6錢，煎服每日一次（叶心銘医师治五例效果甚佳）。

2.骨蒸童癆：采鮮葎草八两搗汁去渣冲冷开水一杯冷飲（或炖服）每日一、二次（福州市人民医院李楚鑾医师治一例疗效好）。

3.痢疾：鮮：草2—4两，干1—2两煎服。

附方：葎草五錢，馬齿莧五錢，野麻仔五錢，鬼針五錢，凤尾草五錢，金石榴（小銀台）五錢，同煎服（福州市防疫站）。

4.急性风湿性关节炎：葎草莖及叶搗烂加冬蜜敷患部关节部每日一、二次，敷后皮肤觉刺痒，皮肤生药性疹时不必停药，此为見效之反应。

5.急性肾炎及腎盂炎：于春末至冬初时采鮮葎草莖及叶用水洗淨后切碎搗烂，混以盐滷，（5—8%）反复搗烂使成泥状保存于瓦鉢或瓷缸中可历久不坏备用，用时取已制便之葎草泥8—10克放于酒杯或小碟內，复置于前脑，額发穴（須剃去头髮），用綳带固定三天后弃去，另換葎草泥8—10克置于腹部鳩尾穴，用綳带固定，又三天后再換葎草泥8—10克移置于臍下中极曲骨穴，用綳带固定之，又历三天共九天为一疗程，可反复二、三疗程。

（杭州铁路医院治愈8例，浙江中医1959年31期）。


6.寒結：葎草搗烂和糟同杵貼患部。

7.霍乱：葎草二两煎紅糖服。

8.阴疽：葎草莖及叶同糟、紅糖杵烂貼患部。

9.腸癰：葎草四两煎服。

10.阴腿：葎草二两加番薯燒半斤炖服，渣貼患部。



3. 葎草 *Humulus scandens* (Lour) Merr.

鬼 鍼

Biden pilosa Linn

〔异名〕：鬼針，鬼釵，黃花草，老鴉草，鬼黃花，盲腸草（閩南），旌檀草（閩南），金絲苦令（閩南），跳虱草（閩南），烛台草（閩南），龟仔目瞷草（廈門），瘡媒刺，針刺草，黃花老鴉草。

〔科属〕：菊科 COMPOSITAE

鬼 鍼 草 屬 *Biden* Linn

〔形态〕：一年生草本植物，莖高2—3尺，直立呈四棱形，叶中部对生，上部对生或互生，通常三深裂或羽状分裂，裂片边缘具锯齿，两侧裂片卵圆形，先端尖基部狭窄成短柄，春末夏初各枝梢着头状花序，舌状花冠花心黄花，瓣白色五片，结瘦果略扁具四棱，頂上有刺毛，四五条作釵脚，因之著人衣如針故名，北人謂之鬼針，南人謂之鬼釵，可附着他物而散播远方。

〔产地〕：生长于本市各路边荒野及墙頂。

〔药用部分〕：全株。

〔性味〕：苦平，无毒。

〔功用〕：解毒，利尿，消暑，消炎，治赤血痢，去蜘蛛蛇蠍伤。

〔主治及用法〕：

1. 腸癰（即盲腸炎）鮮鬼鍼2—4两，水二碗煎成一碗服，日服一二次，亦可加冰糖或蜂蜜同。

据廈門市中医院治疗35例，痊愈率达93.4%。

据福州市人民医院治疗6例亦全有效。

附方：在疼痛剧烈者可用鬼鍼四两，元胡索二錢、金鈴子三錢甚为見效。

2. 痢疾：鮮鬼鍼二两或干鬼鍼一两，赤痢加白糖少許，白痢加紅糖少許炖服，每日一、二次，連服三至五天。

附方：預防痢疾帶菌者；馬齒莧五錢、野麻草五錢、鬼鍼五錢、凤尾草五錢、金石榴五錢、馬鞭草五錢（試用于痢疾帶菌者148例，五天后有144例轉阴性）。

3. 中暑腹痛吐瀉：鮮鬼鍼一两搗汁入盐少許內服。

4. 糖尿病下消：每次三錢至一两清水煎服。

（廈門市中医研究所应用5例，疗效70%以上）。

5. 小儿水肿：取鮮鬼針搗汁約半小碗煎鸡蛋一粒服，日服一次。

6. 小儿疳积：取鮮鬼針半两至一两洗淨，水适量炖鸡肝服之。

7. 手足风无力：用根二两同鱘魚炖服。

8. 蛇咬伤：鮮鬼針1—2两和天青菜半两洗淨同搗烂取汁冲酒服。

9. 附方“抗癆合剂”：治結核性膿瘍（骨癆）兼治慢性鼻粘膜炎，初期頸淋巴結核。

鬼針草二錢、鵝不食草二錢、定經草（双头鎮）二錢、虫草二錢、地耳草二錢

用法：煎水分三次一日服，服八天为一疗程，停葯二天后再服第二疗程。如未愈再停葯二天，再服第三疗程。

禁忌：在治疗期中禁食猪油及肥猪肉。

（莆田县黄石人民医院陈德基献方，并治愈二十余例）。



4. 鬼鉞 *Biden pilosa* Linn.

苦 茄

Solanum dulcamara Linn.

〔异名〕：蜀羊泉、白毛藤(福州、长乐)、千年不爛心、天泡草、天拋子、毛和尚草、金錢絲毛龜(長乐、福州)、綠毛龜(連江)、金錢絲毛根(福州)、金錢草、葫蘆草(莆田)、胡毛藤(福安、屏南)、鈴仔草(漳平)、毛燕子(松溪、霞浦、上杭)、毛毛藤(邵武)、毛老人、毛葫蘆、毛脚骨藤、天灯笼(江西)。

〔科屬〕：茄科 SOLANACEAE

茄屬 *Solanum* Linn.

〔形态〕：多年生草本植物，基部莖常木質化，莖攀援或蔓延，老的部分无毛，嫩的部分具細軟毛，叶卵圓狀，橢圓形，或提琴狀，先端尖或漸尖，基部圓形心臟形，通常莖的上部叶全緣，下中部的叶則近基部有三深裂或羽狀多裂，中間的裂片最大；兩側的小，兩面具有疏密不等的細軟毛，叶柄細長，常以此卷曲他物而攀援，叶互生，花呈聚繖花序，生枝頂及枝端与叶对生，花柄細長无毛，花萼綠色五錢裂宿存花冠通常紫色，五深裂，裂片披針形，漿果成熟后紅色，圓球形或卵球形，光滑无毛，种子細小光滑无毛，八至十月間开花。

〔產地〕：荒山野地、園圃、竹叢中、籬塹旁、牆頭間。

〔性味〕：苦，微寒，无毒。

〔功用〕：治寒热、黄疸、水肿、清湿热、解疗毒、除惡瘡、疥瘡、冻瘡。

〔主治及用法〕：

1. 傳染性肝炎：鮮苦茄四兩(干二兩)綿茵陈叶加水煎服，連服二周可告愈。

另方：鮮苦茄1—2兩加水煎服，日服一、二次，小儿減半。

2. 血吸虫病伴發黄疸：鮮苦茄每日用三兩煎湯分三次服，飯前服用(一日三次，每次一兩，飯前服)。

3. 各种肝病黄疸：

方一：鮮苦茄一至二兩，土茵陈五至八錢，加水煎成半碗，內服，日服二次。

方二：干苦茄五錢、土茵陈五錢、土茯苓五錢，加水煎服。

方三：用鮮苦茄四兩，加黃酒一、二兩煎服，勻分三、四次服，每隔四小时服一次，連續服1—2周。

方四：用鮮苦茄三兩加鮮萊菔半斤，开水冲炖分早晚服，連服一周后見效，二周后確能奏功。

方五：鮮苦茄二兩、豆腐半斤同炖服，效果良好。

4. 禁口痢：取鮮苦茄一兩炖冰糖服。

5. 咯血：取根一兩五錢，猪肉五兩同炖服。

6. 麻疹見点后高热不退者：鮮苦茄五錢至一兩煎服。

7. 絞腸痧及受冷腹痛：鮮苦茄三兩切碎放鍋炒三次，酒淬三次，开水冲炖服。

8. 淋雨后發作寒热：鮮苦茄二兩炖冰糖服。

9. 眼紅腫痛：鮮苦茄和人乳搗爛敷之。

10. 腎臟性腹水，肝脾腫大：用鮮苦茄一兩和干土茵陈三錢，日服二次，三星期見效，其療效很高。

11. 痔瘡：

方一：用干苦茄每次二兩加青仔草二兩，山豆升二兩，猪直腸三、四兩，不加鹽煮空腹服，飲湯食腸，每日一、二次。

方二：苦茄叶三兩，野杏仔二兩，地瓜酒半斤炖服。

方三：痔瘡及漏管用苦茄根一兩至一兩五錢(干的八錢至一兩二錢)和猪大腸一斤，洗淨清水同煎，飯前分二次服下。

12. 掌疔：用鮮苦茄隨量加冬蜜搗爛敷患處。

13. 各种疗毒：用叶及藤四兩加黃酒煎服，渣同米飯搗爛敷患處。

14. 陰疽：鮮苦茄三兩，地瓜酒半斤，开水冲炖服，藥渣敷患處，痛止腫消。

15. 陽毒潰爛化膿者：鮮苦茄三兩加冰糖五錢，开水冲炖服，渣敷患處，日換二、三次，可拔膿消腫。

16. 疥瘡：鮮苦茄一兩至一兩五錢，和肥肉六兩加水煎，分二次服。

17. 乳痈腫痛：鮮苦茄二兩(干一兩)酒水各半煎服，渣和酒糟搗爛敷患處(江西中醫藥1957年7月66頁)。

18. 慢性關節風濕痛：(江西中醫藥1957年7月66頁)

附方一：苦茄二兩，苦瓜藤一兩，用燒酒一斤，封浸七日，隨量飲，每日一、二次。

附方二：苦茄一兩，忍冬一兩，五加皮一兩，用燒酒一斤浸封七日，隨量飲，每日一、二次。



5. 苦茄 *Solanum dulcamara* Linn

鉄 莧 菜

Acalypha australis Linn

〔异名〕：野麻草，人莧，玉碗珠，玉碗捧真珠(福州)，破碗捧真珠(福州)，野麻仔，野黄麻，撮斗撮金珠，珍珠装北斗，鵝蚌珠草(龙溪)，海蚌含珠(湖南、江西)，拉痢草，粪斗草，榎草(日)，編笠草(日)，血見愁(江苏苏州)。

〔科属〕：大戟科EUPHORBIACEAE

鉄 莧 菜 屬 *Acalypha* Linn

〔形态〕：一年生草本植物，春夏生长，入冬枯萎，高60—70厘米，莖直立，多分枝，有纵条纹，具毛，叶互生，叶带棱状卵形或卵状披针形，先端尖，基部楔形，叶缘有浅锯齿，叶面多纹如麻，故称“野黄麻”，有叶柄约1厘米长，由叶腋生出穗状花序，雌雄同序，雄花多生于雌花之上，花呈淡褐色，雌花外围以大苞片呈心脏形，好象斗笠，故又称“編笠草”，种子结成果，三个半圆形小球，如珠花，故名玉碗捧真珠，上面有毛呈灰褐色，五、六月开花。

〔产地〕：本市路旁，野地，园庭以及山沟低处水草丛中。

〔药用部分〕：全株。

〔性味〕：苦、寒。

〔功用〕：清热解毒，腹痛下痢，里急后重，肠炎下泄，利水止痛，去腐生新，拔脓消肿。

〔主治及用法〕：

1. 阿米巴痢疾：野麻草鲜2—3两(干一两)，煎成200毫升，分作二次服，一日服完，连

續服5—10天，以大便恢復正常，及大便檢查變形蟲連續三次陰性為治愈。

(據福州市大眾醫院曾秉熙報告27例，治愈率100%，原載福建中醫藥1956年創刊號18頁)4

2.細菌性痢疾：野麻草干2兩，煎成200毫升分作三次服，一日服完，10歲左右用一兩，4歲以下用6—7錢，連續服用，平均七天痊癒，以臨床症狀消失，大便培養轉陰性者為治愈。

(據衡陽市衛生防疫站顧文明氏治療58例中治愈48例，治愈率達75.86%(上海中醫藥1957年10期第22頁)。

3.細菌痢帶菌者消滅：

野麻草、馬齒莧、鳳尾草、馬鞭草、鬼針、金石榴各等量煎成合劑，使每毫升含生藥一錢，給痢疾帶菌者每日服二次，每次30毫升，連服二天，服藥後三天大便培養痢疾桿菌陰性者為有效(福州市衛生防疫站使用該合劑治療148例帶菌者，其中144例轉為陰性，有效率達97%)。

4.細菌性痢疾：野麻一兩，白石榴花三錢，紅蘿卜干一兩，炖冰糖服。

5.赤痢黑痢：野麻草一兩，萊菔干一兩，煎服。

6.白痢：鮮野麻草一兩，萊菔干一兩，白馬齒莧一兩五錢，同煎服。

7.赤白痢：野麻草一兩，龍茅草一兩，紅糖一兩，開水煎服一、二次至三、四次即愈。

8.細菌性痢疾：野麻草二兩，鳳尾草一兩，倒生麻一兩，炖冰糖一兩，服數次即愈。

9.瘻管(附骨疽)：野麻草一兩五錢至二兩，羊肉半斤，連續服12—16次，瘻管即可告愈(福州市人民醫院治療三例，載于福州市衛生局編草藥單方臨床病例經驗匯編第一輯第四頁)。

10.濕熱流注(骨結核)：干野麻草一兩，魚腥草一兩，大野花生草一兩，羊肉半斤，番薯燒四兩，連服7—8次即愈。(福州市衛生局編草藥單方臨床病例經驗匯編第38頁)

11.黃疸：干野麻草一兩(鮮者須三兩)，煎服，每日一、二次。

12. 痔瘡腫痛：鮮野麻草二兩，鳳尾草一兩，開水燉服，4—5次即愈。


13. 疔瘡膿瘍：用野麻草葉加蜜，適量搗爛敷患處，有消炎鎮痛之效。

14. 白喉：用野麻葉搗汁，每次用一茶匙。

15. 高熱不退：野麻草四兩清水煎服。

16. 疝氣睪丸炎：野麻草三兩，荔枝干七粒，黃酒半斤燉服。

17. 勞力吐血：野麻草二兩燉豬腳服。



6. 鉄莧菜 *Acalypha australis*. Linn.

勾 儿 茶

Berchemia racemosa Sieb. & Zucc.

〔异名〕：鉤子藤、老鼠藤（閩侯、閩清）、羊母鎖、注骨草、熊柳（日）紫罗花、蛇藤
务（日）黄鱗藤、羊鎖貫。

〔科属〕：鼠李科RHAMNACEAE

勾 儿 茶 屬 *Berchemia* Neck

〔形态〕：是落叶攀援灌木，植物，枝条略呈纏繞性，表面平滑而細长圓柱形，質柔滑而強韌，呈棕黑色，牧童常以此枝纏繞圈狀套于羊母头上，故称“羊母鎖”（羊鎖貫）叶卵形或橢圓形，全緣微有光澤，互生，有着明羽狀平行脉，表面深綠色，背面粉綠色，夏日（7—8月）自枝腋或頂端簇生圓錐花穗，小白花五小瓣，萼五片，花后結长橢圓形果实核果大如赤小豆，初呈綠色，后变紅色，成熟时呈紫黑色如鉤子，故別称“鉤子藤”。

〔产地〕：荒山，本省及广东台湾以及日本等地均有之。

〔药用部分〕：莖及根部。

〔性味〕：性微溫。

〔功用〕：有利尿、解風毒流注，去瘀生新之效。

〔主治及用法〕：

1. 骨注（骨結核）：

方一：用勾儿茶一两，野棉花二两，开水炖服（福州市仓山区中医联合医院草医門診部王春惠同志治二十五例疗效达100%，可参考福州市中医药研究委员会編印之草药单方临床病例經驗汇编第41頁）。

方二：用勾儿茶三两，羊肉半斤和老酒少許，开水一斤炖服。連續服几剂，随服随見差。

2. 風毒流注（風湿性潰瘍）：用勾儿茶根三两至四两，羊肉半斤，老酒四两，开水冲炖服。

3. 濕熱黃疸：用勾儿茶莖二两，金扁柏五錢煎服。

4. 勞力身痛：用勾儿茶二两，羊肉四两，酒水各半炖服。

5. 胃消化机能衰弱（食欲不振）：用勾儿茶根四两至五两煎湯服，有健胃作用，3至4次即愈。

6. 串骨天蛇：

①内服：勾儿茶二两，山油麻皮三錢，木蓮根一两，雪球十四瓣，羊肉半斤，开水半斤煎余半斤时加番薯燒半磅冲服。第二煎同上。

②外敷：榆树叶二两，蛤蟆十四头，蟾酥二分，雄黃三錢，搗細加些桐油調抹，每日抹三次。

③烘用：有刺野珠蓉根二两，断腸草（梭葛）根一两，雄黃精三錢，前二味用开水一斤，醋半斤，煎半小时后加雄黃精合煎后洗患处，每日飯后洗二、三次。