

山西中药志

山西省卫生厅編

內 容 簡 介

本书是山西省卫生厅主編，較系統地、全面地总结了历年来老药工人員的宝贵經驗；反映了山西省中药材的基本概况，基本上澄清了混乱品种。

全书共收載山西省出产的中药300种，附有插图196幅。分为：根及根莖、莖枝及藤、皮、叶及全草、花、果实及种子、动物、矿物、其他等九类。每一个品种均分別叙述其别名、产地、产季、产地加工、性状鉴别、品質优劣、效用和貯藏方法等項；植物药除了少数几种未調查清楚之外，还作了原植物科屬形态的描述。

本书对山西省中药材的产、购、銷、經營管理和医疗应用等工作，都具有一定的指导作用，同时，可供医药院校和科学研究部門了解和研究山西中药材时的参考。

序 言

中药是祖国医药学的重要组成部分，它有悠久的历史，内容丰富，是世界药学的一大宝库，是我国劳动人民数千年来向疾病作斗争的有力武器。

我省山高林密，药材蕴藏极为丰富，是我国主要药材产区之一。不仅品种多，产量大，而且质量也很高；在药材生产，加工炮制，识别真伪，经营管理等方面均积累了许多实践经验。但是这些经验没有进行过系统的整理总结，加以推广。更由于中药材品种繁多，各地使用情况互不交流，致使同名异物，同物异名的混乱现象普遍存在，全省到底有多少品种，资源分布等情况亦不摸底。自从一九五八年大跃进以来，进一步贯彻了党的中医中药政策，根据党的“系统学习，全面掌握，整理提高”这一方针，在卫生厅党组的领导下，我省的中药材整理工作也有很大的跃进。

我厅在省、市药材经营部门及师范学院生物系等单位的大力协助下，在虚心总结药工人员经验的基础上，并经过调查研究，采集标本，加以整理编写成“山西中药志”。这是十分必要的。它总结了我省中药材的基本情况，对进一步研究和提高具有重大意义。

“山西中药志”的出版，对我省今后的中药研究工作，中药资源的利用，品种混乱现象的纠正，药品质量的提高等方面都会有一定的贡献和影响。它是一本既大众化，又有一定科学价值的地方性的文献资料，既可作普及中药材知识之用，又可供科学研究的参考。因此，我们认为值得推荐。并希望在此基础上，继续努力，进一步研究和提高，使它在社会主义卫生保健事业建设中发挥更大的作用。

樊清江

一九五九年八月

編 写 說 明

为了进一步贯彻党的中医中药政策，根据党的“系統学习，全面掌握，整理提高”这一方針，在卫生厅党組的领导下，我們組織了力量，經過八个多月的努力，編写了“山西中药志”。

本书按药用部份分类，对于同一种植物的各部份，凡其效用不同者均分別列为一種；书中所采用的度量衡一律用市制（其中重量单位仍用16两制）；所述的采集時間均指农历；所举的产地皆指旧行政区划的县名和地名。

本书着重叙述的产地加工，性状鉴别等項系根据与老药工人員座談記錄整理后写成的；效用一項基本上都是根据文献記載而編写成的；本书所收載的植物药其原植物品种大部分由师范学院生系物張曉台教授协助鉴定，其中一部分由中国医学科学院药物研究所代为鉴定；书中插图大部分系根据原植物标本和药用部分样品由师范学院生物系同学代为繪制，一部分是引用“中国药用植物志”等文献上的附图，或加以某些修改制成的。

虽然本书在編写过程中得到各有关单位的大力协助，并曾将初稿分送至各药材主产地区及有关单位广泛征求意见，經過多次修改，但是由于所收集的資料不够完整，特别是編写人員缺乏經驗和业务水平所限，因而錯誤和缺点仍恐难免，深盼各有关单位和讀者批評指正。对于在本书編写过程中曾給予大力协助和提出宝贵意見的单位和個人，就此一并致謝。

山西省卫生厅

一九五九年八月

目 录

序 言		地榆	(56)
编写说明		光慈姑	(58)
各 论		貝母	(59)
(一) 根及根莖类		玄参	(61)
人 参	(1)	赤芍	(63)
大戟	(3)	防风	(66)
大蒜	(5)	沙参	(68)
山药	(6)	佛手参	(72)
山豆根	(8)	何首烏	(74)
山常山	(12)	青木香	(76)
山黄連	(14)	狗脊	(78)
山大黃	(16)	知母	(80)
天門冬	(18)	香附	(82)
天花粉	(20)	威灵仙	(84)
天南星	(22)	柴胡	(87)
升麻	(24)	前胡	(90)
丹参	(26)	独活	(91)
牛膝	(28)	芦根	(93)
白头翁	(30)	苦参	(95)
白芨	(32)	重楼	(97)
白薇	(34)	狼毒	(99)
白芷	(36)	茜草	(103)
白前	(38)	骨碎补	(105)
白茅根	(39)	党参	(106)
白药子	(41)	射干	(108)
玉竹	(42)	草烏头	(110)
半夏	(44)	桔梗	(112)
甘遂	(48)	紫草	(114)
甘草	(50)	紫参	(116)
百合	(52)	紫苑	(118)
地黄	(54)	紫苏根	(120)

商陆	(121)
麻黄根	(123)
菖蒲	(124)
黄芩	(126)
黄精	(129)
黄耆	(131)
贯众	(135)
葱白	(137)
远志	(138)
萱草根	(140)
秦艽	(142)
苍术	(145)
银柴胡	(147)
漏芦	(149)
墓头灰	(152)
葛根	(154)
龙胆	(156)
薤白	(158)
藜蘆	(160)
藕节	(162)

(二) 莖枝及藤类

山椿柳	(165)
天仙藤	(167)
木通	(168)
皂刺	(170)
忍冬藤	(170)
松节	(171)
桑枝	(172)
鬼箭羽	(173)

(三) 皮类

五加皮	(175)
丹皮	(179)
冬瓜皮	(180)
白鲜皮	(180)
石榴皮	(181)
地骨皮	(181)
杜仲	(182)

桑白皮	(184)
黄柏	(185)
椿根皮	(186)
绿豆衣	(188)

(四) 叶及全草类

一枝蒿	(189)
小薊	(190)
大薊	(192)
木賊	(194)
石韦	(196)
瓦松	(198)
血山草	(199)
血見愁	(201)
老鸛草	(203)
地丁	(205)
艾叶	(211)
刘寄奴	(213)
列当	(215)
青蒿	(216)
黄花蒿	(218)
茵陈	(220)
卷柏	(222)
桑寄生	(223)
荆芥	(225)
浮萍	(227)
桑叶	(228)
益母草	(230)
馬齿莧	(232)
淫羊藿	(234)
敗醬草	(236)
荷叶	(236)
荷梗	(237)
紫苏	(237)
紫苏叶	(239)
透骨草	(239)
侧柏叶	(241)
麻黄	(243)

通經草..... (245)

蒴藋..... (247)

壳精草..... (249)

蒲公英..... (250)

澤兰..... (252)

龙芽草..... (254)

翻白草..... (256)

瞿麦..... (259)

黎芦..... (261)

薄荷..... (263)

(五) 花类

月季花..... (265)

辛夷..... (267)

金銀花..... (269)

金蓮花..... (271)

芫花..... (273)

扁豆花..... (275)

紅玫瑰花..... (275)

紅花..... (277)

紅灯籠..... (279)

洋金花..... (281)

馬蘭花..... (283)

旋复花..... (285)

款冬花..... (287)

菊花..... (289)

鸡冠花..... (291)

蒲黃..... (292)

葛花..... (292)

槐花..... (293)

蓮花..... (295)

蓮須..... (295)

(六) 果实及种子类

小茴香..... (297)

大枣..... (299)

山茱萸..... (300)

山楂..... (302)

火麻仁..... (304)

王不留行..... (306)

天仙子..... (308)

五味子..... (310)

牛蒡子..... (312)

分心木..... (314)

冬瓜子..... (315)

白扁豆..... (317)

白果..... (318)

白芥子..... (320)

白苣子..... (322)

白蒺藜..... (324)

石蓮子..... (326)

合欢花..... (327)

地芙子..... (329)

决明子..... (331)

谷芽..... (333)

麦芽..... (333)

杏仁..... (334)

車前子..... (335)

皂莢..... (337)

皂子..... (339)

花椒..... (339)

兔絲子..... (341)

苏子..... (341)

青箱子..... (342)

金櫻子..... (344)

枸杞子..... (346)

南瓜子..... (348)

急性子..... (348)

胡麻仁..... (350)

柿蒂..... (350)

郁李仁..... (351)

苦楝子 (附苦楝皮)..... (353)

瓜楼..... (355)

瓜楼仁..... (355)

香椽..... (356)

苦丁香..... (358)

柏子仁	(358)
破故紙	(359)
浮小麦	(361)
馬藺子	(361)
桃仁	(362)
馬兜鈴	(364)
萊菔子	(364)
桑椹	(366)
茺蔚子	(366)
連翹	(367)
牽牛子	(369)
蛇床子	(371)
黑芝麻	(373)
甜瓜子	(375)
猪牙皂	(377)
絲瓜絡	(379)
核桃仁	(381)
楮實子	(381)
葱子	(382)
韭菜子	(382)
葶藶子	(384)
凤眼草	(388)
蕤仁	(388)
蓮子	(389)
蒼耳子	(390)
槐實	(392)
蓖麻子	(393)
酸枣仁	(395)
薏苡仁	(397)
櫻桃核	(399)
鵝虱	(401)

(七) 动物类

土鼯	(405)
五灵脂	(405)
水蛭	(406)
牛黃	(406)
白僵蚕	(407)

血余	(407)
全蝎	(408)
龟板	(409)
狗腎	(410)
夜明砂	(410)
刺猬皮	(411)
虻虫	(411)
紅娘	(412)
蚕沙	(412)
馬宝	(413)
豹骨	(413)
桑票蛸	(414)
望月砂	(414)
紫河車	(415)
鹿茸	(415)
黃蜡	(416)
斑蝥	(417)
鸡內金	(417)
鉄角牛	(418)
蜂房	(418)
蜂蜜	(419)
蜈蚣	(419)
凤凰衣	(420)
蝸牛	(420)
驴腎	(421)
龙衣	(421)
蟬蛻	(422)
麝香	(423)
鱉甲	(424)

(八) 矿物类

土龙骨	(425)
五花龙骨	(425)
元明粉	(426)
白石英	(426)
白矾	(427)
石膏	(427)
代赭石	(428)

赤石脂.....	(428)	鍾乳石.....	(435)
芒硝.....	(428)	(九) 其他	
花蕊石.....	(429)	五倍子.....	(437)
礞金石.....	(429)	木耳.....	(439)
胆矾.....	(430)	冬虫夏草.....	(439)
紫石英.....	(430)	石花.....	(440)
寒水石.....	(430)	松香.....	(440)
阳起石.....	(431)	柿霜.....	(440)
硫磺.....	(431)	馬勃.....	(441)
滑石粉.....	(432)	茯苓.....	(441)
鉄落.....	(432)	神曲.....	(442)
銅綠.....	(433)	猪苓.....	(443)
磁石.....	(433)	飴糖.....	(444)
龙齿.....	(434)	蘑菇.....	(444)

人 参

原植物：系五加科(Araliaceae)植物人参Panax schinseng Nees (Panax ginseng C.A. Mey.)。药用部分为根。

多年生草本，莖高約1—2尺，直根肥大。叶有长柄，为5小叶所成的掌状复叶，輪生于莖端，一年生者具3小叶組成的复叶1枚；二年生者具5小叶組成的复叶1枚；三年生者复叶2枚；四年生者复叶三枚；五年以上者通常为复叶4—5枚，皆有5小叶；小叶卵形，重鋸齒緣，叶端尖銳。夏季自花軸頂端生伞形花序，开白色小花。漿果球形，成熟时为紅色。(图1)

产地：絳县栽培。

产季：春秋二季。

产地加工：目前本省新引种成功，尙未采收。

性状鑑別：人参呈紡錘形，中間略膨大，下部多有分枝，有多数須根，須根上有显明之突起，形似珍珠，俗称参珠。全长約5—6到7—8寸，中間粗約3至5分，下部支根粗約半分至1分。外表黃白色。上端有細长根莖，俗称芦头，較野生者为短，有弯曲盘节，有突起的节痕及圆形凹下的莖痕(芦碗)，頂端較大，下部漸小。年代愈久則芦头愈长，芦碗亦愈多。靠近芦头的根的上部密生細橫皺，下部橫皺較稀，并有凸起之橫紋。橫断面黃白色，有黃棕色的环紋，呈“井金玉栏”状。味微甜而苦。

品质优劣：以个大，年久質堅重，外皮皺紋細密，有参珠，有香气，而稍帶苦味者为上品。各种加工人参中以晒参質量最佳。

效用：补血生津，宁神益智，大补元气。治肺虛喘促，脾虛泄瀉，胃虛嘔吐，久病氣虛，崩漏暴脫，惊悸，消渴以及小儿慢惊、痘疮虛陷等症。

貯藏：置干燥处保存，防虫。可在缸底放一瓶酒，上面放入人参，缸口密封以达到防虫目的。




图1 人 参 *Panax schinseng* Nees.
1.花 枝 2.根的全形

大戟

原植物：系大戟科 (Euphorbiaceae) 植物大戟 *Euphorbia peginensis* Rupr. 药用部分为根。

多年生草本，莖高尺余，有細毛。叶为长园状披針形，全緣，平滑或微有毛。五六月間莖梢分枝上开黃綠色小花。果实扁球形，有疣状突起。莖叶都含有白色乳汁，有毒性。(图 2)。

别名：草大戟。

产地：各地均产，野生。

产季：夏秋二季。

产地加工：挖出后除去莖苗，須根，洗净泥土晒干即可。

性状鑑別：本品为园錐形之根，稍分枝。长约 3—4 寸，直径 6—8 分。外皮棕色或灰棕色，粗糙有皺紋，頂端有莖痕。質地較坚硬，不易折断，断面不平坦纖維性。无香气，味辛。

品质优劣：以身干、純淨不帶須根泥土者佳。

效用：瀉水、利二便。治水肿腹滿急痛，积聚痞块等症。

貯藏：置干燥处防潮。

其他：

(1) 晋南聞喜等地所产的一种大戟与上述不同，当地又称棉大戟。呈粗壯的紡錘形或园柱形，外表棕褐色。断面中心黃色，外皮呈白色棉花状，有韌性。原植物未調查清楚。

(2) 本省所产的大戟只有少数地区应用，大部地区均习惯应用外省进貨的紅芽大戟。




图 2 大戟 *Euphobia pekinensis* Rupr.
1. 茎残基及根 2. 花枝 3. 花

大 蒜

原植物：系百合科 (Liliaceae) 植物蒜 *Allium sativum* L. 药用部分为地下鳞茎。

多年生草本，鳞茎常由多数 (五、六瓣) 小鳞茎聚合而成，外面有一层灰白色或淡褐色干皮膜。叶实心，扁平，线状披针形。花梗长，圆筒形，高约 1 尺半左右，伞形花序，紧密，花淡粉红色，具长膜质苞，有时变生珠芽。鳞茎 (蒜头) 辛辣有臭味。

产地：各地均有栽培。

产季：夏，秋二季。

产地加工：刨出后去净泥土即可，用时剥去皮，切片或捣成蒜泥生用。

性状鉴别：即普通食用之大蒜，极易识别。

品质优劣：以独头紫皮大蒜较佳。

效用：清热、解毒、杀虫。治崩带，虫积、血痢等症。本品有很强的抗菌作用。

贮藏：通风干燥。

山 药

原植物：系薯蓣科(Dioscoreaceae)植物薯蓣Dioscorea batatas Decne.药用部分为根莖。

多年生蔓生草本，莖常带紫色，根莖长达3尺許，园柱状棍棒形。叶对生或三枚輪生，卵形或橢圆形，先端长尖，基部心脏形，有寬角，叶腋生珠芽（名零余子，可食用），花序穗状，花乳白色。蒴果具三翼，种子有翅。（图3）

别名：长山药。

产地：主产平遙、孝义，太谷、祁县等地，皆为家种。

产季：春种秋采，9—10月为采集期。

产地加工：采刨出土后，洗净泥土，切去两端，刮去外皮，挖掉毛根，炕干或晾干即为毛条山药。去皮后晒至半干，搓成光园而直之长条，切成长約5寸左右，两端削平，放到硫磺坑內，熏閉一日，使其色澤洁白，炕干，即称为光条山药。加工时削下的部分可磨成山药粉供食用。

性状鑑別：光条山药为园柱形，长约7—8寸，不过一尺，直径約6分，也有达1寸的，里表皆为白色，純粉質，断面細致，粉質均匀，无任何紋理，味淡。毛条山药亦为长条形，形状不甚規則，粗細不均匀，个大小不一，表面不平整。两者皆質脆味淡。

品质优劣：光条以条粗匀净，体質坚实，色澤洁白，条順完整者佳。毛条不分大小，均身干洁淨者即可。

效用：补脾气，益腎精，健胃化痰。治泄痢遺精，腎虛健忘，虛勞瘦弱。民間也有作食用的。

貯藏：本品易生虫，宜放于通风干燥处密封，防止潮湿，霉烂。防止虫蛀可以用硫磺熏。




图 3 . 山 药 (薯 蕷) *Dioscorea batatas* Decne.

1.花枝 2.果枝 3.雄花 4.雌花

山 豆 根

山豆根有同名异物现象，本省应用的有二种，一种是豆科植物山野豌豆的干燥根；另一种是防己科植物蝙蝠葛的干燥根。晋南地区多用前者，晋北地区多用后者。二者之药效是否相同须进一步研究。

山 豆 根(一)

原植物：系豆科 (Leguminosae) 植物山野豌豆 *Vicia amoena* Fisch. 药用部份为根。

多年生草本。莖蔓性、有柔毛，高 3—5 尺，托叶宽，有齿、叶有卷须分枝，小叶 8—14 个，在总轴上近互生，长圆形。六、七月开花，花序总状，花紫色，荚果扁平含种子 3—4 粒。(图 4)。

别名：山豌豆根(寿阳一带)，苦豆根。

产地：晋南，晋中各地，野生。

产季：春、秋均可采制，但以秋采较好。

产地加工：挖出后除去残茎、泥土及须根，晒干即可。

性状鉴别：本品为不规则的圆柱形，上部稍大，下部稍细，毛根显明，有时下部有分枝。长 1 尺左右，直径约 2—3 分。外表黄褐色。纵向有明显之皱纹，横向有明显之棕色线纹(皮孔)，折断面不整，呈柴性。断面分明显的内外两层。内层黄色，为木质心，质硬，有放射状的细纹，易与外层剥离，外层为淡粉红色，较软，柴性小，有豆性气，味苦。

品质优劣：以身干，去净残茎须根者佳。

效用：清热解毒，清心火，消肿止痛。治咽风、咽痛，诸疮热毒等症。

贮藏：置通风干燥处保存。

山 豆 根(二)

原植物：系防己科 (Menispermaceae) 植物蝙蝠葛 *Menispermum dauricum* Dc. 药用部份为根。

多年生缠绕藤本。叶为盾形，有长柄，叶面平滑，背面微生毛，常为三—七角形，或分裂成数片，基部略呈心脏形。夏季开花，淡黄色，圆锥花序。花后簇生黑色核果。(图 5)。

产地：晋北各县均产，野生。