

家畜传染病草药疗法



湘西土家族苗族自治州畜牧局编

湖南调查组



57.23

30

研究所

湘西土家族苗族自治州人民出版社

編号：4

家畜傳染病草藥療法

湘西土家族苗族自治州畜牧局編

湘西土家族苗族自治州人民出版社出版
地方国营吉首印刷厂印刷
新华书店湘西土家族苗族自治州支店发行

1959年元月

定价6分

寫 在 前 面

獸醫土藥土方，是我們祖國偉大的醫學遺產之一，是勞動人民長期向獸病作鬥爭，取得的寶貴成功經驗。為了促進社會主義畜牧事業飛躍前進，我們本着打破保守、大胆創造的精神，實行土洋結合，搜集了一些土藥土方，編成這本小冊子，供各地參考。這本書主要是根據我州民間獸醫歷年來的臨床經驗，結合外地的先進經驗，通俗地解釋了牛、豬、兔、雞等常發的11種傳染病的病源和病性，解釋了臨床病狀和各種治療方法。這些治療方法，有針灸療法、吊錢療法、吹藥療法等，有外敷、內服藥方幾十種。所用中草藥，很容易找到、買到，藥價一般很低。

由於我們知識有限，以往中草藥研究很少，加之在搜集編寫中的時間較短，可能有很多不當和錯誤之處。希望各地在實用中，加以發展，補充和修正。

湘西土家族苗族自治州畜牧局

1958年12月

家畜傳染病草藥療法

炭疽又叫脫脾症（中獸醫叫扑胸癰、毛廉塞肚口、療瘡、鐮鉞症）。

炭疽病原是炭疽杆菌，杆菌小得很，肉眼看不見。牲畜吃了有病菌的草和水，或被帶有病菌的牛虻、馬虻、蒼蠅等咬過，牲畜身上有破了皮的口子粘着細菌，都可能害這種病。這種細菌，在土里能生存几十年。這種病，常發生在低窪潮濕的地方，往往在夏季流行。這種病能傳染給牛、馬、豬、羊、狗、人等，要特別注意防治。

牲畜得了這種病，突然發高燒，身體溫度上升到攝氏41—42度，不吃東西，精神興奮，很不安靜，身上發抖，眼結膜變紫藍色。有時舌頭腫大，呼吸困難。開始害病時，肩干硬屎，以後瀉肚子，肩的血有腥味。一般急性病，死得很快，往往不超過兩天。最急性的病，常看不見任何病症就死了。病畜死后，肚子發脹，嘴里、鼻子里、肛門里出血，出的血結不成血塊。

治療方法：

1、針灸療法：用針穿黃穴、大血穴、交補穴、腎腔穴。

2、吊錢療法：砒石1錢半、藤黃4錢、蟾酥5錢、斑蝥30個、冰片1錢，碾成細末，用吊錢療法。

3、內服藥方：

（一方）馬蹄香、血蜈蚣、大血藤、木漿樹葉、細苦蒿、國狗牙齒、小香葉子、紋馬鞭、三月芭根，這些藥用多少要合適，熬藥水，灌給病畜吃。

（二方）大黃、黃草、蒼麻草莖、烏不踏樹根、苦筍、冬

古子根、隔山消、水灯草、党参、砂参、高粱气、开口箭、岩姜、貝母，把这些藥碾爛，熬藥水，灌服。

(三方) 青魚胆、大黃、一支箭、苏山虎、小黃、雄黃、家菖蒲、大蒜子、臭牡丹、臭鼻藤、山螞蝗、毛香苓、紅老鴉蒜、吊杆草、接骨草、車前子、路边黃、三爪風、五爪風、七爪風，这些藥各用多少，要根据病畜情况，熬藥水灌服。

(四方) 穿山甲6錢、明雄3錢、連翹、生地、山梔子、山豆根、王蓀苓、枳实、大黃各1兩2錢、木通、黃柏各7錢、黃連9錢；熱水2次灌服。

(五方) 新茶叶2斤、鹽蝶草8兩、黑芝麻1斤、水团魚8个（鹽炒）、鹽桃子4个，熱水灌服。

(六方) 地苦胆半个（大的）、硃砂1錢、女兒紅一把、山射一把、錢馬鞭一把，把这些藥切碎、搗爛，用开水冲泡，用淘米水先把病畜的口洗好，再把藥水灌給病畜吃。

气腫疽 又叫黑腿病（中獸医叫爬腿猴、三脚虎、爛腿、走猴、腿癢）

气腫疽病原是气腫疽梭菌，常侵犯4歲左右的青壯黃牛。牛得这种病，多是因为吃了有細菌的草和水，或是牛身上破了口子粘有細菌。这种病經常發生在沿溪兩岸和低窪潮湿的地方。

牛害病时發高烧，能燒到攝氏41度到42度，全身燙手，不吃草，也不回草，精神很不好，病牛低着头，呆立不动，走路蹣跚。在肉厚的地方，如大腿上、屁股上、肩上、頸上，發生腫脹。起初紅腫，有热有痛，以后就无热无痛了，用手压时，象脚踩在雪上，發出吱吱响声。用刀子割开腫的地方，流出紫黑色的血水，臭得很，肌肉松松的，变成暗紅色。病牛只一天到兩天就会死亡。

治療方法：

1、針灸療法：腫瘤在肩上、頸上、胸脯上，各打一針，放些血，用30%的碘酒或石炭酸多洗幾次。

2、外敷藥方：野麻蕓、草烏頭、散血草、虎耳草、桑白皮、尿腳、野菊花根、醋、石灰，這些藥各用多少，要合適。將這些藥搗爛，用布包好，放在腫的地方，用力揉擦（腫的地方先用針刺破，流出污血；流出的污血要燒掉）。或用大蒜、艾葉各4兩、石菖蒲3兩、生姜1兩，煮水，等到水冷後，用藥水洗病牛的腫脹的地方。

3、內服藥方：

（一方）川芎、大蒜、大鴉蒜、田螺、野百合、夏枯草、隔山消、櫻桃皮、下山虎、搜山虎、山烏龜、桔梗草、小菖蒲、鴨腳板，以上的藥各用多少，看病情決定。將藥洗干淨，搗爛，用冷水浸汁，給病牛灌兩飯碗藥到三飯碗藥。將剩下的藥，用燒得很熱的磚一塊，放在里边，再用布或棕片把磚和藥渣包好，揉擦病牛全身。由上到下，由前到後，來回揉擦，最後在四蹄放毛邊血。

（二方）鉞馬鞭1斤、車前草半斤，搗爛，泡開水3斤，冷後去渣子，一次灌給病牛吃。

（三方）茵陳4兩、木通1兩、前仁1兩、水燈芯4兩、竹茹1兩、青木香2兩，洗淨切爛，熬水灌服。

（四方）大蒜頭1斤、菜油半斤（病牛大便干硬就多放，大便正常就少放），大蒜頭搗爛，混和菜油灌服。病輕，一天灌服一次；病重，一天可灌服兩次。

（五方）天冬3錢、馬鞭草3錢、車前草5錢、薄荷4錢、連召5錢、黃柏3錢，把這些藥研爛，泡水灌服，把藥渣敷在腫的地方，用白砒下錠子。

(六方) 欽馬鞭、老牙酸、鷄屎藤、大散、小散、滿天星，這些藥各用多少，要合適；再用雄黃2錢、明礬1錢、接骨草、石灰2兩。把這些藥研爛後，用開水沖泡一下，將藥渣去掉，灌服。藥渣可給病牛外敷腫的地方。

牛出敗 (中獸醫叫鎖喉症、清水喉、爛爐症)

牛出敗病原叫出血性敗血症桿菌，是巴氏桿菌的一種，經常存在水里、土里、糞便里、爛了的植物里。牛的身體不好，抵抗力不強，容易發生這種病。

牛得病以後，就發燒，體溫升高到攝氏40度到41度，精神不好，身上發抖，牛毛亂得很，不光滑，牛身上有的冷有的熱。不吃草，也不回草，兩邊口角上流出口水，象吊綫一樣，舌頭腫大，有時吊在外邊，喉頭腫大，呼吸困難，鼻子尖是干的，鼻子里流出鼻涕，眼皮腫得鼓鼓的。開始病時，肩干硬的糞，以後肚子瀉，常常有血或粘液，臭得很。喉頭腫起以後，接着臉兩邊也腫了，頸上、胸脯上、四腳上也隨着發腫。牛發病後，快的一天到兩天死亡，有的拖延六、七天才死。

治療方法：

1、針灸療法：刺鎖喉穴、玉堂穴，還可實行藥物溫灸法。或用草烏、射干、生南星、欽燈台，搗爛後調和桐油，糊在針口上。

2、吊錢療法：狗屎（綠豆大）、冰片2分、硃砂2分、雄黃1分、硼砂1分、硫磺2分，把這些藥研爛，用布包好，內放棕絲（棕絲一端，露在布包外面，便于排毒）。再在牛胸脯垂肉的地方，用針垂直穿刺2寸到3寸深，將包好的藥放入刺破的孔內，3天後取出藥包，擠出針口內的濃汁。

用砒石1錢半、藤黃4錢、蟾酥5錢、斑蝥30個、冰片1錢、吊錢也可。

3、吹藥療法：射干、山豆根各1兩、人中白5錢、研成粉末、吹入喉頭處，或是鼻孔內。或用矮豆根、花椒、開口箭，研爛成細末，吹入鼻孔內。

4、外敷藥方：糯米、冰片、雄黃、大黃、石灰，把這些藥捶爛，敷在腫脹的地方。或用麻芋子、天南星，捶爛后，調和一些酒，外敷在腫的地方。

5、內服藥方：

(一方) 開口箭、一枝箭、地蜈蚣、見腫消，各8錢，捶爛后沖開水，灌給病牛吃。

(二方) 開口箭、九龍胆、散血草，各種藥用多少，要合適，捶爛后沖開水，灌服。

(三方) 苦筍、柴胡、胆草、麥冬、車前子、花粉、木通，如果牛口流血，或有血泡，可加桑柏皮、青木香，以上各種藥量用多少，要合適，捶爛，煮水灌服。

(四方) 水楊柳1兩、天樞子5錢、水椿莢頂(水城公)1兩、報母樹根5錢、毛芥菜3莢、川黃連5錢、黃芩1兩、黃柏1兩、大黃5錢、金只尾5錢、木通3兩、半边蓮1兩、四季青5兩、麥冬(去心)5錢，水灯草作引，熱水灌服。

(五方) 土狗兒、地牯牛、穿山甲、開口箭、杉樹尖、皂角樹刺，捶爛，用開水沖藥，灌服。

(六方) 金銀花5錢、射干5錢、豆根3錢、連召5錢、元參、黃連各3錢，把以上各種藥研爛，用開水沖泡，等藥水冷了，灌給病牛吃。

(七方) 大連涼、敗血草、定子草、大力、連召、綠豆根、射干、黃連、梔子、黃芩、荊芥、元參、人中黃，熱水，灌服。

(八方) 貝母、白芷、蒼朮、細辛、茯苓，各一兩5錢，半夏、知母、蕪荑、川芎、天花粉，各8錢，這些藥混合後，每次用3兩，用生薑4錢，酒2兩，熬水灌服。

豬 瘟 (中獸醫叫爛腸症、燒腸症)

豬瘟病原是一種濾過性的病毒，在病豬身上各處都有。如好豬與病豬同圈喂養，共用具，吃了病豬剩餘的潲，被帶毒的蚊子、蒼蠅咬了，飼養員喂了病豬又來喂好豬，都可使豬傳染這種病。

豬發病後，全身發燒，最高燒到攝氏42度左右。精神很差，背拱起，頭尾向下吊着，站立不動，全身發抖，喜歡睡在草窩裏不起來，就是趕走時，也是東倒西歪。愛喝水，不吃潲。病豬身上有小塊的、黃豆大的血紅斑，用手按時，不褪色。眼睛腫大，眼睛里是紅的，有膿一樣的眼屎。剛害病的豬，肩干硬的屎，象算盤子一樣，黑色，屎里有膏子和血液粘着。到病後期，肩稀屎，肩出來的屎象水一樣也有膏子和血混在一起，很臭。病豬瘦得很快，到臨死時，耳上、鼻上、肚子上、後腿內面等皮膚，變為紫色，若是公豬則鞭鞘腫起，用手壓時，流出白色臭水，體溫下降。大部分病豬，快的一天，慢的四天至七天左右死亡。解剖後，可以看到腸子上有扣子一樣的爛塊，腰子上有芝麻大小的血點。

治療方法：

1、注射藥方：苦連子葉1分、泉水2分、放在蒸餾器內蒸餾，按豬的體重，體重每市斤注射1西西（1,000西西等於1市升）的藥水。每隔6小時到8小時，注射一次。病重者連續注射4天即好，病輕者注射兩次即好。

2、吹鼻療法：

牙皂3分、細辛3分、白胡椒2分、明雄1分、麝香1分，研成粉末，吹少許到病豬鼻孔中。

3、內服藥方：

(一方)巴山虎(楊柳樹上的)3兩、十蛇肉4兩、粳米(普通米炒黃)3兩，混合研成末子，每日喂3至4次，每次2兩，均用開水灌服。

(二方)皂莢子皮5至8兩、糯米1斤、土大黃8兩、通關散1兩、大蒜頭1個、鉄馬鞭3錢、水灯草3錢、水菖蒲3錢、肺心草3錢、地坦3錢，糯米除外，將其他各藥混合煮好，再加糯米，煮好后，藥冷了，分兩次灌服。

(三方)搜山虎、大血藤、小血藤、青木香、百部、葛根、小黃連，混和捶爛，兌淘米水，灌服。

(四方)根扑、青皮、陳皮、柴胡各1兩，召烏6錢、法下1兩、扑硝1兩，熬水內服。

(五方)水菖蒲、地苦胆、野草烟、大散、小散、生石膏，各適量，研細，混水內服。

(六方)川芎草、車珠泡、地胡椒、鉄馬鞭、臭牡丹、广木、明雄、冰片，將上藥捶爛，用水煮，冷后灌服。

豬肺癆(中獸醫叫鎖喉風、大頭風)

豬肺癆病原為巴氏桿菌，多存在土里、空氣里、水里，飼槽不清潔，喂槽不均勻，或過冷的槽，豬圈潮濕、骯髒，畜舍周圍環境，蓄積污水，用具不清潔等，都可造成傳染發病。

豬病后，全身發燒，最高燒到攝氏41度以上。喉頭腫大，壓之覺痛，呼吸困難促迫，有時象犬坐的姿勢。病豬常伏臥、伸長頸，張開口呼吸，有時跟着咳嗽，口流出泡沫液狀物。此

手压胸脯，猪感觉到發痛。眼臉腫脹，有眼屎，鼻子里，流出膿样的鼻涕。病猪精神不好，走起路來，搖搖擺擺，不吃槽，身体很瘦。身上各处的皮膚，有出血的紅斑，以胸脯上、耳根下最明顯，手按不褪色。肚子上的皮膚變紫色，一般七、八天死亡。

治療方法：

1、吹藥方：绣花針（藥）1兩、山豆根2兩、青魚胆1兩、射干1兩、路边黃1兩、水灯芯1兩、鉄馬鞭1兩、人中黃1兩，研成粉末，吹入猪口腔內。用通關散吹入鼻子里也可。

2、扎療藥方：用烤軟的滿天星叶，加烟屎，搓成团，塞入耳孔，再用繩子（或苧麻樹皮）扎住耳朵。三天后，把耳皮輕輕割开，取出放進的藥。

3、針灸療法：把腫脹地方的淋巴（俗稱瘍子）划开，拿路鉄烙或用針穿刺淋巴腺后，再穿頭髮一束，时常移动頭髮，使黃水流出。

4、內服藥方：

（一方）开喉箭、牛舌草、蒲公英、黃荊子、水楊柳、毛芥菜，各適量熬水，內服。

（二方）揚塵二兩、川朴一兩、开口箭一兩、雄磺一兩五錢、硃砂三毫，把这些藥混合研末，用水冲服。

（三方）黃芩1兩、黃柏1兩、黃連5錢、梔子1兩、花粉1兩、茯苓1兩、甘草5錢，熱水內服。

（四方）瓜蒌2兩、地丁2兩、双柏2兩、旋復2兩、玄參2兩、粉葛2兩、射干2兩、梔仁2兩、青魚胆1兩、生百合5兩、揚塵少許，熱水內服。

（五方）金錢吊葫蘆、南星、半夏、烏豆、空洞樹、糯谷草灰，各適量捶爛，調水灌服。

(六方) 号筒樹1兩、木油樹根1兩、野水芋头4錢、南星3錢、开口箭6錢、野打豕3錢、羌活3錢、独活4錢、全虫2錢，捶爛后，調溫水灌服。

(七方) 葱鷄利、五加皮、一口血、臭牡丹、野青菜、鉄登台、紅百合、苦蕎蓮、大血藤、一点血、八角蓮、防風、水葛蒲、羌活，各適量，把上藥搗爛調水，喂給病猪吃。

5、外敷藥方：

(一方) 石灰、桐油、茶枯、生姜、大血藤，各適量，將藥搗爛，把腫脹处用針刺穿，再敷上藥。

(二方) 南星、过眠草、桐油、头髮灰，各適量，煮沸成膠样，先用石灰水消毒腫处，再用小刀割開口子，把藥灌進去。

(三方) 石灰、南星、卜地香、小魚臘叶，捶爛調水，外藥敷在腫的地方。

(四方) 兩頸旁的瘍子（淋巴），用桐油火針刺穿，再用开口箭（藥）捶爛敷上。

(五方) 用塘底泥、井底泥塗在腫脹的地方。

猪丹毒（中獸医叫打火印、鬼打印）

猪丹毒病原叫丹毒桿菌。猪吃了帶有这种病原菌的糞、水或病猪的排泄物，就会得这种病。把好猪与病猪关在一起，可以傳染發病。这菌对自然界抵抗力很強，在太陽直照下，能生存12天，在腌重的肉里，可活3个月，在土里头長期生存不死。这病在春、夏、秋三季流行，春季較少，夏季較多，可以傳染到人，应加強防治。

猪害病以后，發高烧，最高体温达到攝氏42度以上。身上發抖，精神很差，光昏睡在圈边上，后腿感到沒有力，呼吸困难，吃糞很少，或是一点不吃。眼臉腫脹，眼結膜暗紅色。在發

病后不久，胸腹部、背部、腰部等处出現大小不規則的菱形紅色疹塊，在稍高的皮膚面上，用手按時褪色，手移开后，紅色又复原。疹塊由紅色，變為紫色，開始又熱又痛，以后變為爛面，結成痂皮。慢性的常發生關節炎，一般后腿的關節被侵害較重，不能走路。發病初期，屙的屎干硬，象算盤子一樣，附有粘液，有時帶血；到末期瀉肚子。急性一兩天死亡，慢性的可拖延十天半月以上。

治療方法：

1、皂浴療法：先用溫水浸濕豬身，擦上肥皂，用軟稻草摩擦全身，擦起一層泡沫，不要洗掉，讓肥皂水自干。每天洗浴3次。這樣連續3至4次可以好。

2、藥浴療法：大五爪風、小五爪風、四方草、葎麻草、各一把，將上藥捶爛熬水，給病豬洗擦，洗1次至2次可好。

3、石灰水浴療法：石灰1斤、水10斤，調和后擦洗豬的全身。

4、吊錢藥法：

（一方）白砒5錢、冰片3錢、雄黃2錢、花椒1錢，把上藥研成細末，調好，作成綠豆大的丸子，再把病豬的耳朵洗淨消毒，在耳上靜脈分叉處，用小刀斜划一小口，把丸子埋入一粒即可。

（二方）蜈蚣1兩、白砒5兩、紅娘1兩、斑蝥1兩，混合后研成細末，用細皮紙包成250個至300個錠子，將病豬耳朵消毒后，用小刀割一小孔，把錠子塞入。70斤以下的插一個，70斤以上的插兩個，再用酒滴濕錠子，然后用烟屎封刀口。過24小時后割開，擠出污液，用鹽洗后，塗上桐油。

5、內服藥方：

（一方）鉞馬鞭、地苦胆兩種藥以適當的重量，熬水灌服。

(二方) 雄黃、大蒜、花椒、生薑，研成細末，塞入耳內，用麻綑好。再內服欽馬鞭、白味蓮、廣木香、地皮花、水灯草、水菖蒲、地胆、山烏龜，各適量，將上藥捶爛，用開水沖泡，冷後灌服。

(三方) 菖蒲、車前草、蝦蟆、欽馬鞭、五爪風、翻天亮，以各適當的重量煮水，冷後灌服。

(四方) 大血藤、小血藤、白部、葛根、小黃連，把以上藥捶爛，用淘米水浸泡，去掉藥渣灌服。

(五方) 炮甲6錢、蛇退（焙枯）1錢、蜂蜜1兩、燒酒1兩，調勻灌服（服前先用浮萍，或辣蓼草，或皂角熬水，洗病豬的身上）。

(六方) 水楊柳、水蝦公、車前草、細葉馬蹄、細辛、青魚胆、毛細辛、臘樹葉、欽馬鞭，捶爛，浸在淘米水里，揉出藥汁，過濾盛好，放進豬欄內，讓豬自食。

豬喘氣病

豬喘氣病病原是一種濾過性的病毒。喂得不好，圈內潮濕，長時間在途中運輸，使豬本身對疫病抵抗力減弱，引起害病。這病根據目前情況來看，多發生在育肥豬；良種豬一般傳染率較低；土種豬發病率較高。

豬發病後，體溫不升高。嚴重喘氣，行動時表現突出，有有時還發咳嗽，精神不好，不願意動，光睡。輕病吃半食，重病不吃食，時常伏睡地下，把前肢站着，象狗一樣，坐起喘氣，一般在一周內或十幾天內死亡。

治療方法：

1、針劑和內服藥方：紫蘇、桔梗、黃芩、前胡、枇杷

叶、桑树皮、皂角、柑子叶、射干、小樺子、梔子、核桃樹寄生各半斤，麥冬、貝母、陈皮、食鹽各4兩，冰片2錢，車前草12兩、包谷漆1斤，將上藥研成粉末，加水40斤，煮沸3小時，用紗布濾去渣子，再將食鹽、冰片研末，加入藥液內，煮成2斤至2斤4兩藥水即成。注射用的藥水劑，可將上述的藥汁加以蒸餾，再取藥水1斤，與研好的冰片、食鹽混合煮沸30分鐘，取出濾過，滲入到原藥水內即成。用時先用柚子皮，塗上桐油，用火烤熱，塗擦病豬的胸脯，至起血泡為止。再用針刺破血泡，然後服藥，或注射。服藥量是：病豬每市斤重，內服1至1.5毫升（1毫升就是1西西，1,000毫升等於1市升）。注射量是：病豬每市斤重，注射1毫升。總的藥量不得超過100毫升。

2、吹藥處方：大葉荳草、天丁、刀皂、蒼朮、細辛、大黃、朴硝，研成細末，吹入喉內。

3、內服藥方：

（一方）皮硝2斤、梔子1斤，研成粉末，大豬每次4至6兩，小豬1至3兩，每天喂兩次，調在粥內，一般喂兩天至3天即好。病重可以同時注射復方奎寧，每市斤重，注射0.03毫升，每天3次。同時可把梔子煮沸半點鐘，加入皮硝溶化後過濾，慢慢注入病豬口里，按體重1市斤注入1.5毫升。

（二方）白凡3錢、玉金6錢、角刺10個、尖貝5錢、苧麻1兩、細辛4錢、黃連5錢、大黃1兩、山豆根1兩、黃芩8錢、粉草4錢、開喉箭8錢、荊芥1兩、白鮮皮1兩、天丁10個、蜂蜜2兩，將上藥研爛，加水12斤半，煮到剩下8斤為止。大豬每次服半斤，架子豬每天服1斤，小豬每次服半斤，每天3次灌服。

（三方）百部9錢、亭力6錢、尖貝4錢、玄參4錢、杏仁4錢、麥冬4錢、蜂蜜2兩（兌服），將以上的藥煎水後，

加蜜灌服。

5、注射藥方：污泥1分（陰溝泥等均可）、水1分，攪勻浸漬24小時，然後蒸餾，分裝消毒。按豬體重決定注射量，10市斤以下的豬，按每市斤在皮下或肥肉內注射1毫升；10市斤以上的豬，每市斤注射半毫升。每日早晚各一次，連續3天，再停藥1天，第五天繼續注射1次，即可治癒。

仔猪白痢

仔猪白痢發病原因很多，都係飼養管理不良所引起，主要侵害20天以內的仔猪，四季均可發病。小猪生下後，豬欄潮濕、骯髒、寒冷、營養不良，缺乏運動等，都是起病的原因。

小猪生病後精神不好，打瞌睡、喜歡曬太陽，常離羣單獨站在一邊不動，背拱起，縮成一團。屎尿開始是稀的，帶黃色，以後漸漸變成白色，或灰白色，腹瀉，有腥臭。病豬逐漸瘦削，眼睛無神，走路搖搖擺擺，最後體溫下降，虛脫死亡。

治療方法：

（一方）甘草1兩、大蒜3兩，50度燒酒4兩，混合泡兩天，再加少量的百草霜（即鍋底灰），每日喂一次（一般8錢左右）連喂兩天就好。

（二方）厚朴、檳榔、朱嶺、萸芋、白朮、澤瀉、酒藥、川柏、烏梅、枳殼、木瓜、桑葉、知母、石榴皮、黃連，混合碾成細末，用淘米水調和，再用毛筆沾着，塗在豬舌頭上。

（三方）黃土（干淨）1斤、石膏5兩、車前草6兩、貫仲3兩，分別洗干淨，研成粉子，再用開水3斤泡好。仔猪每日喂2次至3次，每次1至2湯匙。帶仔母猪每日喂1次至2次，每次喂4至6湯匙。

(四方) 狗骨头(煨焦) 4两、白头翁5两,上桂1两半、黄連1两、酒藥子3两,蒼朮1两半、雄磺1两,研成粉末,加少許大蒜液汁,用冷开水調和成糊子。喂給小猪,每日2次(以上藥物可作50头至100头仔猪的服藥量)。

(五方) 綠豆青、天花粉、地榆,煎水喂母猪;再用嫩桃子、地榆、麥芽,研成粉末,用开水調成糊子,塗在母猪奶头上讓小猪自食。

(六方) 樅樹尖尖熬水,擦在母猪与小猪身上,再給小猪灌服一湯匙。

(七方) 藟馬草、四方草、臭牡丹、銀花、羊奶奶、七月芭、金谷蓮,各适量,煎水擦在母猪与小猪身上,在母猪槽内放一点藥水。

(八方) 打欽水一斤,調在槽内,喂給母猪。

(九方) 山慈姑、地榆、白竹根,熬水和糖,喂小猪。

(十方) 大米燒焦帶黑色,研成粉末,和紅糖水喂小猪。

仔猪地方性支气管肺炎

仔猪地方性支气管肺炎病原为濾过性的病毒。侵害良种猪、仔猪,是地方性流行病。天气突然变冷,猪圈潮湿,好猪与病猪在一起喂食,長途运输,猪害感冒后,均可以造成引發和傳染这种病。

小猪病后,流清鼻涕,打喷嚏,时时咳嗽,早晚比較嚴重。全身發軟,行动无力、呼吸次数增加,复式呼吸,有时伸長頸,前腿張开。全身發燒,最高燒到攝氏40度以上。病猪精神很差,爱躺睡不动,毛乱无光泽。病程一般是慢性过程,有的十天半月,有的可延長几个月,反复發病,病畜瘦弱,停止生長。