


浙江民間常用草藥

(第三集)



浙江民間常用草藥(第三集)



人民出版社

浙江民间常用草药

第三集

浙江省卫生局编

浙江人民出版社

浙江民间常用草药

(第三集)

浙江省卫生局主编

*

浙江人民出版社出版

杭州印刷厂印刷

浙江省新华书店发行

开本: 787×1092 1/64 印张: 9 1/2

1972年6月第一版

1972年6月第一次印刷

书 号: 72-3·9

定 价: (平) 0.55 元
(精) 0.80 元

毛主席语录

备战、备荒、为人民。

中国医药学是一个伟大的
宝库，应当努力发掘，加以提高。

编 者 的 话

《浙江民间常用草药》第一、二集出版以后，得到广大工农兵读者的支持和欢迎。遵照伟大领袖毛主席“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高”的教导，我们继续编写了第三集。

在这集里，共介绍了233种中草药，附插图211幅，其中包括类似种60种。选编时，以民间及医疗单位临床较常用、各地药源较多和疗效较好为收载原则。

本书在调查资料、整理和编绘过程中，得到了浙江人民卫生实验院、杭州大学、杭州市植物园等单位的支持和协助；同时邀请了部分赤脚医生、老药农和医务人员参加审稿和定稿工作。

由于我们的调查范围和深入实际都不够，在这集里难免有缺点和错误，希望读者提出批评和意见，帮助我们改进，使本书能更好地为工农兵服务。

一九七一年十月廿五日

编写说明

一、本书处方剂量，按中医习惯一斤十六两计。除注明儿科疾病外，其他疾病处方均为成人量。

二、书中处方所列的草药，除了用鲜的外，其余都是指干的（鲜的也可以，但剂量要作适当增加）。指明用鲜的草药，一般不要用干的代替。

三、草药的药用部分，“全草”是指植物的地上部分，采集时不必连根拔起，以保护药源。但对一些植株较小，根细又入土较浅的植物，如翠云草、虎尾蕨等，就用其连根的整株植物。

四、根据读者的意见，我们对这集有关项目作了调整。把“功效和主治”分为“性味功效”和“应用”两项叙述，把“采季”改为“采集处理”，增加“中药名”和“附注”两项，前者表示该植物又是中药，后者扼要叙述部分类似种的鉴别、药理、成分等实验室资料。

五、为了便于鉴别，促进交流和推广，书中植物的中名和学名，基本上采用中国科学院编译局编订的《种子植物名称》、《孢子植物名称》和中国科学院编译出版委员会名词室编订的《拉汉种子植物名称（补编）》所采用的名称。

目 录

美舌藻(红叶藻科美舌藻属)	(1)
马勃(马勃科马勃属)	(3)
翠云草(卷柏科卷柏属)	(6)
节节草(木贼科木贼属)	(8)
瓶尔小草(瓶尔小草科瓶尔小草属)	(11)
紫萁(紫萁科紫萁属)	(13)
过坛龙(铁线蕨科铁线蕨属)	(16)
虎尾蕨(铁角蕨科铁角蕨属)	(18)
铁角蕨(铁角蕨科铁角蕨属)	(20)
贯众(叉蕨科贯众属)	(22)
瓦韦(水龙骨科瓦韦属)	(26)
槐叶萍(槐叶萍科槐叶萍属)	(29)
马尾松(松科松属)	(31)
草珊瑚(金粟兰科金粟兰属)	(35)
枫杨(胡桃科枫杨属)	(37)
构树(桑科构属)	(40)
蓼苳(桑科柘属)	(43)
柘(桑科柘属)	(45)
毛天仙果(桑科榕属)	(47)

赤车使者(荨麻科楼梯草属)	(53)
赤车(荨麻科赤车属)	(55)
赤地利(蓼科蓼属)	(59)
酸模(蓼科酸模属)	(62)
土大黄(蓼科酸模属)	(65)
漆姑草(石竹科漆姑草属)	(68)
野蚊子草(石竹科麦瓶草属)	(70)
黄山乌头(毛茛科乌头属)	(73)
湖州铁线莲(毛茛科铁线莲属)	(76)
白花藤(毛茛科铁线莲属)	(78)
木通(木通科木通属)	(80)
三叶木通(木通科木通属)	(83)
蝙蝠葛(防己科蝙蝠葛属)	(85)
头花千金藤(防己科千金藤属)	(87)
千金藤(防己科千金藤属)	(90)
山鸡椒(樟科木姜子属)	(93)
无柄紫堇(罂粟科紫堇属)	(96)
瓦松(景天科瓦松属)	(101)
景天(景天科景天属)	(104)
紫花景天(景天科景天属)	(108)
落新妇(虎耳草科落新妇属)	(110)
山海桐(海桐花科海桐花属)	(114)

蛇莓(蔷薇科蛇莓属)	(117)
翻白草(蔷薇科委陵菜属)	(120)
三叶委陵菜(蔷薇科委陵菜属)	(123)
蛇含(蔷薇科委陵菜属)	(126)
蓬蘽(蔷薇科悬钩子属)	(129)
高粱泡(蔷薇科悬钩子属)	(132)
茅莓(蔷薇科悬钩子属)	(135)
绣线菊(蔷薇科绣线菊属)	(138)
龙须藤(豆科羊蹄甲属)	(141)
野百合(豆科猪屎豆属)	(143)
小槐花(豆科山蚂蚱属)	(145)
中华胡枝子(豆科胡枝子属)	(149)
马扫帚(豆科胡枝子属)	(151)
油桐(大戟科油桐属)	(154)
南酸枣(漆树科南酸枣属)	(157)
毛冬青(冬青科冬青属)	(160)
铁冬青(冬青科冬青属)	(163)
丝棉木(卫矛科卫矛属)	(167)
野鸦椿(省沽油科野鸦椿属)	(170)
爬山虎(葡萄科爬山虎属)	(173)
青龙藤(葡萄科爬山虎属)	(176)
毛冬瓜(猕猴桃科猕猴桃属)	(178)

镊合猕猴桃(猕猴桃科猕猴桃属)	(181)
湖南连翘(金丝桃科金丝桃属)	(184)
金丝桃(金丝桃科金丝桃属)	(187)
元宝草(金丝桃科金丝桃属)	(189)
如意草(堇菜科堇菜属)	(192)
仙人掌(仙人掌科仙人掌属)	(196)
芫花(瑞香科瑞香属)	(198)
安石榴(安石榴科安石榴属)	(201)
喜树(紫树科喜树属)	(204)
大叶桉(桃金娘科桉属)	(207)
秀丽野海棠(野牡丹科野海棠属)	(211)
金锦香(野牡丹科金锦香属)	(214)
野菱(菱科菱属)	(217)
树参(五加科木五加属)	(221)
刺茎橐木(五加科橐木属)	(225)
隔山香(伞形科当归属)	(228)
紫花前胡(伞形科前胡属)	(230)
红马蹄草(伞形科破铜钱属)	(233)
水芹(伞形科水芹属)	(235)
闹羊花(杜鹃花科杜鹃花属)	(237)
杜鹃花(杜鹃花科杜鹃花属)	(240)
点地梅(报春花科点地梅属)	(243)

老鸦柿(柿科柿属)	(246)
华山矾(山矾科山矾属)	(248)
女贞(木犀科女贞属)	(252)
醉鱼草(马钱科醉鱼草属)	(256)
簇花龙胆(龙胆科龙胆属)	(259)
淡味当药(龙胆科獐牙菜属)	(261)
念珠藤(夹竹桃科念珠藤属)	(264)
娃儿藤(萝藦科娃儿藤属)	(266)
肾叶天剑(旋花科打碗花属)	(269)
老鸦糊(马鞭草科紫珠属)	(272)
莠(马鞭草科莠属)	(278)
臭牡丹(马鞭草科臭牡丹属)	(281)
腐婢(马鞭草科腐婢属)	(284)
风轮菜(唇形科风轮菜属)	(287)
光风轮菜(唇形科风轮菜属)	(291)
香薷(唇形科香薷属)	(295)
野芝麻(唇形科野芝麻属)	(298)
华芥萼(唇形科石芥萼属)	(301)
石芥萼(唇形科石芥萼属)	(303)
苏州芥萼(唇形科石芥萼属)	(306)
紫苏(唇形科紫苏属)	(310)
夏枯草(唇形科夏枯草属)	(314)

紫参(唇形科鼠尾草属)	(318)
荔枝草(唇形科鼠尾草属)	(321)
并头草(唇形科黄芩属)	(324)
白花曼陀罗(茄科曼陀罗属)	(327)
龙葵(茄科茄属)	(330)
腹水草(玄参科腹水草属)	(333)
通泉草(玄参科通泉草属)	(336)
阴行草(玄参科阴行草属)	(338)
石吊兰(苦苣苔科石吊兰属)	(341)
佛肚花(苦苣苔科佛肚苣苔属)	(344)
白接骨(爵床科白接骨属)	(346)
观音草(爵床科观音草属)	(349)
透骨草(透骨草科透骨草属)	(352)
虎刺(茜草科虎刺属)	(354)
猪殃殃(茜草科猪殃殃属)	(359)
二叶葎(茜草科耳草属)	(361)
纤花耳草(茜草科耳草属)	(365)
钩藤(茜草科钩藤属)	(367)
败酱(败酱科败酱属)	(370)
丝瓜(葫芦科丝瓜属)	(374)
兰花参(桔梗科兰花参属)	(376)
六月霜(菊科蒿属)	(378)

艾(菊科蒿属)	(381)
茵陈蒿(菊科蒿属)	(384)
四季菜(菊科蒿属)	(387)
艾蒿(菊科蒿属)	(390)
山白菊(菊科紫菀属)	(393)
东风菜(菊科紫菀属)	(396)
单头紫菀(菊科紫菀属)	(399)
刺儿菜(菊科刺儿菜属)	(402)
线叶菊(菊科菊属)	(405)
地胆草(菊科地胆草属)	(408)
一年蓬(菊科飞蓬属)	(410)
泽兰(菊科泽兰属)	(413)
大吴风草(菊科大吴风草属)	(417)
毛大丁草(菊科大丁草属)	(419)
鼠曲草(菊科鼠曲草属)	(422)
天青地白(菊科鼠曲草属)	(426)
菊三七(菊科土三七属)	(429)
羊耳菊(菊科旋复花属)	(432)
蜂斗菜(菊科蜂斗菜属)	(435)
狗舌草(菊科千里光属)	(437)
兔儿伞(菊科兔儿伞属)	(440)
水烛(香蒲科香蒲属)	(443)

薏苡(禾本科薏苡属)	(446)
牛筋草(禾本科蟋蟀草属)	(449)
淡竹叶(禾本科淡竹叶属)	(452)
日照飘拂草(莎草科飘拂草属)	(455)
牛毛毡(莎草科荸荠属)	(457)
棕榈(棕榈科棕榈属)	(459)
蒺藜(天南星科蒺藜属)	(462)
紫萍(浮萍科紫萍属)	(465)
拟灯芯草(灯芯草科灯芯草属)	(467)
肺筋草(百合科肺筋草属)	(470)
萱草(百合科萱草属)	(472)
藜芦(百合科藜芦属)	(475)
石蒜(石蒜科石蒜属)	(480)
穿龙薯蓣(薯蓣科薯蓣属)	(483)
射干(鸢尾科射干属)	(490)
蝴蝶花(鸢尾科鸢尾属)	(493)
囊荷(姜科姜属)	(496)
华无柱兰(兰科无柱兰属)	(499)
脉羊耳兰(兰科羊耳兰属)	(501)
独蒜兰(兰科独蒜兰属)	(505)
蜈蚣兰(兰科隔距兰属)	(509)
绶草(兰科绶草属)	(511)

美舌藻（石斑、蛔虫菜、鸬鹚菜）

地方名 岩头菜、岩衣（温州），鸬鹚菜（舟山）。

形态特征 藻体叶状，丛生，扁平而狭细，不很规则的叉状分枝，暗紫色，干燥后变黑，节间狭长椭圆形，节部缢缩。叶片的中央部分有显明的中肋；中肋的分枝点常生出一些次生副枝，有时也生出毛状根。四分孢子囊集生于枝的上部。囊果球状，生于枝的分枝点的上部或中肋内面。藻体初见于冬季，春、夏间成熟。（图1）

分布和生长环境 本省分布于东南沿海。繁生于海岸附近的中、高潮带的岩石上。

采集处理 6～10月采全藻，鲜用或晒干备用。

性味功效 性平，味咸，有海藻气。驱虫。

应用 驱蛔虫：鲜藻一至二两，洗净，煎服或当菜吃。据温州医学院报道，治疗777例，可总结的433例中，排蛔者382人，服药后二至三天排蛔最多，其中雌虫占排虫总数的96.4%。

附注 本品含海人草素，有驱蛔作用。




图1 美舌藻 *Caloglossa leprii* (Mont.) J. Ag.
(红叶藻科美舌藻属)

1. 全株形态；2. 植株在附着物上生长情况；
3. 有孢子的植株部分(放大)；4. 果孢子囊。

马 勃

中药名 马勃。

地方名 鬼馒头（嘉兴），灰包、牛屎拍（常山），山蟹（建德），马屁勃（兰溪、临海等），马屁（上虞）。

形态特征 子实体呈扁球形或圆球形，下有短柄，大小不等，通常直径2~3寸，大者可达7~8寸。初生时白色，内部肉质，成熟干枯后，外面呈暗褐色，外皮薄膜质，极易剥落，内部呈海绵状，质松软而有弹性，棕褐色或紫灰色，含无数微细的球形孢子，触之即如尘烟飞散。子实体夏秋季成熟。（图2）

分布和生长环境 全省各地都有分布。生于山间阴湿的林地、草地上和丘陵地的草丛中与竹园内阴湿处。

采集处理 通常7~9月间采集（过早未熟，过迟则枯）。采后晒干即可。取马勃去壳（皮层），剪片，即成马勃海绵。内部粉尘（孢子），经高压消毒即成马勃粉剂。

性味功效 性平，味辛。收敛，止血，散热消