

中医研究院广安门医院 编

韦文贵眼科临床经验选

人民卫生出版社

7

01443

韦文贵眼科临床经验选

中医研究院广安门医院

長十萬九千九百九十九

人民卫生出版社

韦文贵眼科临床经验选

中医研究院广安门医院

人民卫生出版社出版

(北京市崇文区天坛西里10号)

北京通县印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

787×1092毫米32开本 7 $\frac{1}{2}$ 印张 166千字

1980年 10月第1版第1次印刷

印数：1—11,300

统一书号：14048·3880 定价：0.56元

前 言

韦文贵老医生年近八旬，杭州人氏，自幼随父学医，从事中医眼科工作已六十余年。韦老继承祖传“金针拨白内障手术”曾使很多白内障患者，重见光明；韦老诊治眼科常见病、多发病以及某些疑难眼病，有丰富的临床经验，他对角膜病和视神经萎缩更有独特见解，临床疗效显著。为了继承和发扬祖国医学遗产，认真做好老中医经验的整理工作，使之更好地为实现四个现代化服务，我院组织力量，整理编写《韦文贵眼科临床经验选》一书。

本书所载仅系韦老近二十余年的部分验案，全书内容分两部分，第一部分是韦老对18种眼病（87例）的治疗经验；第二部分重点介绍经验方和常用方。

本书是在韦老的指导下，由我院眼科全体同志共同搜集资料；韦玉英医生主要执笔，高健生、沈德础等医生参加整理编写而成。因限于水平，时间仓促，错误之处在所难免，敬请读者批评指正。

中医研究院广安门医院

1978年11月

目 录

第一部分 眼科临证经验	(1)
急性卡他性结膜炎	(1)
巩膜炎	(4)
麻痹性斜视	(11)
真菌性角膜溃疡并前房积脓	(16)
匍行性角膜溃疡	(18)
树枝状角膜溃疡	(23)
角膜翳	(32)
青光眼	(40)
老年性白内障	(52)
视网膜静脉周围炎	(56)
中心性视网膜脉络膜病变	(72)
渗出性视网膜炎	(82)
视网膜色素变性	(86)
视神经乳头炎	(90)
球后视神经炎	(94)
小儿视皮质盲	(103)
视神经萎缩	(108)
儿童视神经萎缩	(119)
(一) 结核性脑膜炎后(四例)	(120)
(二) 化脓性脑膜炎后(三例)	(127)
(三) 肺炎合并脑炎后(四例)	(132)

(四)乙型脑炎后(一例)	(138)
(五)中毒性脑炎后(二例)	(141)
(六)重型破伤风脑病后(一例)	(146)
(七)中毒性痢疾后(二例)	(148)
(八)外伤后(二例)	(151)
(九)急性球后视神经炎后(二例)	(153)
(十)麻疹高烧后(一例)	(155)
(十一)原因不明者(二例)	(157)
第二部分 经验方及常用方	(165)
内服药	(166)
(汤剂)	(166)
一、疏风剂	(166)
(一)经验方	(167)
1.偏正头风方	(167)
2.湿热头痛方	(167)
3.风热头痛方	(167)
4.见风流泪方	(168)
5.平肝止泪方	(168)
6.双眼肿胀如桃方	(169)
7.治蟹珠方	(169)
8.补肝散	(169)
(二)常用方	(170)
9.羌活胜风汤	(170)
10.防风羌活汤	(170)
11.驱风一字散	(171)
12.驱风散热饮	(171)
13.除风清脾饮	(171)
二、清热剂	(172)
(一)经验方	(173)

14. 红肿翳障方	(173)
15. 退红良方	(173)
16. 退眼角红方	(174)
17. 菊栖散热饮	(174)
18. 红肿痛方	(174)
19. 治脓漏眼方	(175)
20. 经常流泪方	(175)
21. 消炎退障方	(176)
22. 眼珠痛如针刺方	(176)
(二) 常用方	(176)
23. 龙胆泻肝汤	(176)
24. 导赤散	(177)
25. 三黄汤	(177)
26. 目珠突出方	(178)
三、泻下剂	(178)
(一) 经验方	(178)
27. 泻火解毒方	(178)
28. 破赤丝红筋方	(179)
29. 眼珠灌脓方	(179)
(二) 常用方	(179)
30. 大承气汤	(179)
31. 泻脑汤	(180)
四、祛痰剂	(181)
常用方	(181)
32. 正容汤	(181)
33. 牵正散	(182)
34. 二陈汤	(182)
五、利水、祛湿剂	(182)
(一) 经验方	(183)

35. 治暑湿头痛方	(183)
(二) 常用方	(183)
36. 五苓散	(183)
六、舒肝剂	(184)
(一) 经验方	(184)
37. 逍遥散验方	(184)
38. 止痛散	(185)
39. 和胃止呕方	(186)
40. 双目干痛方	(186)
(二) 常用方	(186)
41. 逍遥散	(186)
42. 丹梔逍遥散	(187)
43. 柴胡参术汤	(187)
七、平肝剂	(188)
经验方	(188)
44. 青光眼三方	(188)
45. 慢性青光眼方	(189)
46. 平肝退翳明目方	(189)
47. 平肝养血明目方	(189)
48. 养阴平肝止痛方	(190)
49. 平肝熄风止痛方	(191)
50. 平肝熄风降压方	(191)
八、理血剂	(192)
(一) 经验方	(192)
51. 眼底出血四方	(192)
52. 瘀血灌睛方	(193)
53. 泻火破瘀退赤方	(193)
54. 活血芩连汤	(194)
55. 丹梔四物汤	(194)
56. 滋阴降火汤	(194)

57. 滋阴降火四物汤	(194)
58. 活血祛风止痒方	(195)
(二) 常用方	(195)
59. 桃红四物汤	(195)
60. 血府逐瘀汤	(196)
61. 补阳还五汤	(196)
62. 坚血明目饮	(197)
九、补气剂	(197)
(一) 经验方	(197)
63. 加味定志汤	(197)
(附方)	(198)
定志丸	(198)
(二) 常用方	(198)
64. 四君子汤	(198)
(附方)	(198)
(1) 异功散	(198)
(2) 六君子汤	(199)
(3) 香砂六君子汤	(199)
65. 补中益气汤	(199)
66. 调中益气汤	(199)
67. 益气聪明汤	(200)
68. 人参补胃汤	(200)
69. 助阳活血汤	(200)
70. 生脉散	(201)
71. 升阳益胃汤	(201)
72. 神效黄芪汤	(202)
73. 参苓白术散	(202)
十、补血剂	(203)
(一) 经验方	(203)
74. 补气养血方	(203)

(二)常用方	(203)
75.四物汤	(203)
76.知柏四物汤	(204)
77.当归养荣汤	(204)
78.四物补肝汤	(205)
79.除风益损汤	(205)
80.八珍汤	(206)
〔附方〕	(206)
当归补血汤	(206)
81.十全大补汤	(206)
〔附方〕	(207)
(1)人参养荣汤	(207)
(2)河间当归汤	(207)
82.归脾汤	(207)
十一、温中剂	(207)
常用方	(208)
83.理中汤	(208)
〔附方〕	(208)
附子理中丸	(208)
84.吴茱萸汤	(208)
十二、滋补剂	(208)
(一)经验方	(209)
85.平肝镇惊安神方	(209)
86.眼底出血二方	(209)
87.眼底出血三方	(210)
88.青盲方	(210)
89.瞳仁散大方	(211)
90.养阴清热明目方	(211)
(二)常用方	(212)
91.补水(肾)宁神汤	(212)

92. 六味地黄汤	(212)
〔附方〕	(213)
(1) 知柏地黄汤(丸)	(213)
(2) 杞菊地黄汤(丸)	(213)
(3) 滋阴肾气丸(又名明目地黄丸)	(213)
93. 明目地黄汤(丸)	(213)
94. 滋阴地黄汤	(214)
95. 四物五子汤	(214)
96. 三仁五子汤	(215)
97. 沙参饮	(215)
98. 酸枣仁汤	(216)
十三、和解剂	(216)
99. 小柴胡汤	(216)
100. 四逆散	(217)
十四、治痢剂	(217)
(一) 经验方	(218)
101. 雀目内障方	(218)
102. 小儿疳积上目方	(218)
(二) 常用方	(219)
103. 猪肝散	(219)
十五、退翳剂	(219)
(一) 经验方	(220)
104. 新老翳障方	(220)
105. 四物退翳汤	(220)
(二) 常用方	(221)
106. 消翳汤	(221)
十六、宣窍剂	(221)
常用成药	(222)
107. 安宫牛黄丸(散)	(222)
〔附方〕	(223)

牛黄清心丸	(223)
108.至宝丹	(223)
109.紫雪丹	(223)
110.紫金锭	(224)
〔丸、散、膏、丹剂〕	(225)
(一)经验方	(225)
111.犀角地黄丸	(225)
112.明目还睛丸	(226)
113.内障蕤仁丸	(227)
114.内外障丸	(227)
115.镇肝明目羊肝丸	(228)
(二)常用成药	(228)
116.石斛夜光丸	(228)
117.桑麻丸	(229)
118.磁朱丸	(229)
119.黄连羊肝丸	(230)
120.拨云退翳散(丸)	(230)
121.肾气丸	(231)
122.还少丹	(231)
123.防风通圣散(丸)	(232)
外用药	(232)
〔散剂(药粉)〕	(232)
经验方	(232)
124.犀黄散	(232)
125.珠黄散	(233)
126.明目清凉散	(233)
127.荸荠退翳散	(233)
128.朱砂拨云散	(234)
129.止泪散	(234)
〔膏剂〕	(234)

经验方	(235)
130. 凤凰油膏	(235)
131. 麻蜂膏	(235)
132. 蚕砂膏	(235)
133. 炉蜂膏	(235)
134. 犀黄膏	(236)
(洗剂)	(236)
经验方	(236)
135. 桑明液洗剂	(236)

第一部分 眼科临证经验

急性卡他性结膜炎

本病为细菌性感染所引起的一种急性流行性结膜炎症。临床表现以结膜明显充血及粘液或粘液脓性分泌物多为其特征。多发于春夏两季，托儿所、小学校等集体单位，每因疏忽预防工作，使感染广为传播。

祖国医学认为本病属于“天行赤眼”和“暴风客热”等证的范畴。因其发病急剧，传播迅速，流行广泛，故俗称“暴发火眼”。中医文献很早就有本病的记载，如元代危亦林所著《世医得效方·天行赤目》条下说：“目忽赤肿，晨昏痛涩，长幼相似，此天行时疾”。明傅仁宇所著《审视瑶函·天行赤热症》中说：“此症目赤痛，或脾肿头重，怕日羞明，泪涕交流等病，一家之内，一里之中，往往老幼相传……天时流行，热邪感染”，“若感染轻而本源清，邪不胜正者，七日自愈”，“七日不愈，而有二七者，乃再传也，二七不退者，必其触犯及本虚之故，须防变生他症矣”。清刘耀先所著《眼科金镜·天行赤眼症》中记载：“天行赤眼者，谓天地流行毒气，能传染于人，一人害眼，传染一家，有虚实轻重不同，其病状赤肿热泪，痛涩难睁，虽肿痛不忍，终不伤黑睛瞳人也”。综合以上文献，对本病的症状、病因、病程以及预后等都作了概括的描述。

验案(二例)

〔病例一〕 张×× 女 7岁 门诊号:12304。初诊日

期：1958年9月6日

代诉：双眼红痛，眵多粘结，不能睁眼已一天。

病史：二天前开始双眼异物感、灼热感，昨天双眼红痛、羞明、眵多泪少、晨起眵多干结而不能睁眼、大便偏干。三天前和邻居红眼病患儿有接触史。

检查：双眼睑中度红肿、球结膜高度充血、角膜附有粘液脓性分泌物，失去正常光泽，用棉棍擦净后显现清亮。

脉象：弦细而滑数。

舌象：舌质红，舌苔微黄。

诊断：双眼天行赤眼。

辨证：脾肺实热复感时气邪毒，上犯目窍。

治则：泻火解毒，疏风清热。

方药：1.退红良方加减：生大黄10克 炒栀子6克 白菊花6克 密蒙花10克 连翘10克 草决明10克。水煎服三剂

2.犀黄散一瓶，点双眼一日三次，点后闭眼五分钟。

服药三剂，睑球结膜充血消失，自觉症状消退，停止服药。犀黄散点完为止，巩固疗效。

〔病例二〕 陈× 男 10岁 门诊号：79607。

初诊日期：1964年8月22日

主诉：双眼红痛、分泌物多、怕光、流泪已七天。

病史：十天来双眼白睛红赤，痛涩难睁，灼热羞明，眵多而粘稠，晨起封住双眼，眼泪不多，大便燥结，有时带血，小便黄少。

检查：双眼视力右1.0，近视力耶格表1；左0.8，近视力耶格表1。

双眼睑中度红肿，球结膜高度充血，色鲜红，伴有水肿，角膜因分泌物粘附欠清亮，荧光素染色阴性。

脉象：弦数。

舌象：舌质红，舌苔黄腻。

诊断：双眼天行赤眼。

辨证：脾有实热，肺火炽盛，复感时气邪毒，上攻目窍。

治则：泻火解毒，清热疏风。

方药：大承气汤合退红良方加减：生大黄12克 炒枳壳6克 元明粉6克 生地15克 草决明10克 黄芩5克 炒栀子10克 连翘6克 荆芥5克 生甘草3克。水煎服。

二诊8月29日：服药五剂后，羞明涩痛减轻，眵泪减少，大便秘、小便清。

检查：双眼视力右1.0 近视力耶格表1，左0.9 近视力耶格表1。

双眼睑红肿基本已消，球结膜轻度充血，角膜清亮。脉弦细而数。舌质稍红，苔微黄。腑气已行，风热未尽。治以疏风清热为主。方药：荆芥5克 蝉蜕3克 防风5克 苏叶3克 木瓜3克 黄芩6克 桔梗6克 连翘6克 草决明10克。水煎服。

三诊9月7日：服药七剂，双眼自觉症状已全部消失，晨起有少许眼眵，其它正常。

检查：双眼视力1.0 近视力耶格表1。双眼睑、球结膜充血已消。脉细而微数。舌质淡红，苔薄白。病症已愈，为防后患，继清余热。治宜祛风清热。方药：甘菊花6克 黄芩3克 荆芥3克 炒栀子10克 连翘5克 草决明10克 三剂。

〔按语〕 上述病例，根据韦老的经验，都是脾肺实热，感受时气邪毒，内外合邪，上攻目窍，因其眵多泪少，故为“天行赤眼”。虽然上述病例体质有强弱，邪毒有轻重，病程有长短的不同，但在治疗上根据急则治标的原则，重点是泻火解毒通腑为主，疏风清热为辅。病例一，已七岁，虽邪气盛，但正气足，治疗及时，在退红良方加减中，生大黄重达10克，服药三剂，并点犀黄散眼药而愈。例二年龄10岁，邪毒较重，邪胜于正，故迁延已十天，用大承气汤合退红良方加减化裁，方中生大黄重达12克，复加元明粉6克，以助泻火通腑之力，而达釜底抽薪之目的。腑气通畅，热毒大减，改用疏风清热之法，以肃余邪。

对于急性炎症的病人，韦老常用生大黄，这是“上病下治”在眼科临床的运用。

此外，对眼部刺激症状重的病人，经常用三稜针耳后静脉放血3至5滴，这对减轻症状，缩短疗程有一定的作用。因耳后是足少阳胆经所走行的部位，胆经“起于目锐眦，上抵头角，下耳后”。放血目的是通经活络，消炎止痛。

巩 膜 炎

本病多发生在巩膜前部，局部巩膜充血，眼球疼痛和局部压痛明显，伴有紫红色结节隆起，临床特点是反复发作，病程可迁延数月，甚至数年之久。

祖国医学称本病为“火疳”。明代王肯堂在《证治准绳·火疳症》中说：“火疳症……在气轮为害尤急，盖火之实……初起如椒疮榴子一颗，小而圆或带横长而圆，如小赤豆，次后渐大，痛者多，不痛者少。”对本病之病因、症状作了详细的记载。