



《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

一〇一六・子部・醫家類

- 瘍醫大全四十卷（卷三十九、卷四十）〔清〕顧世澄撰……………一
- 瘍科臨證心得集三卷方彙三卷方彙補遺一卷家用膏丹丸散方一卷〔清〕高秉鈞撰
- 景岳新方歌一卷〔清〕高秉鈞 吳辰燦 姚志仁撰……………七七
- 外科證治全書五卷末一卷〔清〕許克昌 畢 法輯……………二六七
- 外證醫案彙編四卷〔清〕余景和撰……………四三五
- 解圍元藪四卷〔明〕沈之問輯……………五六九
- 外科灰餘集二卷〔清〕程國彭撰……………六五九
- 癩科全書一卷〔清〕梁希曾撰……………六八七
- 損傷科一卷〔清〕霍孔昭撰……………六九九

一〇一六・子部・醫家類

瘍醫大全

四

〔清〕顧世澄撰

據上海圖書館藏清乾隆二十
五年刻顧氏秘書本影印原書版
框高一四五毫米寬二〇八毫米

傷醫大全目錄

卷三十九

救急部

解救砒霜門主論 附方

救誤服蒙汗藥門主論 附方

救誤服酒毒門主論 附方

救誤服銀焮門主方

救誤服水銀門主方

救誤吞五金門主方

傷醫大全 卷三十九 目錄

救誤吞針門主方

救誤吞諸木竹釵門主方

救誤吞磁鋒門主方

救誤服銀粉門主論 附方

救誤服銀硃臘黃門主方

驗中蠱毒門主論 附方

解中斷腸草毒門主論

解中藥毒門主論 附方

解服鹽鹵門主論 附方

十一 顧氏秘書

中飲食門主論 附方

解燒酒毒門主論 附方

解中煤炭毒門主方

解中閉口椒毒門主方

救誤食桐油毒門主方

救誤吞田螺門主方

救誤吞桃李門主方

救誤食猪骨門主方

救誤吞雞骨門主方

傷醫大全 卷三十九 目錄

救誤中猪肉毒門主方

救誤吞頭髮門主方

救誤吞蜈蚣門主方

救誤吞螞蝗門主論 附方

救誤中蛇虺百蟲毒門主方

解中蜈蚣毒門主方

解中蜘蛛毒門主方

解中蚯蚓毒門主方

解中蠱牛肉毒門主論 附方

十二 顧氏秘書

解中馬肉門主方

解中犬馬肉門主方

解中河豚毒門主論 附方

解食魚中毒門主方

解食黃鱔魚毒門主方

解誤食毒蟹毒門主方

解中驚毒門主論

解中野菌地蕈靈芝毒門主論

解荳腐毒門主方

湯醫大全

卷三十九

目錄

三

顧氏秘書

解麪毒門主方

解中白菓毒門主方

解中輕粉毒門主方

救六畜瘟疫法

解中櫻桃毒門主方

湯醫大全卷三十九

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

精錄之柏

男 標燮用和

全校

救急部

凡解一切中毒以及誤吞金石虫蟄等證俱彙於此部中以便檢閱恭治

湯醫大全

卷三十九

解救砒霜論

顧氏秘書

解救砒霜門主論

雷直君曰世人有服砒霜之毒五臟欲裂者腹必大

痛舌必伸出眼必流血而死最可憐也急用瀉毒

神丹飲之如立時大瀉則生否則死矣此砒毒已

入於臟非可用羊血生甘草上吐能愈特又變下

法救之飲之如不瀉此腸已斷矣又何救乎倘用

之早未有不生者不可執吐法而無變通若初飲

砒霜但飲甘草羊血立吐而愈如不吐速用瀉毒

神丹瀉之則無不救矣 活人錄

凡中砒毒其證煩躁如狂心腹攪痛頭旋欲吐不吐
面色青黑四肢極冷者是

凡服砒人不可仰臥恐毒流四肢難治愈後須忌百

日烟酒姜椒煎炒 願德集

凡中信毒因氣惱自服者急用香油一碗灌之或吐

或下即活若係酒調者難救其毒發散於週身也

陳遠公曰服砒毒疼欲死若不急救必腐腸胃吐紫

血而死蓋砒石乃天生之石不會經火煨煉何毒

至此不知砒石生南岳之山鍾南山火毒又經火

傷醫大全 卷三十九 解救砒霜論 一 顧氏秘書

氣則其性大執有火毒加之大熱酷烈之至安得

不殺人哉性又善走砒石下喉必升降於腸胃之

上下往來數十次腸剝皮穿人乃死矣疼欲死者

正毒氣上下攻也毒藥之橫莫此為甚治法必吐

出其毒然不能盡出其毒也必用解毒之味但初

下喉以羊血吐之亦有能生之者食久入胃則無


益矣宜用救死丹久暫皆可救用生甘草一兩元

參二兩地榆五錢瓜蒂七箇水煎下喉即吐煮渣

服之又吐砒毒全解矣 甘草解毒得瓜蒂必上涌而吐砒能上升故引之盡

出也然砒又下行得元參地榆解大腸之火毒砒
之大毒已從上而出走下者亦餘毒耳得二味解
之則上下共相解紛毒又何能施其燥烈哉况元
榆俱潤中解毒所以能制毒也此方十可活八若
不吐者此腸胃已壞不可救矣非方不效也倘藥
不及煎於飯粥中煮灌之庶不至因循失救也

傷醫大全 卷三十九 解救砒霜論 三 顧氏秘書



解救砒霜門三方

解信毒法 願體集

速取梁上燕子窠用井水三四大碗放水桶內將手多攪調之用夏布手巾如榨腐法濾去泥葉取

所攪之水連灌二三碗自吐不吐再灌吐盡方醒

初中砒毒 雷真君活人錄吐法

生甘草叁兩急煎湯加羊血半碗和勻飲之立吐即愈飲之不吐速用下法

瀉毒神丹 雷真君活人錄下法

湯醫大全 卷三十九 解救砒霜方 四 願氏秘書

當歸 三兩 大黃 一兩 白礬 一兩

生甘草 五錢

水煎湯數碗飲之立時大瀉則生否則死矣

又方

黑鉛一兩磨水灌之

凡中砒霜一切毒藥垂死者

急用上號潔白糖說花淡荳豉甘草各等分研勻

冷水調灌即甦

又方

無名異 即漆匠用者 和生雞蛋清攪勻服之

又方

陳壁土攪水灌之

又方

急飲人溺及人糞汁或金汁灌之

又方

虎耳草葉洗淨搗汁攪冷水灌之

又方

牙硝不拘多少研末冷水調下

湯醫大全 卷三十九 解救砒霜方 五 願氏秘書

又方

生鴨血灌之

又方

小薊根搗汁灌之

又方

大黃明礬研末新汲水調灌之得吐利即解

誤中砒毒橫身紫紫百解不效此名砒霜紫瘡

黃土地上挖一斗大坑以井水滿之攪令渾濁以

一碗與之少刻又與之待渾身紫紫俱散一吐即

甦雖冬月間亦宜用此法必效

解砒霜及一切草藥六畜肉中毒

白花扁豆經過霜者生收晒乾研末用新汲水調服三錢

又方

直萊豆粉 黃土 各四兩

研極細用生雞蛋清九個共一處以浸萊豆冷水和稀服之即解若有黑羊血再灌碗許更妙

又方

癆醫大全

卷三十九 解救砒霜方

六 顧氏秘書

天竺菓煎服如無取根搗汁煎服亦可

又方

明礬三錢研末冷水攪勻送下一吐即愈

又方未盡用萊豆甘草夏枯草煎湯冷服

生漆搗子瓦上煉存性研末滾湯沖服五分

救誤服蒙汗藥門主論

蒙汗藥大約用天仙子為君加入狐心等物雖不殺人然令人迷而不醒山東村店多乘心迷以取財物醒來全不記憶恍惚不能辨別所以道途誤服蒙汗藥以致頭重足輕口吐涎沫目矇不言此迷心之故也雖不殺人久迷不醒亦可畏人以凉水解之亦能少甦但凉水入心水停心下倘虛人必變他症

癆醫大全

卷三十九 蒙汗藥論

七 顧氏秘書

或曰此症必是痰迷心竅宜以生姜開之投以姜汁乎殊不知藥中天仙子居多得姜則愈迷其心矣故不可用也

解誤服蒙汗藥門主方

止迷湯

白茯苓 五錢 生甘草 三錢 瓜蒂 七個

陳皮 五分

水煎服即大吐而醒其從前事斷不遺忘不似

凉水之解如醉如癡也

又方

飲冷水即安

醫醫大全

卷三十九

蒙汗藥方

八

顧氏

救飲鳩酒毒門主論

凡飲鳩酒白眼朝天身發寒戰忽忽不知大醉之狀
心中明白但不能言至目閉即死夫鳩毒乃鳩鳥
之糞非鳩之羽毛亦非鶴頂紅也鳩羽與鶴頂紅
皆不能殺人不遇生病惟鳩糞則毒此鳥出異國
異國人恐言鳥糞則人必賤之故但言鳩以貴重
之也此鳥非蛇蝎不食故毒甚於孔雀之糞孔雀
糞冲酒飲有死有死者而飲鳩則無不死也益
鳩毒性熱功緩善閉人氣所以不能言發寒戰者
心中熱毒心脉通目大背心熱則目必上視目閉
而死者心絕目乃閉也幸其緩可施救 鳩音逞

醫醫大全

卷三十九

鳩酒毒論

九

顧氏私書



救飲鴆酒毒門主方

消鴆

金銀花 八兩煎取汁二碗入

白礬

寒水石

天花粉 各三錢

石膏蒲 二錢

麥冬 五錢

全煎灌之，一時後目不上視口，即能言矣。再照方減半煎湯，二劑全愈。

傷醫大全

卷三十九

鴆酒毒方

十一

顧氏秘書

救誤服銀硝門主方

驗方

濃煎烏梅湯灌之，即解。

又方

黃泥水服兩茶鍾，即解。

傷醫大全

卷三十九

誤服銀硝方

十二

顧氏秘書

救誤服水銀門主方

驗方

揀開口花椒二兩吞下即裹水銀從大便出

湯醫大全

卷三十九

誤吞水銀方

主

顧氏秘書

救誤吞五金門主方

誤吞金銀銅鐵錫

蠶豆炒研末砂糖調服其物從大便出

又方

猪板油全青葉煮食自出

吞金 丹方

羊脛骨燒焦研末參錢米飲調下從大便出

吞鐵物 丹方

栗樹炭二塊將鐵錘搗極細砂糖和細丸米飲送

湯醫大全

卷三十九

誤吞五金方

主

顧氏秘書

下三錢立出

吞銅錢

羊脛灰煮粥食之

吞銅錢或銅

多嚼生葶藶食之自化

吞金

紅棗煮爛不時食之金從大便自出

吞金銀銅錫

先飲生鴨血杯許再多食炒蠶豆不切熟韭菜其

物即從大便裏出

吞鐵

艾蒿一把判以水五升煮取一升頓服即下

吞錢在喉不出

麩炭末指彈入喉中其兒當即咯出

吞釘及箭金針鐵

多食肥羊肉及諸肥肉自裏出

吞金環及釵

飴糖一觔一頓漸漸食盡多食之環及釵便出

傷醫大全

卷三十九 誤吞五金方 十四 顧氏秘書

知是服金屑死而未絕者

水銀一兩灌口中搖動令下咽喉入腹金即消滅

成泥而出

解金銀銅鐵毒

鴨尿汁解之

一人以銅條兩個作戲法由鼻孔進而從口出忽一

日銅條滑入腦中奇癢難忍無法可救黃公曰尔

磕我三百個頭我當救尔其价即連磕其頭叩未

百餘其銅條從鼻出此亦聰明人慧心智囊耳

吞錢

桑柴燒灰研末米飲調服二錢

又方

萊豆粉冷水調服三錢

又方

多服飴糖

誤吞金銀銅鐵

砂糖同砂仁煎濃湯多服自下

傷醫大全

卷三十九 誤吞五金方 十五 顧氏秘書

救誤吞針門主方

吞針入腹

蠶豆煮熟同生韭菜食之針從大便而出

又方

櫟炭末井水調服三錢

又方

蝦蟇眼睛一對冷水送下針穿眼內而出冬月無蝦蟇在

桑根下尋

又方

湯醫大全

卷三十九

誤吞針方

七

顧氏秘書

黑砂糖和黃泥為丸吞下泥即裹針在大便中出

誤吞針刺咽中痛者

亂麻筋一團搓龍眼大以線穿繫留線頭在外以

湯浸濕急吞下咽頃刻扯出其針必刺於麻中而

出如一回不中節再吞再扯

又方

雄磁石研末水丸如櫻桃大吞下即服通利之藥

針從大便而出

針入咽喉無藥可施

癩蝦蟇數個將頭剝去倒垂流血以酥接之得一

盃許灌入喉中移時連針吐出針自軟曲

又方

舊豸離蝦存性研末每服三錢酒調服亦能化蠟

又方

將半生半熟出非蠶豆搗爛以韭汁為丸吞下

又方

磁石如荔枝大吞之其鍼立出

又方

湯醫大全

卷三十九

誤吞針方

七

顧氏秘書

磁石研細將蒜攪和搗如針大小涼水下吞針從

大便出



誤吞諸木竹釵門主方

驗方

取剪刀故鋸燒赤入漬酒中以女人大指甲二枚
燒存性研末和服

吞桃枝竹杖

但口中數數多食白糖自消去

木屑喉

鐵斧磨汁灌之

竹絲鯁

湯醫大全

卷三十九 誤吞諸木竹釵方

六

顧氏秘書

不拘黑白芝蔴炒熟泡湯飲再以乾芝蔴嚼服幾
口或以生芝蔴搗爛嚼食

救誤吞磁鋒門主方

驗方

生紅蘿蔔搗爛吞下其磁鋒即從大便而出

湯醫大全

卷三十九 誤吞磁鋒方

九

顧氏秘書

解誤服銀粉門主論

凡服鉛粉者非婦女角口憤不欲生冀其鉛能墜腸而頰更有婦女打胎服之不惟不效每致求生不得欲死不能且生了多癡呆身體發瘡毒更有因服銀粉鑽筋入骨老來遍身筋骨疼痛無法可療此故自取之也深可憫焉特立此門救之新增其兒證面色呈青腹中墜痛欲死者是

楊醫大全

卷三十九

誤服銀粉論

三

楊氏秘書

解誤服銀粉門主方

驗方

麻油

黃蠶

紅紗糖

攪勻服之

又方

多食生薑膏即解

又方

香油灌之即解

又方

楊醫大全

卷三十九

誤服銀粉論

三

楊氏秘書

急搗蘿蔔汁飲之