

山西中草藥

续编

山西中草药

(续编)

滕崇德 李继瓚 杨懋琛 钱玉华 编著

山西人民出版社

一九七九年

前 言

近年来，我们结合教学和科研工作，通过实地调查访问，收集了我省所产的中草药标本和一些土、单、验方，现根据有关文献资料，编写成书，供广大医药卫生工作者在认药、采药、用药和发掘新药源时参考。

本书收载了《山西中草药》（山西人民出版社，1972年出版）中未编入的中草药，共计311种（包括植物药281种，动物药30种），作为《山西中草药》的续编本。

为了便于准确的认识中草药，每味药均有附图（共有黑线图196幅、彩图68幅）。这些图绝大部分是由赵耀青、滕崇德和沙心苓三位同志根据实物绘制的，贾炜玲、沈晓聪和赵宗普等同志曾帮助我们绘制了部分图。

根据“全国中药药剂计量会议”的精神，本书的剂量，一律采用米制，以“克”为单位，即十两为一斤的旧制的一钱等于3克，尾数不计。

在本书编写过程中，山西省卫生局、山西大学教育处和生物系的领导同志曾给予我们多方面的支持，山西省中医研究所、山西省药品检验所、山西医学院和附属医院等单位的有关同志曾对书稿进行了审阅，编者在此一并致谢。

由于我们的水平有限，又缺乏临床经验，书中可能有缺点错误，请批评指正。

编 者

山西中草药(续编)

滕崇德 李继璜 编著
杨懋琛 钱玉华

*

山西人民出版社出版 (太原并州路七号)

山西省新华书店发行 山西省七二五厂印刷

*

开本: 787×1092 1/32 印张: 11 字数: 215千字 插图: 70幅

1981年5月第1版 1981年5月太原第1次印刷

印数: 1—2,000 册

书号: 14088-63 定价: 3.40 元

目 录

一、解 表 药..... 1	文冠果.....23
(一) 辛凉解表药..... 1	勾儿茶.....24
沙 米..... 1	水金凤.....25
木 苳 蓼..... 2	水杨梅.....26
铁线草..... 3	白花菜.....27
蝇子草..... 4	北寄生.....28
异叶青兰..... 5	田旋花.....29
(二) 辛温解表药..... 7	地蔷薇.....30
青 兰..... 7	扁担杆.....31
牛 枝 子..... 8	臭梧桐.....32
水蜈蚣..... 9	丝棉木.....33
壮筋草.....10	爬山虎.....34
附地菜.....11	莲 子 蕹.....35
二、祛风湿药.....13	棉花团.....36
木 瓜.....13	箭 叶 蓼.....37
女 菱.....14	紫茉莉.....37
沙 枣.....15	野蔷薇.....38
杜 松.....16	天蓝苜蓿.....40
圆 柏.....17	麻 叶 荨 麻.....41
草 藤.....18	毛蕊老鹳草.....42
垂 柳.....19	草木犀状黄芪.....43
八角枫.....21	三、祛湿利水逐水药.....45
山合欢.....22	(一) 祛湿利水药.....45

水葱	45	融瓣花	71
苜蓿	46	阿尔泰紫菀	72
女娄菜	47	蒙古山萝卜	72
冬葵子	48	(二) 清热解毒药	73
龙须草	49	飞廉	73
百蕊草	50	毛茛	74
芨芨草	51	玉簪	75
狗尾草	52	白英	76
歪头菜	53	玄参	77
枳椇子	54	苦菜	79
蜈蚣七	55	牡蒿	80
水葫芦苗	56	红葵	81
糙叶黄芪	57	地钱	82
西伯利亚蓼	58	蛇莓	83
鲤鱼	59	荞麦	84
(二) (逐水药)	59	楸树	85
泽漆	59	茅莓	86
千金子	61	枸杞	88
田螺	62	糙苏	89
鲫鱼	63	蕨麻	90
鲶鱼	64	梧桐	91
四、清 热 药	65	薹菜	92
(一) 清热泻火药	65	大丁草	93
苋菜	65	大白蒿	94
山木通	66	大蓬蒿	95
地梢瓜	67	万寿菊	96
秃疮花	68	马断肠	97
茶条木	69	山白菊	98
望江南	70	天竺葵	99

风轮菜	100
风毛菊	101
白刺花	102
无花果	103
东风菜	104
羊眼花	105
花苜蓿	106
仙人扇	107
丛枝蓼	108
金龟草	109
四叶葎	110
半枝莲	111
草木樨	112
苦苣菜	113
葛仙米	114
狼把草	115
垂盆草	116
细野麻	117
凹头苋	118
寄马桩	119
蛇白药	120
香茶菜	121
柳穿鱼	122
硬阿魏	123
零陵香	124
紫杆蒿	125
咽喉草	126
荔枝草	127
斑叶兰	128

繁穗苋	129
白茎鸦葱	130
大画眉草	131
爪虎耳草	132
刺果粉藜	133
鸡腿苋菜	134
烟管头草	135
鬼箭锦鸡儿	136
鼠掌老鹳草	137
狼	138
泥鳅	139
蝮蛇	140
豆芫青	140
猫头鹰	141
(三) 清热燥湿药	142
香椿	142
锦葵	143
蓼蓝	144
大火草	146
石龙胆	147
苦豆子	148
美人蕉	149
毒蝇草	151
桦树皮	152
马尾黄连	153
(四) 清热凉血药	154
水芹	154
花锚	155
酸模	156

火绒草.....	157	板栗.....	183
银柴胡.....	158	榔榆.....	185
紫筒草.....	159	大叶藜.....	186
筋骨草.....	160	米瓦罐.....	187
梅花草.....	161	苦马豆.....	188
蕨叶天门冬.....	162	金鱼藻.....	189
水獭.....	163	金盏菊.....	190
五、止咳平喘药.....	165	落花生.....	191
山杨.....	165	芥麦七.....	192
白前.....	166	本氏木蓝.....	193
花葱.....	167	猩猩草.....	194
鼠李.....	168	二叶舞鹤草.....	195
千日红.....	169	叉叶委陵菜.....	196
夹竹桃.....	170	牛角腮.....	197
花楸树.....	171	珍珠母.....	198
胡枝子.....	172	(二) 活血祛瘀药.....	199
肺筋草.....	173	苍韭.....	199
暴马子.....	174	罗勒.....	200
满山红.....	175	沙柳.....	201
棣棠花.....	176	泡桐.....	202
粗毛忍冬.....	177	柳兰.....	203
披针叶黄华.....	178	醋柳.....	204
蝗虫.....	179	萝藦.....	205
六、理血药.....	180	豨薟菜.....	206
(一) 止血药.....	180	马鞭草.....	207
蚕豆.....	180	牛筋草.....	208
茅香.....	181	凤尾七.....	209
刺槐.....	182	鸟巢兰.....	210
甘薯.....	182	打碗花.....	211

竹叶椒	213
芸苔子	214
夏至草	215
鸡屎藤	216
活血莲	218
野芝麻	219
柳叶菜	220
紫荆皮	220
落新妇	221
螺丝三七	222
中华秋海棠	224
蛴螬	225
七、理气温里药	227
干檀木	227
八、止痛药	229
豌豆	229
洋金花	230
甘青铁线莲	232
九、安神镇静药	234
罗布麻	234
十、强心利尿药	236
糖芥	236
顶冰花草	237
十一、平肝熄风药	239
天麻	239
野大豆	241
麻蜥	242
蜈蚣	243
壁虎	245

戴胜	246
十二、助消化药	247
白刺	247
金露梅	248
啤酒花	249
假辣蓼	250
蓴果香薷	251
十三、补益药	253
(一) 补气药	253
白术	253
峨参	254
土黄芪	255
华山参	256
狐	258
天鹅	259
乌鸡	260
蛤蟆	260
(二) 补阴药	261
麦冬	261
榛子	263
人头七	264
女贞子	265
喜鹊	266
乌鸦	267
啄木鸟	268
(三) 补阳药	269
柘木	269
向日葵	270
铁扫帚	271

隔山消.....	272	黄鼠狼.....	285
白丁香.....	273	十六、外 用 药.....	287
野鸡.....	274	节 蓼.....	287
野鸽子.....	275	枫 杨.....	288
十四、杀虫驱虫药.....	277	刺 藜.....	289
东北鹤虱.....	277	小飞蓬.....	290
草玉梅.....	278	石龙芮.....	291
十五、固 涩 药.....	280	回回蒺.....	292
千屈菜.....	280	鹅绒藤.....	293
栓皮栎.....	281	蜘蛛.....	294
盐肤木.....	282	鼠妇虫.....	295
琉璃草.....	284	鳝鱼血.....	296

附 录

中草药化学成分简介	298
中文名索引	319
学名索引	331

一 解 表 药

(一) 辛凉解表药

沙 米

别名 沙蓬。

Agriophyllum arenarium Bieb. — 藜科。

一年生草本，高15—60厘米。茎直立，多分枝，幼时密被星状毛，后渐脱落。单叶互生，无柄，披针形或线状披针形，长2—5厘米，宽3—10毫米，先端渐尖呈刺状，全缘，基部渐狭。花两性，短穗状花序腋生，苞片先端呈刺状；花被1—3片，膜质；雄蕊3；子房卵形，柱头2。胞果圆形或卵形、扁平，周围有翅；种子扁圆形；胚环形。花期8月，果期9—10月。

生境分布 多生于沙丘，沙丘间低地或河漫滩沙地。本省主要分布于晋西、晋北及太原地区。



图1 沙蓬

采集加工 药用果实。秋末采收全草，晒干，打下果实，簸净即可。

性味功能 甘，凉。发表解热、透疹。

主治应用 感冒发烧，麻疹不透，水肿等症。（1）麻疹不透：沙米30至60克，水煎服。（2）水肿：沙米12至15克，水煎服。

木 茎 蓼

Polygonum aubertii L.——蓼科。

木本植物。茎缠绕，长达数米；皮褐色，易剥离。叶簇生，具长柄，叶片卵形，先端尖，基部心形或戟形，长4—9厘米。托叶鞘状。圆锥花序顶生或腋生，苞漏斗状，含5—8朵花，花被5裂，白色，裂片大小不等，外部3片厚而具翅，结果后花被增大，呈长圆形或倒卵形；雄蕊8；无花柱，柱头3。坚果椭圆形，有宽翅，黑色，包于花被内。



图2 木茎蓼

生境分布 生于山地杂木林林缘。本省主要分布于中条山。

采集加工 药用枝条。春、夏、秋均可采收，收后去节

和皮，晒干切段即可。

性味功能 甘，微寒。有毒。解表，清热。

主治应用 流感、四肢疼痛：木茎蓼适量，研末，每天二至三次，每次0.3至0.6克，加水二小碗，熬成一碗，温服。或配悬钩子各等分，研末内服，每次0.3至0.6克，开水冲服。

常用量 0.3至0.6克。

铁 线 草

别名 狗牙根、锅巴草、疔疮皮。

Cynodon dactylon (L.) pers. — 禾本科。

多年生草本，地下具根茎，秆匍匐地面，密结如“疤”，故称“疔疮皮”，开花时上部数节直立，高10——30厘米。叶线形，叶鞘口通常具柔毛，长1——6厘米，宽约1——3毫米。穗状花序、顶生，长1.5——5厘米，常3——6枚指状簇生，花药黄色或紫色。花果期5——10月。

生境分布 多生于路旁、河堤、沟边、田埂等处。主要分布在本



图3 狗牙根

省中条山一带及运城地区各县。

采集加工 药用全草。夏秋采收全草或嫩尖，洗净切段，晒干用。

性味功能 甘，平。解热，发汗，利尿，活血，止血。

主治应用 (1) 伤风感冒、发热，无名高热：铁线草60克，水煎服。(2) 乙型脑炎(高烧昏迷)：铁线草(根茎)120克 瓦松根(去毛)90克 藕(干品)30克 星星草穗30克 甘草60克 薄荷脑3克共研细末，温开水送服。一岁以下每次0.1克，一岁每次0.9克，每增一岁加0.6克。成人每次9至15克，日服3—5次。(3) 脚气水肿：鲜铁线草半斤，水煎，去渣，用汤炖猪肉，吃肉喝汤。(4) 荨麻疹：铁线草(根茎)120克，冰糖30克 水煎服，连服七天。(5) 脓疮(下肢溃疡)：铁线草嫩尖 白茅嫩尖各适量，共捣如泥，敷患处。(6) 外伤出血：铁线草嫩尖适量，晒干，研细面，撒伤处。

常用量 15至30克，外用适量。

蝇 子 草

别名 粘蝇草、脱力草。

Silene fortunei

Vis.——石竹科。

多年生草本。根圆柱形，稍肥厚，表面黄白色。茎簇生，直立，



图4 蝇子草

高30——60厘米，节部膨大，上端及花梗常分泌粘液汁。叶对生，披针形或倒披针形，长2——5厘米，宽3——5毫米。聚伞花序顶生，花梗中部具2苞片；萼筒棒状，有10条纵脉，常带紫红色；花瓣5片，粉红色，基部成爪，先端2深裂，裂片再细裂，喉部有2个小鳞片；雄蕊10个；花柱3。蒴果长圆形，上部略膨大，顶端6裂。种子赤黄色有瘤状突起。

生境分布 生于向阳山坡、沟边草丛中。本省中条山、霍山、闻喜、夏县、太原西山等地均有分布。

采集加工 药用带根全草。春季采挖，除去根部泥土，切段，鲜用或晒干用。

性味功能 辛、涩、凉。发表解热，活血散瘀，清热利湿，解毒消肿。

主治应用 (1) 虚劳发热：蝇子草 青蒿 鳖甲各9克 地骨皮15克 胡黄连6克，水煎服。(2) 痢疾：嗜盐菌性肠炎：全草30克 白糖30克，水煎服。(3) 蝮蛇咬伤：取鲜根十株，捣烂加开水浸5——10分钟，取汁内服，渣敷伤口周围。(4) 挫伤，扭伤，关节肌肉酸痛：根15克，加烧酒或75%酒精90克浸泡，取汁外搽伤痛处。(5) 尿路感染：全草30至60克，水煎服。

常用量 6至9克

异叶青兰

别名 白花枝子花。

Dracocephalum heterophyllum Benth. 一唇形科。




图5 异叶青兰

多年生草本，高20——40厘米，有香气。茎直立或斜上，四棱形，基部多分枝，通常下部呈暗紫色，被短柔毛。单叶对生，卵圆形或长椭圆形，长1——3厘米，宽5——15毫米，先端钝，基部心形、楔形或截形，边缘有钝锯齿，两面被短毛，背面有黄褐色腺

点，茎上部叶柄较下部叶柄短。轮伞花序，密集于茎的顶端；苞片椭圆状披针形，边缘有篦状齿，齿端有长芒刺，萼2唇形，上唇3裂，下唇2裂较上唇短；花冠长约2厘米，白色或略带粉红色；雄蕊4，2强。小坚果四个聚生，黑褐色。

生境分布 常生于山坡、山地路旁及沟沿。本省五台山、吕梁山、管涔山等地有分布。

采集加工 药用全草。夏季采收，去净杂质，晒干，用时切成小段。

性味功能 甘、辛，凉。散风宣肺，清热。

主治应用 (1) 风热感冒：异叶青兰常配菊花、薄荷、杏仁、连翘等同用。(2) 支气管炎：异叶青兰9克，水煎调白糖少许服。

常用量 9至15克。

(二) 辛温解表药

青 兰

别名 香青兰、枝子花、山薄荷。

Dracocephalum moldavica L. —— 唇形科。



图6 青兰

一年生草本，高20—40厘米，茎四棱形，多分枝，全株被短毛。叶对生，有短柄，长圆形或披针形，边缘具钝齿和刺毛。轮伞花序，每轮4花，花具短柄，花冠唇形，长20—25毫米，淡紫色，外面有毛，比萼长2倍。小坚果矩圆形。

生境分布 生于干旱山坡、路旁、地埂及原野。本省各地均有分布。

采集加工 药用花及全草。夏季割取地上部分，花期摘下花，阴干备用。

成分 含挥发油，油中主要成分为柠檬醛、香叶醇、橙花醇等。

性味功能 甘、苦，平。清热燥湿，凉血止血。