

本草綱目

卷十八上

草之七

蔓草類七十三種 附十九種

- 菟絲子本經
火蘭附 難 五味子本經 蓬蘽本經 覆盆子別錄 懸鉤子拾遺 蛇莓別錄 使君
子開寶 木鼈子開寶 番木鼈綱目 馬兜鈴土青木香
開寶 桂藤子開寶
子草附 合 預知子開寶
牽牛子別錄 旋花鎖本經
即鼓子花 紫葳本經
支附 原落附後諸種未 營實牆驪本經 月季花
綱目 桔樓天花粉 即王瓜本經 葛本經
葛鐵葛附 黃環本經
狼跋子 即 天寶冬本經 百部別錄
白
并 何首烏開寶 草薢別錄
後卷下 以 藜蕘別錄 土茯苓綱目 陳 九仙子綱目 山豆根開寶
本經 鵝抱圓經 伏雞子根拾人肝 千金藤思友附 白蘚本經 女萎李當之 赭魁
黃藥子開寶 解毒子唐本
奴會子海藥實根附 白藥子唐本
藥衝洞根 陳甘白藥會州白 威靈仙開寶
茜草本經
血藤附 剪草日華 防己本經 通草本經 通脫木法象
鱗根附 天 釣藤別錄
挂藤附 倒 黃藤
綱目 白菟蘆本經 白花藤唐本 白英本經
排風子 蘿藦唐本 赤地利唐本 紫葛唐本
烏蘇莓唐本
五葉藤 即 蓼草唐本 羊桃本經 絡石本經 木蓮拾遺
地錦附 扶芳藤拾遺 常春

藤拾遠 千歲藥別錄 忍冬別綠 即

甘藤嘉露藤附

含水藤海藥附

天仙藤圖經

紫金藤圖經

南藤開寶

百棱藤圖經

省藤拾遠

紫藤開寶

落鴈木

藥海

莓 折傷木 風延

千里及千里光

藤黃拾遠

右附方舊一百三十七新三百二十八

附錄諸藤一十九種新增一種

草之七莖草類七十三種附一十九種

菟絲子本品

【釋名】遠縷，錄菟，錄菟蘆。本經菟丘。雅赤綱錄玉女。爾唐蒙雅火燄草目野狐絲目金線草。按呂氏曰

春秋云：或謂菟絲無根也。其根不屬地。狹答是也。抱朴子云：菟絲之草下有伏菟之根。無此菟則死。又云：菟絲初生之根，其形似兔掘取割其血以和丹服立綿不老。詩誤注見則菟絲之名，別一類乎？孫炎此釋也。爾雅宏景曰：菟言下有菟也。菟言下有菟也。菟絲也。而本草菟絲未嘗與茯苓共類。女蘿之名惟松蘿附松而生。不相容。女蘿附木爲女蘿也。陸佃言在木爲女蘿。詩在草爲菟。涉皆承訛而言也。時珍曰：本草上黃別名。皆由爾雅金松蘿毛草與今能

【集解】淺而大者爲菟絲子。生朝鮮川澤田野蔓延草木之上。九月采實。暴乾色黃而細者爲赤綿。色

部松上生枝正青無雜苔說。見得之詳見

以爲一物故也。張揖廣雅菟絲一名松蘿。云菟丘菟絲也。陸佃言在木爲女蘿。詩在草爲菟。涉皆承訛而言也。時珍曰：本草上黃別名。皆由爾雅金松蘿毛草與今能

生方並以爲補藥須酒浸一宿用宜丸不宜煮「大明曰」苗莖似黃絲無根株多附田中草被纏死或勝生苗初如細絲遍地不能自起得他草梗則纏繞而生其根漸絕於地而寄空中或云無根假氣生有根及長延草物其根自斷無葉有花白色微火燒即葛絲子陽草也多生荒園古道其子入地初如枇豆而細色黃生子梗上自斷惟懷孟林中多有之入藥更良實
子脩治「敦曰」凡使勿用天碧草子真相似只是味酸澁并黏也菟絲采得去殼了用苦酒浸二日濾出以黃精自然汁相對浸一宿至明用微火煎至乾入白中燒熱鐵杵一丟三千餘杵再研末或云曝乾時入紙條數枚同搗卽刻成粉且省力也法水成粉用之時珍曰凡用以溫水淘去沙泥酒浸一宿曝乾搗之不盡者再浸曝搗須臾悉細又法浸四五日蒸曝四五次研作餅焙乾再研末或云曝乾時入紙條數枚同搗卽刻成粉且省力也

子〔脩治〕〔敦〕曰：「凡使勿用天然汁相對浸一宿至明用微火煎井黏也。萸酒成粉用之。」時珍曰：「凡用以溫水淘去沙研末或酒浸一宿曬乾時入紙條數枚同搗再浸曬搗即刻成粉且省力也。」法杵二酒浸四五日蒸曝四五次研作餅水淘去酒良薑之才曰：「得酒良薑之使惡薑。」

主治續絕傷補不足益氣力肥健人本經養肌強陰堅筋骨主薑中寒精自出溺有餘瀝口苦燥渴寒血爲積久服明日輕身延年別治男女虛冷添精益髓去腰疼膝冷消渴熱中久服去面黓悅顏色大補肝臟風虛好古

頑熱頭運怔忡。菟絲子麥冬等分。爲未。蜜丸梧子大。鹽湯每下七十丸。腰膝疼痛。或頑麻無力。菟絲子洗一兩。牛膝二兩。同入銀器內。浸一寸五分。墨爲未。將原酒煮糊丸梧子大。每空心酒送服三二十丸。三兩酒浸三日。暴乾爲末。雞子白和經驗方。肝傷目暗。丸梧子大。空心溫酒下二十丸。聖惠方。身面卒腫。洪大用菟絲子五升。漬二三宿。每飲一酒。升日。三服。不消。再造肘後方。婦人橫生。菟絲子末酒服二錢。一加聖惠方。眉鍊癰瘡。傳之。山居四要。穀道赤痛。黃黑爲未。雞子白和塗上。同。時後方。痔如蟲咬。同。

苗〔氣味〕甘平無毒。黃硫汞結草砂。

【主治】研汁塗面去面黓。本經接碎煎湯浴小兒療熱癆。宏景

【附方】新舊二面瘡粉刺菟絲子苗絞汁塗之。不過三上。肘後方。小兒頭瘡菟絲子苗煮湯頻洗之。子母祕錄。

附錄難火蘭 拾遺藏器曰一昧酸溫無毒主冷氣風子而微長去腹脹久服明日生巴中胡國狀似菟絲子開胃下

五味子本經上品

釋名至豬池除音。雅別會及五味具也。本經但云味皮肉甘酸核中辛苦都有鹹味此則玄及錄會及五味具也。本經但云味皮肉甘酸核中辛苦都有鹹味此則先也。

【集解】酸甜次出青州冀州味過酸其核並似豬腎又有建平者少肉核形不相似味苦亦良此藥多內出高麗多肉而八月采實陰乾。宏景曰今第一出高麗多肉而山谷及代郡。

月種子次年乃

【脩治】一漿〔數曰〕凡用以銅刀劈作兩片用蜜浸蒸從已至申卻以
一宿焙乾用一時珍曰入補藥熟用入嗽藥生用

【氣味】酸溫無毒。曰：「好古曰：」味酸微苦，鹹味厚氣輕陰，中微陽入太陰血分，足少陰氣分。之才曰：「蕊葵爲之珍。」

勝使烏鵲頭葵

主治 益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益男子精經養五臟除熱生陰中肌錄治中下氣止嘔逆補虛勞令人體悅澤機明目暖水臟壯筋骨治風消食反胃霍亂轉筋痃癖奔豚冷氣消水腫心腹氣脹止渴除煩熱解酒毒大生津止渴治瀉痢補元氣不足收耗散之氣瞳子散大果李治喘欬燥嗽壯

水鎮陽古好

【發明】收肺氣無補氣，則肺氣不足也。急食酸以收之，以酸收逆氣，肺氣逆則宜藥，與味同治之，收之又逆，氣而安肺，氣累曰火。必用之藥，故治嗽以之爲君，但有外邪者，不可驟用。恐閉其邪，此多惑。今既乎用治肺虛寒，則更不取其除熱必用之說。霍憲曰：「五味大能收肺熱，宣其收有補腎之藥之功，何收以之？」思邈曰：「五味子一升，大合木白，搗細，裝瓶中，以百日，宜常服。」五月常服人精神，以補五臟，加黃芪、麥冬、人參、少加黃耆湯服之，使人精神頓加。

兩足筋力亦補腎也。蓋五味子之性，輔人參，能窺內火而補庚金，收斂耗散之氣，丸、散之，亦兼類象形之。如「機」，五味治喘嗽，須分南北，津止渴潤肺，補腎勞嗽，宜用北者，風寒在肺，宜用南者。○「懷微」曰：「抱朴子云：五味之歸，始其子，有五味。淮南公羹門子服之十六年，面色如玉。女入水不濡，入火不灼。」

【附方】十
一久嗽肺脹。五味二兩。殼白鰣炒過半兩。水煎服。**○衛生家寶方**。久嗽不止。丹溪方用五味子五錢。甘草一錢半。五倍子五錢。

化消各二錢爲末乾喰○擗生功用五味子一兩真茶四錢研爲痰嗽并喘五味子白蜜等分爲末
末以甘草五錢煎膏丸綠豆大每服三十丸沸湯下數日卽愈也

於岳陽未細嘲白湯下漢陽庫兵黃六病此百藥不效普濟方一劑即得力。百日以

藥上可御十女。四時勿絕。腎虛遺精。北五味子一斤。洗淨水二斤。炭火慢熬成膏。瓶收五日。出火性。每置砂鍋中。空心三匙。

服一
劉松石保壽堂方
腎虛白濁及兩脅並背脊穿痛五味子一兩炒赤爲末配湯下三十丸。經驗良方。

泄不足二分經子不正者名曰腎泄蓋陰盛而然脾惡溼泄則濕而困則不能治水火性下流則腎水以除脾溼則利水則自矣五味去核三兩茱萸湯泡之次五錢一中正矣又如山茱萸二錢利水利小便也

同上。炒香爲末。每曰附米飲。女人陰冷。灸大椎兩穴。納陰中取效。近效方。瘧弦風眼。湯五味子蔓荳。荊芥。野葛根。水煎服。二錢。

全頓大酒濃熟研保幼子效神妙消五自大腫脹錢一津漁服丹風遊赤方子

本草綱目卷之三十一

釋名 覆盆別錄陵蘿別錄陰蘿別錄寒莓會編告田舊有時至日落而生者蘿音同此種生于丘陵之間。藤葉繁衍。蓬蘽纍累。異於覆盆。

故曰遵蔓而上名割也其實始熟俚人名蘆也

集解 別錄曰：覆盆子，生於灌木中，葉似桑葉，開黃花，實如小李，當之云是。人所食覆盆子，以津汁爲味，其核微細。今藥中用覆盆子，小異，未詳。

詳孰是。大而甘，瘠地則子細而酸。此乃子有酸味，本謂實非根也。李云：「莓子者，近之葉短，不遇時，江南謂之莓，然其地所生，差異半彈丸大，而苗八九月始有。」下有稭承花，如柳葉，小兒多食之。五月采實，今觀其苗，當四五十年，作蓬蘽，似蠶苔子，紅色而大，其味酸甘，葉似野薔薇，有刺。覆盆子小，則其苗各別。諸家本草，非一。宗奭曰：「蓬蘽非蔓，是覆盆子也。」其類有三種，惟四月熟，狀如覆盆，密多刺，根圓經以密，結實小而成朵，則夏熟，未可信也。江南覆盆亦四五月熟，則秋熟。其葉列者，校以爾雅所載，面青背白，厚而有毛，六七月開花，即本草所謂蓬蘽也。於蓬蘽亦有鈎刺，一枝五葉，葉小而面背皆青，光薄而無毛，開白花，四月熟。此種就地生蔓，長數寸，開黃花，結實如名，亦可食者。本草所謂蛇莓，陳藏器本草所謂蛇莓也。詳本草所載，則條目甚多，不可悉舉。惟見本條如此辨析，則知其根實，蓋實非根也。

【氣味】酸平無毒。良曰：「別錄曰：」鹹一甘酸微熱。」

主治安五臟，益精氣，長陰，令人堅強，志倍力有子。久服輕身不老。本經療暴中風，身熱大驚。別錄益顏色。

長髮耐寒溼
恭

【發明】見子下。覆盆。

【附方】新長髮不落。蓬蘽子榨油。日塗之。聖惠方。

苗葉
盆。蜀

覆盆子上別品

【校正】自果部移入此部。

三

指此也

【正誤】「後生非兩種物也」「覆盆江東名懸鈎子」「大土覆盆氣味功力同北土」是藤生子狀雖同而覆盆色是土地有前工者。

功亦不同。今正之夏，孟子五月采之，則日麗乾，不爾易熟。君曰：「凡使用東流水，淘去黃葉，井皮帶

脩治取說子以酒拌蒸一宿以東流水淘兩遍又曬乾方用。時珍曰：採得搗作薄餅，去黃葉，剉皮，密貯。臨

時以酒拌
蒸尤妙

【氣味】甘平無毒。〔甘權曰：辛微熱。〕

【主治】益氣輕身。令髮不白。別錄補虛續絕。強陰健陽。悅澤肌膚。安和五臟。溫中益力。療癆損風虛。補肝明目。並宜擣篩。每旦水服三錢。馬志：男子腎精虛竭。陰痿能令堅長。女子食之有子。〔權食之令人好顏色。〕

榨汁塗髮不白。器益腎臟。縮小便。取汁同少蜜煎爲稀膏。點服治肺氣虛寒。宗

【發明】〔時珍曰：覆盆蓬蘽功用大抵相近。雖是二物。其實一類而二種也。一早熟一晚熟。兼用無妨。其補益與桑椹同功。若樹莓則不可混采者也。〕

【附方】新陽事不起。覆盆子酒浸焙研爲末。每

【附方】一。陽事不起。覆盆子酒浸焙研爲末。每

葉氣味】微酸鹹平無毒。

【主治】接絞取汁滴目中去屑赤。出蟲如絲線。翳明目止淚。收溼氣。時珍。

【發明】〔頌曰：按崔元亮海上集驗方治目暗不見物。冷涼浸淫不止。及青盲天行目暗等疾。取四國草一名畢楞伽一名覆盆子日曝乾搗極細以薄綿裹之用飲男乳汁浸如人行八九里久。〕

用點目中即仰臥不過三四日視物如少年。禁酒麴油物。〔時珍曰：按洪邁夷堅志云：澤州趙太尉母病爛弦瘡眼二十年。有老嫗云此中有蟲。吾當除之。入山取草蔓葉咀嚼留汁入筒中。還以阜紗蒙母病。數日愈。後以治人多驗。乃覆盆子葉。又得蟲數十而愈。後以治人多驗。乃覆盆子葉。葉也。無新葉乾者煎浸點目亦可。三四次治眼妙品。〕

【附方】二。牙疼點眼。用覆盆子嫩葉搗汁點目亦可。三四次治眼妙品。〔時珍曰：蓋治眼蟲也。〕

〔附方〕新牙疼點眼。用覆盆子嫩葉搗汁點目亦可。三四次治眼妙品。〔時珍曰：蓋治眼蟲也。〕

〔附方〕二。牙疼點眼。用覆盆子嫩葉搗汁點目亦可。三次治眼妙品。〔時珍曰：蓋治眼蟲也。〕

〔附方〕二。牙疼點眼。用覆盆子嫩葉搗汁點目亦可。三次治眼妙品。〔時珍曰：蓋治眼蟲也。〕

根【主治】痘後目翳。取根洗搗澄粉日乾蜜和少許點於醫丁上。日二三次自散。百日內治之久卽難療。時珍○活。

懸鉤子拾遺。

【校正】自果部
移入此。

【釋名】沿鉤子用前爾雅音箭山莓爾雅木莓璞郭樹莓日華有刺如懸鉤故名。

【集解】有刺器曰「藏器曰」生江淮林澤間莖上有刺其子如梅子酸美人多食之。一機曰「樹莓枝梗柔軟時珍曰懸鉤樹生高四五尺其莖白色有倒刺其葉有細齒青色無毛晝後淡青頗似櫻桃葉而長又似地棠花葉四月開小白花結實色紅今人亦通呼爲藨子爾雅云荊山莓也郭璞注云今之木莓也實似藨而大可食孟蒼大明也並以此爲覆盆誤矣。

【氣味】酸平無毒。

【主治】醒酒止渴除痰去酒毒。藏器搗汁服解射工沙蟲毒。時珍。

葉【主治】燒研水服主喉中塞器。

根皮【氣味】苦平無毒。

【主治】子死腹中不下破血婦人赤帶下久患赤白痢膿血腹痛殺蟲毒卒下血並濃煮汁飲之。藏器。

【附方】新二血崩不止。木莓根四兩酒一盞煎七分。心溫服。臘仙乾坤生意崩中痢下治婦人崩中及下痢日夜數十起欲死者。煎至可丸丸梧子大每溫酒服十丸日三服。一千金翼汁。

蛇苺下別品錄

釋名蛇蘆也。音地莓。會蠶。梅。中。穀。空者爲蠶。莓中實極紅者爲蛇。蟲。古人不敢之。恐有蛇殘也。其時熟紅于子。謂老蛇。瑞曰。蠶老時熟紅者如荔枝色。機曰。蛇蘆莖長如覆盆子。但光潔而小。微有皺紋。花黃比葵花差大。春末夏初結紅子如荔枝色。五月開小黃花。五出結實鮮紅狀似覆盆子。而面珍曰。一時珍曰。此物不就地引細蔓。節節生根。甚細。本草用汁。當是取其莖葉有齒刻。四根也。仇遠碑史訛作蛇繆草。言有五葉七葉者。又言俗傳食之能殺人。亦不然。止發冷涎耳。

汁〔氣味〕甘酸大寒有毒

【主治】胸腹大熱不止。別錄傷寒大熱及溪毒射工毒甚良。宏景通月經，燻瘡腫，傅蛇傷明。主孩子口噤以

汗灌之。孟說。傅湯火傷痛卽止。時珍。

附方 舊二 **口中生瘡升天行稍熱甚者蛇傷寒自然汁半傷寒下蠶潰生烏瘻以令蛇毒入蜜飲之日三服仍方水**

中毒病。蛇毒中流更揭夫服之。并導下部亦可飲汁一二升。夏月欲入水先以少末投水浴身亦宜投少許。肘後方

使君子

【釋名】留求子。〔志曰〕俗傳潘州郭使君療小兒多是獨用此物。後醫家因號爲使君子也。時珍曰按嵇含南方草木狀謂之留求子。療嬰孺之疾則自魏晉已用。但名異耳。

紅有五瓣七八月結子如拇指大長一寸許大類榧子而有五棱其殼青黑色內有仁白色七月采種之亦易生其藤如葛繞樹而上葉青如五加葉五月開花一族二十蕊紅色如栗久則油黑不可用

【氣味】甘溫無毒

【主治】小兒五疳小便白濁殺蟲療濕痢健脾胃除虛熱治小兒百病瘡癩

【發明】時珍曰一凡殺蟲藥多是苦辛惟使君子仁數枚或以殼煎湯嚥下次日蟲皆死而出也或云七生七熯食亦良忘欲熱茶犯之卽渴此物味甘氣溫既能殺蟲又益脾胃所以能斂虛熱而止濕痢爲小兒諸病可類推矣

【附方】新小兒脾疳飲每服一錢儒門事親小兒痞塊腹大肌瘦而黃漸成疳疾使君子仁三錢用木雞子一個破項入藥在內飯上蒸熟空心服之楊起簡便單方去殼蜜湯五錢火盡爲末每食頭戲面瘡時細嚼香油送下久久自愈普濟方蟲牙疼痛類漱子煎簡湯兩浮

木鼈子宋開寶

【釋名】木蟹志曰蟹狀故以爲名

【集解】作藤生葉有五棱狀如山藥青色面光四月生黃花六月結實似栝樓而極大生青熟紅黃生色苗

校正自木部移入此

肉上有軟刺。每一實有核三四十枚。其狀扁而如鼈。八九月采之。嶺南人取嫩實及苗葉作茹蔬食。宗奭曰。一木鼈子蔓歲一枯。但根不死。春旋生苗葉如蒲萄。其子一頭尖者爲雄。凡植時須雌雄相合。麻纏定。及其生也。則去雄者方結實。一時珍曰。一木鼈形扁礮。大如圓碁子。其仁青綠色。入藥去油者。

仁氣味甘溫無毒時珍曰甘有小毒

主治折傷消結腫惡瘡生肌止腰痛除粉刺點婦人乳癰肛門腫痛。開
醋磨消腫毒明治瘡積痞。

塊利大腸瀉痢。痔瘤瘻瘍。時

【發明】以木鼈子煮豬肉食之其幼子當夜長子明日死友人馬文誠方晝亦載此方因著此爲戒。一按劉續霏雪錄云木鼈子有毒不可食昔蔚門有人生二子恣食成稽其父得一方時珍曰南人取其苗及嫩實食之無恙則其毒未應至此或者與豬肉不相得或犯他物而然不可盡告木鼈也。

水飲以雪糕壓下卽吐出。水瀉不止。木鼈子五個。母丁香五個。麝香一錢。研末。米湯調作。病疾禁口。鼈仁六個研泥分作二分。用麪燒餅一個切作兩半。只用半餅作一劑。納藥在內。乘熱食。邵真人經驗方。腸風瀉血。木鼈子以空性候冷爲末。每服一錢。燒葱白酒。肛門痔痛。孫用祕方。研末。先熏後洗。日用木鼈仁三枚。盆搗如泥。入百沸湯一盞。止一齧。仁帶潤者雌雄各五個。薑汁方。醫案。吳曼扶壽精方。鼈中一夜一丸。自消也。江夏鐵佛寺藥和尙病此。痛不可忍。有人傳此而愈。用治數人。皆有效。瘻瘍經年。木鼈中蒸熟。食後食之。每日一服。半月效。小兒丹瘤。木鼈仁研末。每以少許。普濟方。風牙腫痛。木鼈子仁研末。每以少許。普濟方。大黃各半兩。豆蔻半兩。生油調塗之。或云能毒狗至死。

番木鼈綱目

【釋名】馬錢子。網目苦實。把豆目火失刻把都。之連珍曰。一狀似馬。

【集解】時珍曰番木鼈生回國今西土邛州諸處皆有之。蔓生夏開黃花。七八月結實如括樓。

【主治】傷寒熱病。咽喉癆痛。消痞塊。並含之嚥汁。或磨水噙嚥。時珍曰。新喉癆作痛。番木鼈青木香山豆根等分。楊拱醫方摘要。纏喉風腫。番木鼈仁一個。木香三分。同磨水調。熊膽粉。左耳即馬錢子半箇。輕粉水花銀砂各二錢。右耳日吹粉。左耳日吹。右耳右耳。日華飛鴻集病。欲去胎兒。研膏把豆。

仁氣味苦寒無毒。

【附方】新喉癆作痛。番木鼈青木香山豆根等分。楊拱醫方摘要。纏喉風腫。番木鼈仁一個。木香三分。同磨水調。熊膽粉。左耳即馬錢子半箇。輕粉水花銀砂各二錢。右耳右耳。日華飛鴻集病。欲去胎兒。研膏把豆。

驗方。癰瘡入目。鑿少許。爲豆兒末。左目吹馬錢子半箇。輕粉水花銀砂各二錢。右耳右耳。日華飛鴻集病。欲去胎兒。研膏把豆。

或云能

毒

狗

至死

良

入北戶三
寸集簡方

馬兜鈴宋開寶

校正併入唐本草獨行根

【釋名】都淋藤。肘後獨行根。唐本雲南根。綱三百兩銀藥。宗奭曰。蔓生附木而上葉脫時人用治蠱隱。其根吐利微有香氣故有獨行人。百兩銀藥肘後方作都淋蓋誤傳也。

【集解】志曰。獨行根生古堤城旁所在平澤叢林中皆有之。山南名爲土青木香。一名兜鈴。莖薄扁似榆英。其根扁而長。尺許作葛根氣亦似漢防己。二月八月采根。一頌曰。馬兜鈴今關中河東江北淮夔浙州郡皆有之。春生苗作蔓繞樹而生。葉如山蕷葉而厚大。背白。六月開黃紫花。鱗片相南根微似木香。大如小指。四五瓣其根名雲赤黃色。七八月采實暴乾。

【主治】肺熱咳嗽痰結喘促血痔瘻。開肺氣上急坐息不得。欬逆連連不止。燉清肺氣補肺去肺中溼熱。元

【發明】時珍曰。馬兜鈴體輕而虛。熟則懸而四開。有肺之象。故能入肺氣寒味苦微辛。寒能清肺。中所能降肺氣。錢乙補肺阿膠散用之。非取其補肺。乃取其清熱降氣也。邪去則肺安矣。其作吐。故崔氏方用阿膠糯米。以吐糞其不能補肺之藥也。湯劑中用多亦

【附方】舊二水腫腹大。喘急。馬兜鈴煎湯。一日服之。千金方肺氣喘急。炒乾甘草炙一兩。每服一錢水一盞煎。慢火

溫呻或嚙之 簡要濟衆 一切心痛不拘大小男女大馬兜鈴一個燈上燒存性爲末溫酒服立效 搞玄方解蛇蠍毒飲食中得之咽中如有物嚥不下出心下熱悶兜鈴一兩煎水服卽吐出
崔行功纂要方 痘瘻腫痛熏病處良以馬兜鈴於瓶中燒烟日華本草

獨行根【氣味】辛苦冷有毒。有大明曰：「無毒。」不可多服。吐利不止。

【主治】鬼疰積聚諸毒熱腫蛇毒水磨爲泥封之日三四次立瘥水煮一二兩取汁服吐蠱毒又搗末
一錢

水調塗疔腫大效 唐本治血氣明利大腸治頭風癰瘡秃瘡出精義
附方 舊一新四 **五種蠱毒** 肘後方云席辨刺史晉嶺南俚人多於食中 毒人漸不能食胸背漸脹先寒似不瘥更服土人呼爲三百兩銀藥○又支太醫云兜鈴根一兩爲末水調服亦驗 中草蠱毒此術在西良之西及嶺南人中 兩爲末水煎服當吐盡出未盡再服爲未水調服亦驗
兩爲末溫水調服一錢即愈 惠方 腸風漏血馬兜鈴藤穀精草荆三棱川烏頭炒過四分煎水先熏後洗之
治化蠱出神效 聖惠方 少時根鈎蟲木香牛兩煎湯
裹傅少時根惡蛇所傷飲之 神珍方 肘後方

【校正】自木部移入此。

釋名象豆，開寶檻子，華合子，拾遺子，象檻形，故名曰之。其一

【集解】藏器曰：按廣州記云：檻藤子生廣南山林間，作藤著樹，如通草藤，其實三年方熟，角如弓袋子，若雞卵，其外紫黑色，其殼用貯丹藥，經年不壞，取其中仁入藥，炙用。時珍曰：子紫黑色，微光大一二寸，圓而扁，人多別去肉作藥瓢，垂于腰間也。

仁氣味 濡甘平無毒。

【校正】自木部移入此部

【主治】五痔蠱毒飛尸喉痹以仁爲粉微熬水服一二七亦和大豆潔面去黓黯器治小兒脫肛血痢瀉血並燒灰服或以一枚割瓢熬研空腹熱酒服二錢不過三服必效寶解諸藥毒草木狀○

【附方】舊三喉瘡腫痛一錢燒藤子燒研酒服五痔下血燒藤子燒存性米飲服五個不
用
蛙阜莢子四十九個燒存性爲末每服二錢溫酒下少頃再飲酒一盞趁口服極效○聖惠方
用
橘藤子三枚厚者溼紙七重包煨熟去殼取肉爲末每服一錢食前黃芪湯下日一服

【附錄】合子草拾遺「藏器曰」子及葉有小毒主蠱毒及蛇咬搗

預知子宋開寶

【釋名】聖知子日華聖先子日華蓋合子日華仙沼子日華志曰相傳取子二枚綴衣領上遇有蠱毒則
之訛

【集解】之作蔓生依大木上葉綠有三角面深背淺七月八月有實作房生青熟深紅色每房有子五
七枚如阜莢子斑褐色光潤如飛蛾今蜀人極貴重之云亦難得采
無時其根冬月采之陰乾治蠱其功勝于子也山民目爲聖無蠱
子仁氣味苦寒無毒雙仁者可帶溫

【主治】殺蟲療蟲治諸毒去皮研服有效寶治一切風補五勞七傷其功不可備述治痃癖氣塊消宿
食止煩悶利小便催生中惡失音髮落天行溫疾塗一切蛇蟲蠭咬治一切病每日吞二七粒不過三十粒永瘥大明