

(103)

卷

中國科學院植物研究所編輯

中國藥用植物誌

第 二 冊

裴 鑑 周 太 炎

62/12/10

科學出版社

第 1 卷

中國經濟史綱要

中國經濟史綱要

第一編

第一章

緒論

中國科學院植物研究所編輯

中國藥用植物誌

第 二 冊

裴 鑑 周 太 炎

科 學 出 版 社

1951年9月

中國藥用植物誌

第二冊

著者 裴 鑑 周 太 炎
編輯者 中國科學院植物研究所
出版者 科 學 出 版 社
北京朝陽門大街117號
北京市書刊出版業營業許可證出字第061號
印刷者 上海信大橡皮印刷廠
總經售 新 華 書 店

1951年9月第一版 書號：0385 印張：12 3/4
1956年12月第三次印刷 開本：787×1092 1/16
(滬) 1,631—3,655 字數：110,000

定價：(10) 2.80元

中國藥用植物誌

第二冊目錄

- 51. 夏草冬蟲 *Cordyceps sinensis* (Berk.) Sacc.
- ✓ 52. 白木耳 *Tremella fuciformis* Berk.
- ✓ 53. 黃 傘 *Cyrtomium Fortunei* J. Sm.
- ✓ 54. 石 岩 蕨 *Drynaria Fortunei* (Kze.) J. Sm.
- ✓ 55. 鳳 尾 草 *Pteris multifida* Poir.
- ✓ 56. 銀 杏 *Ginkgo biloba* Linn.
- ✓ 57. 慈 苳 *Coix lachryrna-jobi* Linn.
- 58. 吉 祥 草 *Reineckia carnea* Kunth.
- 59. 萬 年 青 *Rohdea japonica* Roth.
- 60. 石 蒜 *Lycoris radiata* Herb.
- 61. 石 斛 *Dendrobium nobile* Lindl.
- 62. 楓 楊 *Pterocarya stenoptera* C. DC.
- 63. 板 栗 *Castanea mollissima* Blume
- 64. 黃 楊 樹 *Ficus lacor* Hamilt.
- ✓ 65. 大 麻 *Cannabis sativa* Linn.
- 66. 葎 草 *Polygonum orientale* Linn.
- ✓ 67. 商 陸 *Phytolacca esculenta* van Houtte
- 68. 落 葵 *Basella rubra* Linn.
- 69. 大 木 通 *Clematis Biondiana* Pavolini
- 70. 范氏木通 *Clematis Gouriana* Roxb. var.
finetii Rehd. & Wils.
- 71. 大 血 藤 *Sargentodoxa cuneata* (Oliv.) Rehd.
& Wils.
- 72. 刺 黃 柏 *Mahonia ganpinensis* (Lev.) Fedde
- 73. 樟 樹 *Cinnamomum Camphora* (Linn.) Nees
& Eberm.
- 74. 薺 *Capsella Bursa-pastoris* (L.) Medic.
- 75. 岩 白 菜 *Bergenia purpurascens* (Hook. f. &
Thoms.) Engl.
- 76. 黃 芩 山 *Dichroa febrifuga* Lour.
- 77. 龍 芽 草 *Agrimonia eupatoria* Linn.
- 78. 野 山 檀 *Crataegus cuneata* Sieb. & Zucc.
- ✓ 79. 金 櫻 子 *Rosa laevigata* Michaux
- 80. 茨 梨 *Rosa Roxburghii* Tratt. f. *normalis*
Rehd. & Wils.
- 81. 紫 荊 *Cercis chinensis* Bge.
- 82. 皂 莢 *Gleditsia sinensis* Lam.
- ✓ 83. 槐 樹 *Sophora japonica* Linn.
- 84. 楝 樹 *Melia Azedarach* Linn.
- 85. 鴉 膽 子 *Brucea javanica* (Linn.) Merr.
- 86. 山 麻 黃 *Psilopeganum sinense* Hemsl.
- 87. 油 桐 *Aleurites Fordii* Hemsl.
- 88. 巴 豆 樹 *Croton Tiglium* Linn.
- 89. 烏 柏 *Sapium sebiferum* (Linn.) Roxb.
- 90. 漆 樹 *Rhus verniciflua* Stokes
- 91. 無 患 子 *Sapindus Mukorossi* Gaertn.
- 92. 枳 椇 *Hovenia dulcis* Thunb.
- 93. 紅 苳 豆 *Ludwigia prostrata* Roxb.
- 94. 破 骨 風 *Jasminum lanceolarium* Roxb. var.
puberulum Hemsl.
- 95. 珍 珠 風 *Callicarpa Bodinieri* Levl.
- 96. 散 血 草 *Ajuga decumbens* Thunb.
- 97. 夏 枯 草 *Brunella* (*Prunella*) *vulgaris* Linn.
- 98. 酸 棗 *Sambucus javanica* Reinw.
- 99. 惡 實 *Arctium Lappa* Linn.
- 100. 野 菊 *Chrysanthemum indicum* Linn.

04711

中國藥用植物誌

第五十一圖

夏草冬蟲

別稱:冬蟲夏草,蟲草.

(囊子菌綱 Ascomycetes 肉座菌科 Hypocreaceae)

Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc., Mich. I. 320 (1879).

Sphaeria sinensis Berk. in Lond. Jour. Bot. II. 207, pl. 8, fig. 1, a, d (1843).

菌座單生,間有二至三者,出自寄主之頭部,長四至十一公分,基部直徑一公厘半至四公厘,向上則漸次細小,上部稍膨大,褐色,近圓筒形;幼時內部中間充塞,成熟後則空虛,外皮具甚粗糙而凸出之球果,此部長十至四十五公厘,直徑二公厘半至六公厘;尖端不生球果,此部長一公厘半至三公厘半,球果出自菌座外皮,基部稍凹下,卵形至橢圓形,長千分之三百八十至千分之五百五十公厘,徑千分之一百四十至千分之二百四十公厘,囊子囊線形,頂端頭狀,具短柄,長千分之二百四十至千分之四百八十五公厘,厚千分之十二至千分之十五公厘,囊孢子多隔膜,不分裂,長千分之一百六十至千分之四百七十公厘,徑千分之五至千分之六·五公厘,每隔膜間之細胞長約千分之四公厘。

我國四川,雲南,西康,西藏等省特產;而尤以四川及西康產量為最富,生長之地皆森林下潮濕之處。

夏草冬蟲為真菌類植物,寄生於鱗翅類昆蟲之幼蟲,二者合生而得其名。冬季時,此類幼蟲蟄居土中,肉座菌類植物得寄生於其中,吸取其養分,以至幼蟲全體化為菌絲,幼蟲因此而斃。時至夏季,此菌發育生孢子,出於土上,查人所謂冬草,即此時期也。

入藥時,去其菌座,取蟲之部分。

夏草冬蟲採以爲藥,始於清雍乾間。⁽¹⁾初見其記述於本草從新,繼而趙學敏本草拾遺,⁽²⁾記載尤詳。

據趙學敏,⁽²⁾見四川通志,謂:『夏草冬蟲,性溫煖,補精益髓』。在文房肆考謂:『其氣陽性溫,保肺氣,實腠理』。在朱排山柑園小識謂:『以酒浸數枚啖之,治腰膝間痛楚,有益腎之功』。潘友新謂:『其性甘平,保肺腎,補精髓,止血化痰,已勞嗽,治膈症皆良,味甘性溫,祕精益氣,專補命門』。

(1) 陳存仁,中國藥學大辭典,三〇四頁。

(2) 趙學敏,本草拾遺,世界書局版,一一〇頁。


圖 解

第五十一圖 夏草冬蟲 *Cordyceps sinensis* (Berk.) Sacc.


- A. 植物全形,上部爲菌座,下部爲已斃之幼蟲。
- B. 菌座之橫切片,示球果。
- C. B圖之一部放大。
- D. 囊子囊放大,示具隔膜之囊孢子。

中國藥用植物誌
第五十一圖

C



B




1mm.

D




A

2CM.



夏草冬蟲 *Cordyceps sinensis* (Berk.) Sacc.



中國藥用植物誌

第五十二圖

白木耳

別稱：銀耳。

(擔子菌綱 Basidiomycetes 白木耳科 Tremellaceae)

Tremella fuciformis Berk. in Jour. Bot. VIII. 277 (1856).

子實體白色，半透明，分裂成扁薄而捲縮如葉狀的瓣片。擔子亞球形，長千分之十二至十三公厘，厚千分之十公厘，透明。擔子孢子亞球形，約千分之五至六公厘乘千分之六至七·五公厘。

白木耳生陰濕之地，寄生於凋腐之樹木上。

分佈於江蘇，浙江，福建，湖北，四川，貴州等省；產量以四川為著。

⁽¹⁾據陳存仁謂：『甘平無毒，主治：潤肺生津，滋陰養胃，益氣和血，補腦強心，入肺胃腎三經，能清肺中熱，養胃陰，濟腎燥，治肺熱咳嗽，肺燥乾咳，久咳喉癢，咳疾帶血，或痰中血線，或久咳絡傷脅痛，及肺癰肺痿，婦人月經不調，肺熱胃炎，大便閉結，大便下血』。


(1) 陳存仁，中國藥學大辭典，三六六頁。

圖 解

第五十二圖 白木耳 *Tremella fuciformis* Berk.


- A. 菌之全形.
- B. 菌絲及擔子放大.
- C. 擔子放大.

中國藥用植物誌
第五十二圖



A

白木耳 *Tremella fuciformis* Berk.



中國藥用植物誌

第五十三圖

貫 衆

別稱：貫節，貫渠，百頭，草鴉頭，黑狗脊，鳳尾草。

(水龍骨科 Polypodiaceae)

Cyrtomium Fortunei J. Sm., Ferns Brit. and For. 286 (1866).

地下莖粗而直立，葉叢出，高達七十五公分；寬卵形及線形褐色鱗片密被於葉柄上，髓軸上較爲稀疏，鱗片邊緣流蘇狀，長六至十公厘，寬半公厘至五公厘；葉柄綠色，或下部呈紫褐色，長八至二十四公分；葉片一回羽狀複葉，長十五至五十公分，小葉具短柄或無柄，卵狀披針形，鑷形，無毛，邊緣具鋸齒，基部上端截切成耳狀，下端圓形，頂端尖或長尖，長四至九公分，寬一至三公分，革質，脈網狀，網孔中具一離生小脈，孢子囊羣則生於其頂端，孢子囊羣多數，散生於小葉之背面；孢子囊羣蓋盾狀圓形，其邊緣呈波狀，膜質，褐色。

喜生樹林下之濕地，溪溝邊，及石隙。

在我國長江以南諸省最爲常見；分佈由朝鮮及日本而南至檀香山及客理布；非洲及墨的高士加亦均產之。歐美各國並盆栽以供觀賞。

入藥以根莖爲主。

市場上所售之貫衆，原植物不止一種，與本種極相近之一種爲全緣貫衆 (*Cyrtomium falcatum* [L. fil.] Presl)，其不同之處，在於貫衆之小葉數較多而薄，鮮時呈淡綠色，邊緣具鋸齒。本種之形態，與吳其濬⁽¹⁾所論貫衆之附圖，極相類似，今附其圖於後（副圖十七）。



副圖十七

(2) 據李時珍謂：『貫衆根苦微寒有毒；主治：腹中邪熱氣諸毒，殺三蟲，去寸白，破癥瘕，除頭風，止金瘡，爲末，水服一錢，止鼻血有效，治下血崩中帶下，產後血氣脹痛，斑疹毒，漆毒骨硬，解豬病。』

(1) 吳其濬，植物名實圖考，商務印書館本，一七〇頁。


(2) 李時珍，本草綱目，世界書局本，四三三頁。

圖解

第五十三圖 貫衆 *Cyrtomium fortunei* J. Sm.

- A. 植物全形。
- B. 小葉。
- C. 葉柄基部之鱗片。
- C'. 髓軸上之鱗片。
- D. 孢子囊羣。
- E. 孢子囊。

中國藥用植物誌
第五十三圖



貫衆 *Cyrtomium Fortunei* J. Sm.

