

時方妙用 時方歌括

R2
3

內 容 簡 介

「時方妙用」和「時方歌括」二書，都是清代陳修園所著。所謂「時方」，可以解釋為中醫的常用方，由於這二書的主題是一致的，因此合訂在一起，以便閱讀。

「時方妙用」共有四卷，主要是說明中醫常用方的應用方法，但要在臨牀上很好的應用這些方子，必須懂得中醫診斷疾病的基本方法，然后才能掌握「主証」，而給以恰當的治療。因此，本書第一卷，首先介紹了「望」、「聞」、「問」、「切」四診法。卷二以后分門別類各以病証為主，依據症象，舉出主証，配以「主治」的處方和加減变化的方法。又因本書所列病証，都是一般臨牀上常見的，所以非常实用。

「時方歌括」共有上、下二卷，列舉中醫常用方一〇八首，依據性質分為十二類。正文是用歌賦體敘述了各方的組織和主治病証，下附作者的註解，說明該方的藥理作用和方劑配合問題，此外還集錄歷來名醫的言論，加以旁証。因此，很能使讀者具體了解各方的性能和適應証。

以上二書，由於敘理簡明，文字較通俗，故宜於初學中醫者閱讀。但因著者在寫作當時受歷史條件的限制，可能有些觀點不合現代要求，希望讀者以正確對待文化遺產的态度，來加以批判的接受。

時方妙用序

古之長吏。與民相親。飢爲之食。寒爲之衣。水旱疾疫。爲之醫藥而調劑之。用能循績丕懋。仁聞遠覃。長樂陳修園孝廉。精軒岐術。作令三輔。適大水奉檄勘災恒山。出其方。試而輒效。嗣丁內艱旋里。讀禮之暇。因刊時方歌括。時方妙用二書。夫上醫醫國。前人如狄懷英。陸敬輿諸賢。家居時。率駢集驗方以自娛。亦以救世。物理論曰。醫者。非仁愛不可託也。非聰明理達不可任也。非廉潔淳良不可信也。修園行將廣其道。以究心民瘼。希踪古循吏者。豈直以術銜售哉。

嘉慶癸亥至日趙在田序

醫有三貫。通靈素及仲景諸經之旨。藥到病瘳。曰名醫。講求唐宋以後方書。按證施治。功多過少。曰時醫。標掠前醫。套襲模稜。以文其過。迎合而得其名。曰市醫。醫之不同如此。余友陳修園。精通醫理。閉門注經。以正千古相沿之誤。念當世名醫既不數覩。市醫又不可與言。唯於時醫中有誘掖無已之心。仕保陽公餘。著有時方歌括二卷。時方妙用四卷。出以示余。余讀之。或連篇累牘而不繁。或寥寥數語而不漏。一字一句。皆古聖賢之心法。從時。卽從古也。爰爲參訂圈點。顏曰公餘醫錄。惄憇授梓。公之海內云。

旨

時方妙用 小引

辛酉歲余能南宮試

曰時方妙用
旨

恩試令三輔適夏間大水奉檄勘災恒山以勞遘疾得寒厥證幾死病間自定湯服二服愈時恒山東北大爲溫瘡患誤于藥者比比余憫之遂于公餘採時方一百八首韻爲歌括出繕本付刀圭家按法療治多所全活越明年

制府熊謙山先生見而許可曰子之意

善矣然有方而不審其用則不足以活人且以殺人子盍明方意而廣之適余丁內艱弗果今歲讀禮在籍謹體先生壽世壽民意續成四卷詩病原于一百八首中且余讀靈素宗仲景向有經方之注和者寥寥偶以時方出紙貴一時授時好也好在此曷弗導之以此時方固不逮于經方而以古法行之卽與經方相表裏亦在乎用之之妙而已因顏

時方妙用目錄

卷一

望色

聞聲

問症

切脉

中風

虛勞

卷二

腫症

脛症
單腹脹

腹脹

痰飲

咳嗽

喘促

哮症

心腹諸痛

痛風

痺

腰痛

噎隔
反胃

卷三

血症

癲狂癇

消渴

傷食

瘡疾

痢疾

時疫

暑症

濕病

頭痛

瘻癰

眩暈

眼目

耳聾

疝氣

瘻

泄鴻

積聚

鶴膝風

脚氣

卷四

嘔吐噦

五淋癃閉

遺精

赤白濁

汗症
盜汗

自汗

婦人科

傷寒科

泄利

怔忡驚治

同

閩吳航陳念祖修園甫著

男元符道彪古思元屏道照靈石全校字

望色一

明堂圖內部十四。外部十一。恐倉卒間不能辨也。唯相傳額心鼻脾左頰肝右頰肺頤腎之法簡捷可從。又須審其五色以定五藏之病。肝青肺白心赤脾黃腎黑色周于面者。辨其有神無神。色分於部者。審其相生相尅。閩淡者病從內生。紫濁者邪自外受。鬱多憔悴。病从瘦。黃山根明亮須知欲愈之疴。環口黑黎休醫已絕之腎。言難盡意。醫要會心。

經云。赤欲如帛裹朱。不欲如赭。白欲如鵝羽。不欲如鹽。青欲如蒼璧之澤。不欲如藍。黃欲如羅裏雄黃。不欲如黃土。黑欲如重漆。色不欲如地蒼。青如翠羽者生。赤如鶴冠者生。黃如蠍腹者生。白如豕膏者生。黑如鳥羽者生。靈樞曰。五色各見其部。察其浮沉以知淺深。

察其澤夭以觀成敗。察其散搏音以知遠近。視色上下以知病處。積神於心以知往令。

望色二

屍臭肉絕舌卷及囊縮肝絕口不合脾絕肌腫脣反腎絕面黑直視目絕目膜不見陰絕目眶陷目系絕齒髮直齒枯骨絕遺尿腎絕毛焦肺絕汗出如珠陽絕手撮戴眼大陽絕病後喘肺絕滙脾肺將絕目正圓不絕吐沫面赤心絕面青唇青人中滿心絕髮與眉衝起心絕爪甲下肉黑手掌無紋心絕膚突足趺腫心絕聲如鼾睡脈沉無根心絕面青伏眼心絕目盲心絕汗出如油心絕已上肝絕心絕眉傾心絕手足爪甲青或脫落呼罵不休筋絕入日死心絕眉息回視心絕手足爪甲青髮直如麻不得屈伸自汗不止小腸絕立死心絕口冷足腫腹熱臚眠泄利無時肺絕五脊骨或死心絕大便赤泄肉絕九日死心絕口張氣出不反肺絕二日死心絕耳乾舌腫溺血心絕腰欲折心絕泄利無度大腸絕日死心絕齒乾枯面黑目黃腰欲折心絕

汗。腎絕。

望色三

舌上津津如常邪。尚在表見白胎而滑邪。在半表半裏見黃胎而乾燥熱已入於裏。見黑色胎有二。如黑而焦裂硬刺者爲火。極似炭之熱。胎如黑而有水軟潤而滑者爲水來尅火之寒胎。又藍色爲白色之變爲寒。紫色爲紅色之變爲熱。此傷寒症辨法也。凡舌腫脹重硬舌強舌短縮舌捲皆危症。又陰陽易出舌木舌舌生芒刺舌胎黃燥皆熱甚也。凡舌數寸者死。若沿邊缺陷如鋸齒者不治。杜青碧三十六舌繁而無當不可爲其所惑。

聞聲

難經曰。聞其五音以知其病。以五臟有五聲以合於五音。謂肝呼應角心言應徵脾歌應宮肺哭應商腎聲應羽是也。然此義深奧。非尋常所能揣測者。今以古人經驗簡易之法。列爲聲。診脈之呻者痛也。言之呻吟時言遲者風

也。遲則寒溫之症聲從室中言此中氣有濕也。言將終乃復言者此奪氣也。謂氣不續言未終也。狂出言懶怯先輕後重此內傷中氣也。出言壯厲先重後輕是外感邪盛也。攢眉呻吟苦頭痛也。呻吟不能行起腰足痛也。叫喊以手按心中腕痛也。呻吟不能轉身腰痛也。搖頭而呻以手捫腮唇齒痛也。行遲而呻者腰脚痛也。診時吁氣者鬱結也。紐而呻者腹痛也。形羸聲啞。擦療之不治者咽中有肺花瘡也。暴啞者風痰伏火或暴怒呴嘯所致也。聲嘶血敗火病不治也。坐而氣促痰火爲哮也。久病氣促危也。中年人聲濁者痰火也。診時獨言獨語首尾不應思慮傷神也。傷寒壞病蟲食其肛也。氣促喘息不足以息者虛甚也。平人無寒熱短氣不足以息者實也。實者是疾與火

欲絕也。大抵聲音清亮不異於平時爲吉。

問症

凡診病必先問是何人或男或女或老或幼或妾婢童僕問而不答必耳聾須詢其左右平素何如否則病久或汗下致聾問而懶答也如婦人多中氣診婦人必當問月信如何寡婦血氣凝滯兩尺多滑不可誤斷爲胎室女亦有之又問其病於何日日少爲新病實症居多日多爲舊病虛症居多會食何物食冰而病藥用冰煎若傷寒食草菓山楂之類詳本條會有怒勞房慾等事怒則傷肝勞則內傷及間初起何症如初起頭疼發熱惡寒屬陽內傷後變何病如胸變鴻變癰爲輕癰病在肺先脹後喘病在脾今口渴思飲否不先渴後嘔爲停水之類鴻內無熱也口渴欲飲爲熱老人人口乾不須飲主津液少苦漱水不欲嚥主蓄血主陰極發喜熱喜冷否喜冷內寒口中何味苦熱甘脾熱成疳思食否傷食不思食雜症思食氣則死五味中喜食何味喜冷內寒虛中之類胸中

寬否不寬傷食痰及腹中有無痛處否無痛在內主虛有痛處主食積痰血大小便如常之類有痛處手按則減者爲虛大小便如常小便秘黃赤爲熱減者爲虛大便秘爲實火澀火病爲虛下便如常大便秘爲實火澀火病爲虛下黃赤爲熱下足冷煖否足冷煖陽症足冷非溫便結屬陽清白爲寒大便清白爲寒屬虛屬虛及平日勞逸喜怒憂思及素食何物勞則氣散逸則氣滯喜傷心怒傷肝憂傷肺思慮傷脾恐傷腎素食厚味則生痰醇酒發熱種種問法實爲活人之捷徑

切脈

內經分配臟腑

左寸心左關肝左尺腎中

右寸肺右關胃右尺腎中

王叔和分配臟腑

左寸心小腸左關肝左尺膀胱
右寸肺大腸右關胃右尺腎命門
三焦

李瀕湖分配臟腑

右寸肺膽中左關肝左尺腎命門
右尺腎膀胱小腸
大腸

張景岳分配臟腑

左寸 胸中 心
右寸 胸中 心
左關 脾 腹 中
右關 脾 腹 中
左尺 腎 膀胱 大腸
右尺 腎 小陽

愚按大小二腸經無明訓。其實尺裏以候腹。腹者。大小腸與膀胱俱在其中。王叔和以大小二腸配於兩寸。取心肺與二腸相表裏之義也。李瀨湖以小腸配於左尺。大腸配於右尺。上下分屬之義也。張景岳以大腸宜配於左尺。取金水相從之義。小腸宜配於右尺。取火歸火位之義也。俱皆有

心脈浮大而散。肺脈浮濶而短。肝脈弦長而和。脾脈緩大而敦。腎脈沉軟而滑。○又有反關脈在關後必反其手診之。當詢其平日何如脈象。

男女異脈

男子陽爲主。兩寸常旺於尺。女子陰爲主。兩尺常旺於寸。乃其常也。反之者病。

無病經脈

經者常也。醫者一呼一吸。病者脈來四五。爲和平之象。或問以五至爲閏息。如歲運三年一閏。是我之息長。非彼之脈數也。

脈分四時六氣

十二月大寒至二月春分爲初之氣。厥陰風木主令。經曰厥陰之至其脈弦。○春分至小滿爲二之氣。少陰君火主令。經曰少陰之至其脈鈎。○小滿至六月大暑爲三之氣。少陽相火主令。經曰少陽之至大而浮。○大暑至

尺。亦何不可乎。

八月秋分爲四之氣。太陰濕土主令。經曰太陰之至其脈沉。○秋分至十月小雪爲五之氣。陽明燥金主令。經曰陽明之至矩而清。○小雪至十二月大寒爲六之氣。太陽寒水主令。經曰太陽之至大而長。

按近時只遵春弦夏洪秋毛冬石四季之未和緩不忒之訣。然氣之至有遲速不必

趨於捷徑。

七怪脈歌

舊

決

雀啄連來三五啄。連連搏指忽然止絕少頃復來如雀啄食肝絕也。
屋漏半日一點落。如屋殘漏下牛滴一滴胃絕也。
尋卽散。況于筋間劈劈硬搭指散亂如解索。指下散亂全數乍踴。
始則冉冉不動。無如魚之翔心絕也。
一躍進退難尋。如蝦之遊大腸絕也。
沸湧如羹止。浮于指下有出無入無復旦占夕。
死不須藥。

舊訣以浮芤滑實弦緊洪爲七表。以沉微遲緩濡伏弱濇爲八裏。以長短虛促結代半動細爲九道。不無可議處。浮沉遲數爲診脈四大綱。舊訣竟脫去數字。謬甚。當就李瀨湖李士材二十七字外。更增人大脈方足。然病無定情。脈不單見。學無頭緒。指下茫然。茲以浮沉遲數虛實大緩八脈爲主。而以兼見之脈附之。總括以詩爲切脈之捷法。

浮。輕手乃得重手不見爲陽爲表。除沉伏率三脈。浮而中空爲芤。有邊無中。如以主失血。浮而搏指爲革。中空外堅。似以指接鼓皮空而外堅。主陰陽不交。

浮而不聚爲散。接之散而不聚。來去不明。主氣散。

詩曰。浮爲表脈。病爲陽。輕手捫來。指下芤似着蘆。知血脫。革如按鼓。識陰亡。孤陽上。使知真陰竭于下矣。從浮辨散形竚亂。定散非浮氣敗傷。除却沉中半伏象。請君象外更參。

詳浮不沉也。沉中可互見。
沉輕手不得重手乃能兼得。按至肌肉以下爲陰爲裏。除浮華荒亂。

除浮華荒亂之外皆可互見。

沉而幾無爲伏。着骨始得。

較沉更甚。主邪閉。

沉而有力爲牢。沉而強主內實。

沉而有力爲牢。直搏指主內實。

詩曰。沉爲裏脈病爲陰。淺按如無按要深。

伏則幽潛推骨認。牢爲勁直着筋尋。須知

諸伏新邪閉。可悟諸牢內實尋。除却浮中

芤草散。許多活法巧從心。

沉不能浮也。浮中諸脈不能兼見。

遲。一息二至爲在臟爲寒。除數緊促動四脈。

或二至爲在臟爲寒。除數緊促動四脈。

遲而時止爲結。遲中而時有一止也。但無定數主氣鬱血

壅痰滯。

亦主氣血漸衰。

遲而更代爲代。一息一止不能自還。

絕。亦主經塞。有四。

姪婦見之不妨。

詩曰。遲爲在臟亦爲寒。

脈經云。遲爲寒。仲景云。遲爲在臟。

一息未及四至。彈呼一吸合爲一息。一

息三至。或一息二至。至於一息一至必死。

息三至。或一息四至。爲平人之脈。遲則一來

以偶停無定數。遲中一息。因不返卽更

也。代因不返卽更

端一脈氣絕其脈往而不自還他臟共

固而更代之須知此脈止有定數。

共

傳代主元陽絕。還識結成鬱氣干。除却數中促緊動。諸形互見細心觀。中諸脈不能見。

數。一息五六至爲在腑爲熱。除遲結代三脈之外俱可互見。

數而牽轉爲緊。如牽繩主寒邪而痛。亦主數而時止爲促。數中時有一止也。無定數主邪氣內陷。

數見關中爲動。形圓如豆。脈厥主陰陽相

博。主氣與驚。男

詩曰。數爲腑脈熱居多。仲景云。數爲在腑一息脈來五六科。謂一息五六至也。

至七八至者危。緊似

轉繩塞甫閉。動如搖豆氣違和數中時止

名爲促。促裡陽偏即是魔。陽盛爲促除却遲中

兼結代。旁形側出細婆婆。數不遲也。遲中

虛。不實也。應指無力浮中沉三候俱有虛

有素稟不足。因虛而生病者。諸脈不能兼見。

有邪氣不解。因病而至虛者。非主虛。

虛而沉小爲弱。沉細而軟。按主血虛本分

氣。胃氣

虛而浮小爲濡

如絮○浮淳水見主氣虛外溫。

虛而模糊爲微

不顯也。指下不分明。若無若有。

陰陽氣絕

往來乾澆如輕無若。有洋中沉皆是。

虛而勢滯爲濁

刀刮竹之象。主血虛。亦

主死血

虛而形小爲細

形如蜘蛛絲之主氣冷。繩指下分明。

虛而形縮爲短

寸不通魚際。主氣損。亦主

詩曰。虛來三候。按如縣。元氣難支。豈偶然。

弱在沉中。陰已竭。濡居浮分。氣之愆。勞成

脈隱微難見。指下不病。劇精乾澆。遂傳冷

氣蜘蛛絲成細象。已上皆言脈勢。唯細大長短皆指脈形而言。細者形如蜘蛛絲也。微與細相類。但微對大而言。細對大而言。分別在此。

短爲形縮

鬱不堪憐。

不虛也。應指有力。浮中沉俱有之。四言脈下。訣上。牢甚則實。屬附于沉脈者。非大振指下。清清楚白。和緩。爲元氣之實。指主實。

實而流利爲滑

往來主血治。亦主痰飲。

實而迢長爲長

上至魚際。主氣治。蓋陰虛。亦主陽波湧起之象。主熱極。亦

實而湧沸爲洪

應指滿溢。如羣生。主熱極。亦

主內虛

實而端直爲弦

狀如弓弦。按之不移。主肝邪。亦主寒。

詩曰。實來有力。象悠悠。邪正全憑指下求。

脈來有力。指下清而不濁。滑長不兼洪弦之象。正氣實也。如指下濁而不清。但見洪緊。不見滑長。是邪氣實也。

病當瘳。洪如湧浪邪傳熱。弦以張弓木作

仇毫髮分途。須默領。非人渾不說緣由。

大。卽洪脈而兼脈形之濶大也。

詩曰。大脈如洪。不是洪形兼洪濶不雷同。

絕無舞柳隨風態。却似移兵赴敵雄。新病

邪強知正怯。夙疴外實必中空。內經病進

真堪佩。總爲陽明氣不充。

邪氣盛。則胃氣衰。故脈大而不緩。

詩曰。緩脈從容不迫時。診來四至却非遲。

陰陽欣得此。任他久暫總相宜。若還怠緩

須當辨。濕中脾經步履疲。

胃氣復。則邪氣退。故脈緩而不急。

指住來之遲緩也。遲字對數字言，遲則不數，數則有緩。非淺人所可領會。故內經與大字對言，其有深故。

節錄病機賦 修園重訂

賦曰：能窮浮沉遲數虛實大緩八脈之奧。**八脈之變也，便知表裏寒熱盛衰邪。**正八要之名者，表裏不在內也。裏者，病不在外也。盛者，本來氣血不盛也。塞者，臟腑積滯不衰也。衰者，本來氣血不盛也。寒者，臟腑積滯不正病也。正者，非外邪所中也。八脈爲諸脈綱領。八要是眾病權衡。此八要也。申虛爲舉按無力。若兼弱濶之象，舉者輕於皮膚之上。按者，重手按之於肌肉之內也。無力者，言指下舉按應指無力也。弱者，緩而不起也。主氣虛濶者，往來乾清也。主血少虛脈，兼此二象，實爲氣血不虛。舉按有力且該長滑之形，主氣有餘。滑者，流而不滯也。主血有餘。實脈，兼此二象，此以虛實二脈探氣血盛衰之情也。遲寒數息，紀至數多少。平人脉以四至爲準，不及日息六至也。經云：數則遲，一息三至也。太過日數一息，此以遲較二脈，別其寒熱也。浮沉二脉，別其表裏也。表裏在筋骨而得，重按在指下重輕，輕手舉之于皮膚上，即得。此以遲較二脉，別其寒熱也。浮者，日浮泛者，即得。重按在筋骨而得，此以遲較二脉，別其寒熱也。浮表沉裏。

正復和若春風柳舞，大則病進勢若秋水潮生也。病進而危，故脈洪大如秋濤之洶湧。此以緩大二脈，其都正也。六脈同等者，喜其勿藥。兩手六部之中，推其于八脈中見出，那一家也。王肯堂、喬解亦誤。部之脈也。同等者，脈息調匀，不治自愈。王肯堂誤解爲大小浮沉遲數同等，不可從也。醫其都正也。六脈偏盛者，憂其採薪獨異也。又于那一部之脈也。同等者，脈息調匀，不治自愈。王肯堂誤解爲大小浮沉遲數同等，不可從也。醫其都正也。六脈偏盛者，憂其採薪獨異也。又于那一部之中，推其于八脈中見出，那一家也。王肯堂、喬解亦誤。

脈有宜忌

凡病內虛者，脈弱爲宜。洪大則忌。病外感者，陽脈爲宜。陰脈則忌。○有神者吉，和緩者吉，合于時令者吉。與面上五色中見那一色相合者吉，反是者凶。只此數語可遵，其餘皆不生者，吉反是者凶。只此數語可遵，其餘皆不信也。

婦人尺脈微遲爲居經，月事三月一下。血氣不足故也。

婦人尺脈微遲爲居經，月事三月一下。血氣不足故也。

婦人三部浮沉正等無他病而經停者孕也。尺大而壯亦然。左尺洪大實爲男。右尺洪大實爲女。舊說以左右尺爲頗然。若云婦人手滑爲斷左叶。熊羆右叶爲之兆。

少陰脈動甚者。女子也。今以寸脈動

右脉爲斷左叶。熊羆右叶爲之兆。

女入得革脈曰牛產漏下得離經之脈曰產期離經者離乎經常之脈也。蓋胎動於中脈亂于外勢之必至也。

新產傷陰出血不止。尺脈不能上關者死。

婦人脈平而虛者。孔子也。

體弱之婦尺內按之不絕便是有子。月斷病多六脈不病亦爲有子。所以然者。體弱而脈難顯也。脈經曰。三部浮沉正等。按之無絕者。孕娠也。何常拘於洪滑耶。陰搏陽別。謂之有

小兒五歲以下血氣未盛。經脈未充。無以別其脈象。故以食指絡脈之象彰于外者。察之

有陽象也。婦人不月脈來滑疾。重手按之散者。胎已三月也。和滑而代者。二月餘之胎息也。重手按之滑疾不散者。五月也。

小兒脈法。小兒五歲以下血氣未盛。經脈未充。無以別其脈象。故以食指絡脈之象彰于外者。察之

其脈象。故以食指絡脈之象彰于外者。察之。其脈象。故以食指絡脈之象彰于外者。察之。

其脈象。故以食指絡脈之象彰于外者。察之。

陰虛陽搏謂之崩。言尺內虛大弦數皆內崩而血下。妊娠七八月。脈實勞強大者吉。沉細者難產而死。

取寸關尺之處。常以六至爲率。加則爲熱。減則爲寒。譬如診大人法。

小兒服亂身熱。汗出不食。食卽吐。多爲變蒸。小兒四末獨冷。鼓栗惡寒。面赤氣粗。涕淚交至。必爲痘疹。

半歲以下。于額前眉端髮際之間。以名中食三指候之。食指近髮爲上。名指近眉爲下。中指爲中。三指俱熱。外感于風。鼻塞咳嗽。三指俱冷。外感于寒。內傷飲食。發熱吐瀉。食中二指熱。主上熱下冷。名中二指熱。主夾驚。食指熱。主食滯。

中風

猝倒無知。牙關緊閉。痰涎上壅。危在頃刻是也。李東垣主氣虛。劉河間主火盛。朱丹溪主濕盛生痰。三子皆言中風之因。如作文之推原法。薛立齋趙養葵。言真水竭。真火虛。肝鬱脾傷。及諸虛所致。更推廣言之。總非正面文字。其曰風者。主外來之邪風而言也。其曰中者。如矢石之中于人也。此時因風治風。尙恐不及。其他奚論焉。小續命湯爲第一諸說。不

敢不得罪前人。而直辨其非。

脈喜浮大。浮者邪尚在表也。大者風爲陽邪。陽症見陽脈也。若浮大鼓指恐邪盛正衰。去分乃元氣欲戰。和緩柔小而氣度和緩柔。乃是吉兆。

中經有六經之形證。宜

小續命湯。三十

中臟多滯九竅。故有唇緩失音。鼻塞耳聾目瞀。便祕之症。風自外來。故不外麻桂。手足抽掣。故兼用歸芍。二便阻隔。故用滑石硝黃。宜

足憑也。若謂是氣虛火盛痰多水竭火虛肝鬱脾傷。及諸虛所致。爲病日久。卽未中風之前。以大劑調養。非一兩月不效。豈于旣中風之際。死生只在頃刻。尚可以一劑回其氣虛。平其火勢。清其痰源。滋其腎水。溫其命火。及疏肝健脾。補養諸虛乎。必無是理也。如牛黃腦麝。及市上馳名丸藥。人尙知其刲傷元氣。不敢輕投。而數家之書。言似近理。其實僞君子之爲害。更甚於真小人。名相爲活人計。不

中肺多著四肢故有半身不遂手足不隨左癱右瘓之形。

中血脈外無六經之形症內無便弱之阻隔唯口眼喝斜或左或右。

偏左宜六君子湯。益左半雖血爲主非氣以統之則不流也。二

偏右宜四物湯。益右半雖氣爲主非血以麗之則易散也。九

二湯俱加竹瀝蠶汁以行經絡之痰再加殼桑鉤藤天麻羚羊角以熄風活絡或加附子以固陰肉桂以通陽黃耆以勝風中風不語宜

資壽解語湯。三十

舌強不能言足廢不能行宜地黃飲子。三十

中風死症多是風中帶寒其症口開爲心絕手撮爲脾絕眼合爲肝絕遺尿爲腎絕聲如

鼾睡爲肺絕汗出如油爲元氣內絕髮直目上視面赤如推汗綴如珠法在不治用藥若遲數刻卽死矣急用

三生飲一兩加人參一兩。

一百零四

按三生飲中近時附子俱以鹽醃過烏頭。

非四川產者無力愚用熟附子一兩乾薑五錢炙甘草四錢一服汗畢止再服眼睛畧動三服加大參三錢漸有生意必須半日服三劑。

中風愈後照劉朱李薛諸法緩緩調治之

愚按開竅以驅風非是正法丙經重在填竅金匱有侯氏黑散風引湯二方是補天手段或猝倒時痰涎如塞危在頃刻者三因白散極驗詳三字經方。

附小續命湯六經加減并鍼灸法

如中風無汗惡寒依本方麻黃杏仁防風各

加倍又宜鍼至陰出血穴在足小指外崑崙穴在足外踝後側甲角針一分崑崙透太陰○如中風有汗惡風依本