

初级卫生^{技术}人员^{职称}评定考核复习题解

(临床部分)



LIN CHUANG
BU FEN

云南人民出版社

云南省卫生厅科教处编

初级卫生技术人员职称 评定考核复习题解

(临 床 部 分)

云南省卫生厅科教处 编

云南人民出版社

责任编辑：陆秀华
封面设计：苏 定

初级卫生技术人员
职称评定考核复习题解

(临 床 部 分)

云南省卫生厅科教处编

*

云南人民出版社出版

(昆明市书林街100号)

云南新华印刷厂印装 云南省新华书店发行

*

开本：787×1092 1/16 印张：14.5 字数：319,000

1985年4月第一版 1985年4月第一次印刷

印数：1—34,000

统一书号：14116·107 定价：2.35 元

《初级卫生技术人员职称评定考核复习题解》

编写人员（临床部分）

主 编 施路华 常鹏 田敬国

基础护理 赵翠鼎 魏汉菊 罗秀萍 李运美 翁淑明

内科学（及护理） 刘燕波 张桂英 段琪 黄晴岚 马昶云 龚朝义

外科学（及护理） 李兴如 蔡传骅 高述圣 徐沐 吴宗恩

儿科学 张庆华 黄承勉

妇产科学 范承淑 饶惠琼 杨秀英

中医学 程树光 陈家兴 杜乐年 尹安东 朱美莉

皮肤病学 苗宇培 宋家珍

药剂科 杨雁宾 彭斯俊

检验科 白仲华 张学宁

放射科 翟凌云

口腔科 姜光恺 吴荣忠

前 言

为提高我省初级卫生技术人员的技术水平和适应职称评定考核复习的需要,配合中级卫生技术人员的培训,我们依据卫生部颁发的《中专卫校教学大纲》的基本精神,按照中专卫校现行教材的内容、体系和要求,编写了这套丛书。

此书分为医学基础及临床两个部分。医学基础的内容涉及到中专卫校一般专业的基础课程,有解剖学及组织胚胎学、生理学、微生物及寄生虫学、生物化学、病理学、药理学以及诊断学基础等。为适应读者自学的需要,我们采用题解形式编写,以期帮助读者掌握好医学基础的概念、重点及难点。在临床问题部分中,考虑到不同专业的不同需要,我们选择了护士、医士、妇幼医士、中医士、药剂士、检验士、放射医士、口腔医士等八个专业二十个科目的内容。在编写时,我们采用了多种试题形式,而且大部采用多选择性试题。这样做的出发点在于力图使读者通过各种临床常见的问题启迪自己的思维,然后再查阅各自所有的不同版本的医学书籍,从而起到帮助读者提高对各种临床问题的思辨能力。所列多选试题附有答题卡,可供读者试作。

本书除供初级卫生技术人员、乡村医生、卫生员作为初晋中考核自学复习外,也可供现职中级卫生技术人员、中专卫校师生参考。

由于本书涉及的科目较多,鉴于编者水平,编写中错误难免,诚恳地希望读者以及医学教育工作者给予指正

云南省卫生厅科教处

答 题 说 明

一、A 型题

每一试题后有以字母 A、B、C、D、E 为序号的五个备选答案。选择一个答案，将答题卡上表示选中答案的字母涂黑。

二、B 型题

前面以字母 A、B、C、D、E 为序号的是备选答案，后面是试题。为每一试题选一答案，将答题卡上表示选中答案的字母涂黑。一个备选答案可以被选用一次以上，也可以一次也不被选用。

三、C 型题

前面以字母 A、B、C、D、E 为序号的是备选答案，后面是试题。为每一试题选一答案，将答题卡上表示选中答案的字母涂黑。一个备选答案可以被选用一次以上，也可以一次也不被选用。

四、K 型题

每一试题由一主体和①、②、③、④四段叙述组成。分别用四段叙述的部分或全部组成答案，将答题卡上表示所组成答案的字母涂黑。

答案固定组合

① + ② + ③ 为 A；① + ③ 为 B；

② + ④ 为 C；④ 为 D；

① + ② + ③ + ④ 为 E。

五、X 型题

每一试题有以字母 A、B、C、D、E 为序号的五个备选答案，正确答案可以是一个，也可以是一个以上。选出答案后将答题卡上表示选中答案的字母涂黑。

最后说明一下，本题解中的名词解释、填空、是非题、计算题等题型，为惯用题型，答题法不再加以说明。

目 录

一、基础护理学.....(1)	九、儿科学.....(119)
题目.....(1)	题目.....(119)
答题卡.....(10)	答题卡.....(131)
答案.....(12)	答案.....(133)
二、内科学及护理.....(14)	十、中医学基础.....(135)
题目.....(14)	题目.....(135)
答题卡.....(22)	答题卡.....(147)
答案.....(24)	答案.....(150)
三、外科学及护理.....(26)	十一、中医内科学.....(153)
题目.....(26)	题目.....(153)
答题卡.....(38)	答题卡.....(162)
答案.....(40)	答案.....(164)
四、内科学.....(42)	十二、药理学.....(166)
题目.....(42)	题目.....(166)
答题卡.....(58)	答题卡.....(169)
答案.....(61)	答案.....(170)
五、外科学.....(64)	十三、药剂学.....(171)
题目.....(64)	题目.....(171)
答题卡.....(76)	答题卡.....(174)
答案.....(78)	答案.....(175)
六、皮肤病学.....(80)	十四、临床检验.....(177)
题目.....(80)	题目.....(177)
答题卡.....(87)	答题卡.....(180)
答案.....(89)	答案.....(181)
七、产科学.....(91)	十五、生化检验.....(182)
题目.....(91)	题目.....(182)
答题卡.....(101)	答题卡.....(185)
答案.....(103)	答案.....(186)
八、妇科学.....(105)	十六、X线诊断学.....(188)
题目.....(105)	题目.....(188)
答题卡.....(115)	答题卡.....(193)
答案.....(117)	答案.....(194)

十七、X线投照技术.....(196)

 题目.....(196)

 答题卡.....(200)

 答案.....(201)

十八、口腔内科学.....(203)

 题目.....(203)

 答题卡.....(206)

 答案.....(207)

十九、口腔颌面外科学.....(209)

 题目.....(209)

 答题卡.....(213)

 答案.....(214)

二十、口腔矫形学.....(215)

 题目.....(215)

 答题卡.....(218)

 答案.....(219)

一、基础护理学

题 目

一、A 型题

1. 急性消化道疾患病人的饮食应为
 - A. 普通饮食
 - B. 软质饮食
 - C. 半流质饮食
 - D. 流质饮食
 - E. 高热量饮食
2. 甲紫、高锰酸钾污染治疗巾，去污可用
 - A. 乳酸
 - B. 醋酸
 - C. 草酸
 - D. 硫酸
 - E. 硝酸
3. 无菌导尿管在 2 PM 铺好后，在下列的什么时间内仍可用
 - A. 5 PM
 - B. 7 PM
 - C. 8 PM
 - D. 10 PM
 - E. 11 PM
4. 紫外线灯用于病室消毒，有效距离是
 - A. 2 米
 - B. 2.5 米
 - C. 3 米
 - D. 3.5 米
 - E. 4 米
5. 绿脓杆菌性口腔炎漱口用
 - A. 1~3% 过氧化氢
 - B. 2~3% 硼酸水
 - C. 0.02% 呋喃西林
 - D. 0.1% 醋酸
 - E. 1~4% 碳酸氢钠
6. 灭头虱宜用
 - A. 敌敌畏
 - B. 滴滴涕
 - C. 食醋
 - D. 敌百虫液
 - E. 百部草溶液
7. 受压局部皮肤红肿，浸润扩大，变硬发紫，表皮常有水泡，病人有疼痛感，属于褥疮
 - A. 瘀血红润期
 - B. 坏死溃疡期
 - C. 浅度溃疡期
 - D. 深度溃疡期
 - E. 炎症浸润期
8. 颅脑手术后，头部翻转过剧可引起
 - A. 栓塞
 - B. 蛛网膜下腔出血
 - C. 脑溢血
 - D. 脑疝
 - E. 血栓形成
9. 低盐饮食，每日食盐量应控制在
 - A. 0.5~1.0 克
 - B. 1.5~2.0 克
 - C. 2.0~2.5 克
 - D. 3.0~5.0 克

E. 6.0~6.5克

10.患者体温39°C以上已六日, 体温日差不超过1度, 脉缓, 呼吸不与体温成正比, 提示

- A. 大叶性肺炎
- B. 伤寒
- C. 流行性感胃
- D. 风湿热
- E. 化脓性疾病

11.洋地黄中毒时, 脉率可为

- A. 50次/分
- B. 65次/分
- C. 70次/分
- D. 80次/分
- E. 90次/分

12.高热病人量体温的次数

- A. Q 12h
- B. Q 8 h
- C. Q 6 h
- D. Q 4 h
- E. Q 3 h

13.血压的生理变化下列哪项是错的

- A. 上下肢血压相等
- B. 成人血压高于儿童
- C. 寒冷时血压升高
- D. 睡眠时血压降低
- E. 进食后血压升高

14.应在饭前服的药是

- A. 磺胺类药
- B. 健胃药
- C. 助消化药
- D. 止咳药
- E. 呋喃类药

15.作小儿股静脉穿刺, 穿刺针应由

- A. 股动脉内缘垂直刺入
- B. 股动脉外缘垂直刺入
- C. 股神经外缘垂直刺入
- D. 股动脉上端垂直刺入

E. 股动脉下端垂直刺入

16.给糖尿病患者注射胰岛素, 注射时间应在

- A. 饭前15分钟
- B. 饭前40分钟
- C. 饭前60分钟
- D. 饭后15分钟
- E. 饭后30分钟

17.在传染病房, 穿隔离衣必须保持的清洁面为

- A. 领和外面
- B. 领和内面
- C. 领和袖口
- D. 领和腰带
- E. 领和背面

18.一孕妇先兆流产卧床, 五日未大便, 处理应

- A. 清洁灌洗
- B. 结肠灌肠
- C. 冷水灌肠
- D. 保留灌肠
- E. 小量液体灌肠

19.为留置导尿管病人更换导尿管的时间为

- A. 一天二次
- B. 一天一次
- C. 二天一次
- D. 三天一次
- E. 一周一次

20.用鹅颈灯治疗褥疮, 热对人体的作用方式是

- A. 透入
- B. 感应
- C. 对流
- D. 辐射
- E. 折射

21.给昏迷病人用热水袋保暖, 如发现局部皮肤潮红时, 冷湿敷应当用

- A. 50%硫酸镁
- B. 3%硼酸水
- C. 3%过氧化氢
- D. 3%醋酸
- E. 95%酒精

22.解除成年病人肠胀气,用松节油热敷,松节油与植物油之比为

- A. 1:2
- B. 1:3
- C. 1:4
- D. 1:5
- E. 1:6

23.解除非尿路梗阻病人尿潴留,不能首选

- A. 下腹部热敷
- B. 利用条件反射
- C. 针灸
- D. 下腹部按摩
- E. 立即导尿

24.不适宜于空气消毒的药物是

- A. 乳酸
- B. 环氧乙烷
- C. 硫磺
- D. 艾叶
- E. 甲醛

25.书写病室交班报告时,应先写

- A. 垂危病人
- B. 特殊治疗病人
- C. 转科病人
- D. 手术病人
- E. 新入院病人

26.高压灭菌效果检查常用1~3克

- A. 硼酸粉
- B. 石膏粉
- C. 硫磺粉
- D. 苏打粉
- E. 石炭酸结晶

27.为口服敌百虫的人洗胃禁用

- A. 1/5,000高锰酸钾溶液
- B. 生理盐水
- C. 0.5%活性炭液
- D. 2%碳酸氢钠溶液
- E. 清水

28.治疗链霉素毒性反应,应首选

- A. 葡萄糖酸钙
- B. 乳酸钙
- C. 溴化钙
- D. 氯化钙
- E. 碘化钙

29.作心内注射不应将药液注入

- A. 心肌内
- B. 右心房
- C. 左心房
- D. 右心室
- E. 左心室

30.用维生素B₁时,哪种途径给药是错误的

- A. 口服
- B. 肌肉注射
- C. 静脉注射
- D. 痛点注射
- E. 穴位注射

31.脉管炎病人止痛禁用

- A. 热水袋
- B. 温水浸泡
- C. 热敷
- D. 红外线照射
- E. 冷湿敷

32.青霉素过敏反应发生最迅速,最严重的是

- A. 血清病型反应
- B. 过敏性休克
- C. 呼吸道过敏反应
- D. 消化道过敏反应
- E. 皮肤过敏反应

33.用95%乙醇稀释成75%乙醇

100ml, 须用95%乙醇

- A. 75.5ml
- B. 76.3ml
- C. 77.4ml
- D. 78.9ml
- E. 79.6ml

34. 10%葡萄糖溶液属于

- A. 等渗液
- B. 低渗液
- C. 胶体
- D. 酸性液
- E. 以上都不是

35. 输血前后作静脉滴入的液体应为

- A. 5%葡萄糖液
- B. 0.9%氯化钠液
- C. 1.9%乳酸钠液
- D. 1.25%碳酸氢钠液
- E. 复方氯化钠液

36. 双侧瞳孔大小不等提示

- A. 脑血栓形成
- B. 脑疝
- C. 脑压减低
- D. 脑压增高
- E. 脑膜刺激征

37. 不规则热常见于

- A. 伤寒
- B. 败血症
- C. 大叶性肺炎
- D. 风湿热
- E. 疟疾

38. 心房纤颤病人的脉搏为

- A. 间歇脉
- B. 绌脉
- C. 数脉
- D. 缓脉
- E. 以上都不是

39. 青霉素过敏快速试验液的浓度为

- A. 100u/ml

B. 500u/ml

C. 1,000u/ml

D. 5,000u/ml

E. 10,000u/ml

40. 煎煮中药汤剂, 解表药应煎

- A. 5~8分钟
- B. 10~20分钟
- C. 25~30分钟
- D. 35~40分钟
- E. 45~60分钟

41. 急性昏迷病人双侧眼球同向偏斜

提示

- A. 脑出血
- B. 脑疝
- C. 脑膜炎
- D. 脑血栓形成
- E. 脑瘤

42. 我国第一所护士学校开办于

- A. 北京
- B. 上海
- C. 广州
- D. 福州
- E. 杭州

43. 作人工呼吸时最重要的是

- A. 将病人安放在空气流通的地方
- B. 有活动假牙应取出
- C. 保持病人呼吸道通畅
- D. 用力要适当避免损伤
- E. 每分钟16~22次

44. 行锁骨下静脉穿刺输液时, 患者感呼吸困难, 发绀。检查穿刺侧呼吸音消失, 叩诊呈鼓音, 应考虑

- A. 肺水肿
- B. 肺炎
- C. 输液反应
- D. 气胸
- E. 胸腔积血

45. 取血测定CO₂结合力, 盛血试管

中应放

- A. 抗凝剂
- B. 石蜡油
- C. 95%乙醇
- D. 10%甲醛
- E. 空试管

46. 留取24小时尿标本最重要的是

- A. 准备一清洁有盖容器
- B. 容器标签上写清楚病人姓名、床

号

- C. 容器上写清楚起止时间, 要交班
- D. 容器应放在阴凉处, 且根据化验

的不同要求加入防腐剂

E. 让病人了解留尿标本的重要性, 取得病人的充分合作

47. 留尿容器中加入浓盐酸作防腐剂, 以测定尿中的

- A. NaCl
- B. 糖
- C. 肌酸
- D. 蛋白质
- E. 17酮类固醇

48. 留大便标本作潜血试验, 为了避免结果假阳性

- A. 容器应清洁
- B. 容器应避免血污染
- C. 检查前三天病人应忌食肉、肝、

血等食物

- D. 检查前三天病人应忌服铁剂
- E. 以上都应该

49. 0.2~0.5%过氧乙酸消毒禁用于

- A. 手
- B. 日常用品
- C. 金属器械
- D. 地面、墙壁
- E. 空气

50. 高热量饮食每日应供给热量

- A. 1,500卡

B. 2,000卡

C. 2,200卡

D. 2,500卡

E. 3,000卡

51. 100克牛奶中含蛋白质3.3克, 脂肪4克, 糖5克。一杯(200克)牛奶能供给热量

- A. 138卡
- B. 148卡
- C. 158卡
- D. 168卡
- E. 178卡

52. 小量保留灌肠, 液量不得超过

- A. 200ml
- B. 250ml
- C. 300ml
- D. 350ml
- E. 400ml

53. 给休克患者扩充血容量, 应选以下哪种药物

- A. 5%葡萄糖液
- B. 10%葡萄糖液
- C. 5%葡萄糖生理盐水
- D. 水解蛋白溶液
- E. 低分子右旋糖酐

54. 吗啡、巴比妥中毒病人的呼吸是

- A. 浅而快
- B. 深而快
- C. 迟缓
- D. 潮式呼吸
- E. 毕奥氏呼吸

二、B型题

- A. 5%来苏液
- B. 3%龙胆紫液
- C. 3%过氧化氢液
- D. 95%乙醇
- E. 3%石炭酸液

55. 冲洗污染伤口常用

56. 消毒器械常用

- A. 仰卧位
- B. 侧卧位
- C. 半坐卧位
- D. 坐位
- E. 头高足低位

57. 心包积液病人应采取

58. 腹膜炎病人应采取

- A. 0.1毫升含15国际单位
- B. 0.1毫升含50国际单位
- C. 0.1毫升含150国际单位
- D. 0.1毫升含250国际单位
- E. 0.1毫升含0.075毫克

59. 作链霉素过敏试验用

60. 作破伤风抗毒素过敏试验用

- A. 复方氯化钠溶液
- B. 0.9%氯化钠溶液
- C. 5%葡萄糖溶液
- D. 0.9%甘氨酸钠溶液
- E. 注射用水

61. 稀释四环素静脉点滴液先用

62. 稀释金霉素静脉点滴液先用

- A. 呕吐物有粪臭味
- B. 呕吐物有苦味
- C. 呕吐物有酸臭味
- D. 呕吐物含胃液和食物
- E. 呕吐物呈咖啡样

63. 低位肠梗阻患者的

64. 上消化道出血患者的

- A. 严密隔离
- B. 呼吸道隔离
- C. 接触隔离

D. 昆虫隔离

E. 消化道隔离

65. 副霍乱须行

66. 头皮黄癣须行

67. 肺结核须行

68. 乙型脑炎须行

69. 疟疾须行

A. 双侧瞳孔散大

B. 双侧瞳孔缩小

C. 双侧瞳孔大小不等

D. 一侧瞳孔散大和对光反射消失

E. 双侧眼球同向偏斜

70. 吗啡中毒

71. 有机磷农药中毒

72. 颠茄碱中毒

73. 酒精中毒

A. 高热, 表情淡漠

B. 疼痛, 表情淡漠

C. 牙关紧闭, 苦笑面容

D. 肢体卷曲, 闭目呻吟

E. 眼球突出, 表情恐惧

74. 破伤风病人

75. 甲状腺功能亢进病人

A. 痰呈血性

B. 痰呈脓性

C. 痰呈白色泡沫状

D. 痰呈铁锈色

E. 痰分层

76. 大叶性肺炎病人

77. 慢性支气管炎病人

A. 病情危重需随时抢救的病人

B. 病情危重需专人护理的病人

C. 病重需严格卧床的病人

D. 病情较重生活不能完全自理的病

人

E. 一般病人

78. 一级护理用于

79. 二级护理用于

A. 0.1%新洁尔灭液浸泡

B. 0.2%氢氧化钠浸泡

C. 肥皂水煮沸

D. 3%过氧化氢浸泡

E. 0.2%过氧乙酸浸泡

80. 清洗油针头, 先用

81. 清洗有血迹的头皮静脉针, 先用

A. CO_2 结合力降低

B. CO_2 分压降低和升高

C. NPN升高

D. 血浆白蛋白降低

E. 血糖升高

82. 潮式呼吸

83. 酸中毒

三、C型题

A. 脉率低于心率

B. 脉率等于心率

C. 两者都有

D. 两者都无

84. 期前收缩

85. 心房纤颤

A. 95%乙醇

B. 10%甲醛

C. 两者都可

D. 两者都不可

86. 作癌检查病理组织固定液

87. 作24小时尿标本固定液

88. 作断指再植保存指的溶液

A. 红笔

B. 蓝笔

C. 两者均可

D. 两者均不可

89. 记录病人入院、出院、转科、死亡的时间用

90. 将医嘱抄在医嘱单上用

91. 将长期医嘱抄在治疗本上用

92. 表示各种治疗单上的医嘱已执行用

93. 表示8pm以后的给药、治疗时间用

A. 盛血容器中放抗凝剂

B. 盛血容器中不放抗凝剂

C. 两者皆可

D. 两者皆不可

94. 测定血NPN

95. 测定血胆固醇

96. 测定血钠

97. 测定血钾

98. 测定血浆蛋白

99. 测定血 CO_2 结合力

100. 测定血糖

101. 测定GOT

102. 测定GPT

103. 测定胆红素

四、K型题

104. 观察大叶性肺炎病人, 应警惕并发

①胸膜炎

②肺脓肿

③心包炎

④感染性休克

105. 输血引起的疾病多为

①肝炎

②败血症

③疟疾

④梅毒

106.心跳骤停病人的急救包括

①让病人卧于硬板床

②作胸外心脏按摩

③作人工呼吸

④保温

107.截瘫病人容易发生的并发症为

①坠积性肺炎

②尿路感染

③褥疮

④肢体畸形

108.用煮沸法消毒手术器械时水中加入1%碳酸氢钠的主要目的是

①使煮沸液变为碱性

②提高沸点

③缩短消毒时间

④防止金属器械生锈

109.备用床改为麻醉床,床上应另加

①橡皮单1条

②橡皮单2条

③中单1条

④中单2条

110.8号针头用作

①皮内注射

②皮下注射

③肌肉注射

④静脉注射

111.病房的适宜温度和湿度为

①10~15°C

②18~20°C

③20~40%

④50~60%

112.成人插胃管,管进入的长度为

①14~18公分

②20~25公分

③30~40公分

④45~55公分

113.普通饮食,每日热量应为

①800~1,000卡

②1,100~1,500卡

③1,600~2,100卡

④2,200~2,600卡

114.确定鼻饲管放入胃中可根据

①管放于水中有气泡

②管放于水中无气泡

③接注射器可吸出痰液

④接注射器可吸出胃液

115.做青霉素过敏试验,阳性结果为

①局部无红晕

②局部红晕直径大于1公分

③无自觉症状

④有自觉症状

116.半坐卧位的作用是

①使膈肌下降,减轻对心肺的压迫

②使胸腔扩大,肺活量增加

③利用腹腔引流,使感染局限化

④减轻腹部伤口的张力

117.造瘘管喂食应注意

①保持造瘘管通畅

②保护造瘘管周围皮肤

③消化、吸收情况

④排气情况

118.给高热病人降温,可用

- ①冰袋敷头部、腋窝及腹股沟
- ②冰水灌肠
- ③冷盐水灌肠
- ④75%酒精擦浴

119.酸性物中毒可用以下药物洗胃

- ①镁乳
- ②石灰水
- ③蛋白水
- ④碳酸氢钠液

120.病人咬破体温表应立即给予

- ①洗胃
- ②服蛋白水或牛奶
- ③灌肠
- ④服大量韭菜

121.静脉注射毒K应注意

- ①病人两周内未用过洋地黄制剂
- ②用10%葡萄糖液稀释
- ③注射速度要慢
- ④不能同时给钙剂