

祝您的小宝宝茁壮、健康

新婚夫妇、育儿必备



儿科百病家庭自疗指南

天津科技翻译出版公司

儿科百病家庭自疗指南

李欣茹 李桂荣 何金森
姚培元 孟宪武 孙维良
鞠福祥 编

天津科技翻译出版公司

简 介

本书从家庭自疗的特点出发，对儿童多发病、常见病的病因、症状、治疗、护理及预防做了浅显易懂的阐述。全书共有六部分：常见病的家庭自疗、眼科疾病的家庭自疗、口腔科疾病的家庭自疗、精神心理疾病的防治、儿科病的推拿疗法、家庭备药及儿童用药常识。对一百多种小儿常见病的家庭自疗方法分别进行了论述，是一本实用性很强的家庭医学读物。

儿科百病家庭自疗指南

本书编写组

责任编辑 邢淑琴 崔乃敏

特约编辑 邢凤达

天津科技翻译出版公司出版

(邮政编码 300192)

新华书店天津发行所发行

天津市宝坻县第二印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 印张，6.3125 字数，136 千字

1991年5月第1版 1991年5月第1次印刷

印数，1~18000 册

ISBN 7—5433—0180—6/R·28

定价，3.40元

目 录

1. 小儿常见病的家庭自疗

孩子高烧怎么办	(1)
简单易行的通便法	(3)
抽风的初步处理	(4)
怎样处理新生儿脐炎	(5)
什么是手足口病	(6)
宝宝的屁股红了怎么办	(7)
新生儿皮肤发黄是病吗	(8)
孩子为什么不想吃饭	(9)
如何认识小儿哭闹	(11)
麻疹需防并发症	(13)
佝偻病是可以预防和控制的	(14)
怎样及时发现“流脑”	(17)
谈谈缺铁性贫血	(19)
如何看护得了肺炎的孩子	(21)
婴幼儿腹泻的防与治	(23)
得了痄腮吃什么药	(25)
夏秋季要特别警惕中毒型痢疾	(26)
病毒性心肌炎的早期发现与护理	(27)
“蛔虫、蛲虫无大害”吗	(29)
小儿肚子疼怎么办	(31)
小儿疝气要开刀吗	(32)

脱肛的家庭治疗	(34)
肛门瘙痒与肿痛	(35)
纠正便秘的方法	(36)
阴茎疼痛的对策	(37)
胳膊“掉环”的复位法	(38)
手指上的毛病	(39)
孩子喊腿疼都需要治疗吗	(40)
扁平足的矫正	(42)
治斜颈要有耐心	(43)
长疖子生疮	(44)
痱子与痱毒的防治	(45)
癣能治好吗	(46)
怎样治疗小儿湿疹	(47)
“风疙瘩”的综合治疗	(49)
小儿冻疮的防治	(50)
异物卡住嗓眼怎么办	(51)
如何自己处理孩子的小外伤	(52)
烧、烫伤的初步处理	(53)
虫蛰蛇咬怎么办	(54)
学点换药法	(56)
天热引起的发烧	(57)
触电与溺水的急救	(58)
误吃毒物、药物怎么办	(59)
2. 小儿眼科疾病的家庭自疗	
注意保护好腹中胎儿的眼睛	(61)
儿童眼外伤的紧急处理措施	(62)

维生素缺乏与儿童眼病	(64)
儿童常见传染病的眼科表现与家庭护理	(65)
弱视眼的家庭疗法	(66)
儿童视力的家庭监测方法	(67)
宝宝眼毛倒长怎么办	(68)
新生儿鼻旁红肿、脓漏眼是怎么回事	(70)
谈谈“针眼”	(71)
烂眼边是怎么回事	(73)
眯眼后不能用手揉	(74)
眼角流血水，伴有发烧是怎么回事	(76)
什么是红眼病	(77)
白眼珠出血要紧吗	(79)
小儿哭吵、伴眼眵多，不愿睁眼怎么办	(81)
宝宝的眼神为什么不灵活	(82)
儿童夜盲是小事吗	(83)
孩子发烧后为什么看不见东西了	(84)
怎样预防儿童外伤性眼病	(86)
如何预防先天性、遗传性眼病的发生	(87)

3. 小儿口腔科疾病的家庭自疗

您的宝宝长牙正常吗	(91)
牙疼也会招来大病	(93)
孩子长黑牙根怎么办	(94)
刷牙、牙膏与牙刷	(95)
怎样防治虫子牙	(97)
为何牙龈爱出血	(99)
牙齿为什么会变色	(100)

为什么有的孩子牙齿会发黄.....	(101)
怎样防治口臭.....	(103)
孩子牙锈何处来.....	(104)
门牙受伤有治吗.....	(105)
宝宝豁嘴能治好吗.....	(106)
婴儿谨防鹅口疮.....	(107)
奶瓶喂养婴儿要预防牙不整齐.....	(109)
孩子嘬手指，牙齿长不齐.....	(110)
怎样纠正口呼吸.....	(111)
偏侧咀嚼坏处多.....	(112)
咬嘴唇与牙列不齐.....	(113)
舔牙、吐舌、伸舌习惯的戒除.....	(114)
孩子换牙应注意的问题.....	(115)
莫将“虎牙”随便拔.....	(118)
兜齿的防治.....	(120)
4 小儿精神心理疾病的防治	
孩子总爱哭闹、发火怎么办.....	(122)
小儿经常尿床怎么办.....	(123)
小孩睡觉“撒呓怔”是怎么回事.....	(125)
小孩夜间从床上爬起，到处乱走是病态吗.....	(126)
怎样照顾好智能低下的孩子.....	(128)
什么是儿童多动症，怎么防治和对待.....	(129)
怎样防治儿童恐怖症.....	(132)
怎样对待过度焦虑的孩子.....	(134)
什么是儿童退缩行为，怎样防治.....	(135)
为什么要重视儿童心理卫生.....	(137)

“神童”会“命短”吗.....	(138)
怎样纠正孩子的“心理未断奶”现象.....	(139)
孕妇的身心健康对胎儿的影响.....	(140)
儿童“强迫行为”有何表现.....	(142)
怎样培养孩子的注意力.....	(143)
孩子经常挤眉弄眼或肢体抽动怎么办.....	(144)
你的孩子语言发育迟缓吗.....	(146)
发烧抽风会给孩子带来什么危害.....	(147)
6. 治疗小儿百病的推拿疗法	
怎样学会小儿推拿.....	(149)
宝宝身上有哪些常用穴位.....	(151)
腹泻的推拿治疗.....	(158)
便秘的推拿治疗.....	(163)
感冒的推拿治疗.....	(165)
小儿疳积病的推拿法.....	(168)
推拿可治“夜哭郎”.....	(170)
遗尿的小儿推拿.....	(171)
小儿肘掉环复位的推拿手法.....	(174)
小儿肌性斜颈的矫治手法.....	(175)
小儿麻痹后遗症的推拿治疗.....	(177)
腮腺炎的推拿治疗.....	(178)
小儿惊风的指压急救与治疗.....	(181)
推拿治疗蛔虫性肠梗阻.....	(184)
6. 家庭备药常识和儿童常用药物	
小儿疾病药物治疗的意义.....	(186)
小儿药物的治疗特点.....	(188)

家庭用药须知.....	(189)
小儿用药方法与给药时间.....	(191)
小儿用药剂量计算法.....	(192)



小儿常见病的家庭自疗

孩子高烧怎么办

孩子高烧应做紧急处理。体温在39℃以上叫高烧。有些家长发现孩子体温很高就慌了手脚，不做任何处理急忙上路去医院。有时因包裹太厚、有时因天气炎热或因路途遥远，在较长时间内得不到及时治疗，导致孩子中途抽风。十分危险。

退烧药一般作用比较缓慢。在高烧，病情紧急的情况下，不能等待，需立即进行物理降温。家庭可用的物理降温方法有温水擦浴、酒精擦浴、湿毛巾冷敷等。

温水擦浴：温水擦浴可以理解为用温水给孩子擦澡，但是，要达到散热、降温的目的，所以又与一般擦澡方法不同。温水擦浴的方法是用低于病儿皮肤温度的温水（一般为32℃～34℃）进行擦浴。从患儿脖子侧面自上面下地沿着胳膊外侧至手背，然后自腋下、胳膊内侧至手心。再用同样方法擦另一侧。擦下肢从腰部外侧开始，沿大腿外侧至脚背，再从大腿根部沿内侧至脚心。然后从腰擦至小腿后

面至脚根。

擦浴时力量要均匀，并轻轻按摩。擦腋下、手心、脚心、大腿根部、膝部后面应稍用些力量，时间也要稍长一些，直至皮肤表面发红为止。这样才能达到散热的目的。但是孩子的皮肤娇嫩，应注意不要擦破皮肤。一次擦浴共需10分钟左右。

酒精擦浴：酒精擦浴简单有效，散热能力强。常用酒精的浓度为25~50%（95%酒精一份加水两份或用60度白酒一份加水一份）。温度32℃左右（比正常人体温低5℃），按温水浴方法擦。

冷湿敷：将毛巾浸入冰水或冷水中，拧至半干，以不滴水为合适，敷在头部、脖子两侧、腋下、大腿根部。10分钟左右更换一次。

哪些部位不能擦浴？

不能擦面部，以防刺激眼睛。不能擦胸前、肚子、脖子后部，因为这些部位对冷的刺激比较敏感，冷刺激能引起心跳减慢，大便稀等不良反应。

哪些情况不能擦浴？

孩子皮肤有出血点或患有易出血的病，如：血小板减少症、白血病有出血情况时，都不要用温水擦浴及酒精擦浴。

对高烧怕冷、体弱及患有风湿病的病儿不宜采用。

对能够应用物理降温的孩子，擦浴时也要随时注意观察孩子的全身情况。如脸色不好、呼吸不正常、发抖、皮肤发花，四肢冰凉等应停止擦浴及冷敷。

擦浴后要注意什么？

物理降温后，给孩子穿好衣服，平卧休息，不要包裹太

厚。等半小时后测量体温，体温降至 $38.0^{\circ}\text{C} \sim 38.5^{\circ}\text{C}$ 就可以了，不要求温度降得太快。对发烧过高(40°C 以上)特别是对发生过高烧抽风的孩子应配合退烧药。

室内要安静和通风，要注意给病儿喝足够的开水，吃易消化、富营养的食物。

物理降温是对小儿高热的紧急处理措施，能保护患儿，预防高烧抽风等危险情况的发生。当然要请医生查明病因，进行彻底的、全面的治疗。

简单易行的通便法

便秘俗称大便干燥，可造成排便困难，不但会出现肛门疼痛，甚至能导致痔疮和脱肛。多日便秘的孩子不想吃饭，精神不好，吃饭减少就更加重了便秘。

治疗方法：

使用开塞露。用剪刀在开塞露尖部竖着剪一开口，先挤出少量药液，起滑润作用，然后轻轻插入肛门，将药液全部挤入直肠内。用手压住臀部两侧，尽量使药液多保留几分钟。通过药液刺激肠蠕动，软化了大便，达到排便的目的。

无开塞露时可使用肥皂条通便法。将肥皂削成子弹型(底部直径1厘米，长 $3 \sim 4$ 厘米)蘸热水软化后插入肛门。借助肥皂的化学性和机械性刺激而导致排便。

把咸萝卜削成子弹型(底部直径 $1 \sim 1.5$ 厘米，长 $2 \sim 3$ 厘米)，用凉水洗净，涂油后(食用油)轻轻插入肛门，数分钟后即可排便。

注意事项：

肥皂条、咸萝卜条通便法，对痔疮、肛门粘膜溃疡、肛裂以及肛门有剧烈疼痛者，均不宜使用。

预防和治疗一般性便秘的根本办法：

改善饮食，如：加食果汁（如枣汁、桔汁或白菜水等），对较大的孩子应早加较粗的五谷食品。对3个月以上的婴儿要训练大便习惯。具体做法是：在清晨喂饭后，定时训练排便。另外，多吃青菜，多饮水，多运动都是治疗一般性便秘的根本办法。

另外，营养不良、佝偻病的孩子可以因为腹壁或肠壁肌肉张力低而发生便秘，应积极治疗佝偻病，纠正营养不良。

肛门裂、肛门狭窄、先天性巨结肠等都能引起便秘，此时需要请医生彻底治疗。

抽风的初步处理

抽风是小儿常见的急症。年龄越小发生率越高。大多为突然发病，意识丧失，眼球固定或上翻、斜视，头转向一侧或向后仰，口吐白沫，面部及四肢肌肉抽动。常有憋气、口唇发紫、大小便失禁。一般经数秒至数分钟自行缓解，少数反复发作或抽风不止。

哪些原因能引起孩子抽风？

高烧伴抽风多见于感染。如脑膜炎、脑炎、感冒、扁桃体炎、中毒性菌痢、肺炎、败血症等。

抽风不伴发烧可见于颅内出血、高血压引起的抽风、脑瘤、破伤风、癫痫（羊角风），以及低钙、低血糖、药物中

毒等等。

遇到孩子抽风怎么办？

遇到孩子抽风，首先不要慌张。应马上把小儿放平，头偏向一侧，解开衣服扣，解开裤带。不要窝着脖子，要保持呼吸道通畅。用酒精或度数高的白酒代替酒精，消毒针和针刺部位的皮肤后针刺人中、涌泉等穴。

无针刺条件时，可用指甲按压人中部位。

如患儿抽风时间较长，应用筷子缠上纱布后放在口腔内，防止抽风时把舌头咬伤，也容易擦去口腔中的分泌物。抽风牙关咬紧时，不要强力撬开，以免把牙齿撬坏。

因为高烧引起的抽风，多见于6个月到3岁的孩子。只要把高烧解除，抽风也就得到了缓解。若发现发烧的孩子精神不好，肌肉发紧或发抖，多为抽风的先兆，应服用退热药或用物理降温（见“孩子高烧怎么办？”一文）。

采取以上紧急措施时，要保持安静，避免噪音，更不要又哭又叫又推又喊对孩子增加刺激。经上述处理后，及时到附近医院进行进一步检查，查明抽风的原因进行彻底的治疗。

怎样处理新生儿脐炎

新生儿出生后，脐带经过接生员处理一般在3~10天脱落。如果脐带结扎时或以后不干净可以造成脐炎。如炎症通过脐血管蔓延还可以引起肚皮发炎，则称做腹壁蜂窝组织炎。细菌在血液中繁殖起来后容易导致败血症。细菌还可能在肝脏等许多重要脏器化脓形成脓肿。这样后果是十分严重

的。

怎么知道孩子得了脐炎呢？脐带根部或脐带脱落的伤面发红或又红又肿，脐窝处有脓就是患了脐炎。有些家长用一块棉花把新生儿脐部盖上，缠上几圈布，以后沾上屎尿又湿又脏也从不过问，这样就发现不了孩子得了脐炎，而耽误了治疗，如果病情发展严重甚至会造成死亡。请家长们一定要牢记：家中有了新生儿，别忘经常看肚脐儿。

得了脐炎怎么办呢？可以用75%的酒精把局部擦净，然后涂上2%的龙胆紫。每日两次，脐部要保持清洁、干燥。

红肿范围较大或孩子有发烧、或体温太低，吃奶不好，皮肤发黄，甚至全身皮肤发黄等表现，要及时请医生治疗。

什么是手足口病

手足口病是由病毒感染引起的。1~10岁的孩子易患此病。

得了手足口病的孩子有哪些表现呢？开始的表现和感冒差不多。如精神不好、不想吃饭、流鼻涕、打喷嚏、大便稀等等。同时伴有发烧，随着体温升高，手、脚、口腔发生病变，所以叫做手足口病。有哪些病变呢？手掌、手指、脚心、脚趾、臀部（屁股）等处皮肤出小疹子及小水疱。口腔粘膜（口腔内面）的水疱破了以后，形成小溃疡（凹下去的伤面），孩子吃东西时痛的很厉害。

手足口病多在春季流行，在流行季节里，孩子不要到公共场所，以防被传染上。

得了手足口病怎样治疗呢？

首先要让孩子好好休息，隔离治疗。体温过高时可用退热药。皮肤出疹子的地方可以涂氯锌油（其它含抗菌素的氧化锌制剂也行）。口腔溃疡可涂 2% 龙胆紫（紫药水）。可服用核黄素片，每次一片，每日三次。还可以吃板兰根糖浆，一般 5~7 天就好了。

宝宝的屁股红了怎么办

臀红也称尿布皮炎，俗称“屁股腌了”。我们可以看到孩子肛门周围，肛门与尿道之间以及臀部（屁股）的皮肤发红变粗糙，有小疙瘩或小泡。治疗、护理不当可以引起严重的继发感染。

尿布皮炎是怎么引起的呢？

主要是因为潮湿的尿布长时间的刺激。如果尿布粗糙，不干净，危害就更大。当孩子大便稀时，便中的脂肪酸的刺激更容易引起或加重尿布皮炎。

知道了尿布皮炎的起因，我们就会想出防治尿布皮炎的方法。首先是勤换尿布，保持孩子臀部的干燥和清洁。现在的孩子大多是独生子女，出生后一切物品都是新的，有的连尿布也是又密又硬的新布。这样很不合适。最好选用细软的旧棉布做尿布，又透气，又吸水。孩子把尿布尿湿了，一定要洗干净再用，不能只晾一晾干了又接着使用。尿布洗净后，最好用含醋的水泡一下。这样利用醋来中和尿中尿素分解后产生的铵，减少对皮肤的刺激。

孩子拉稀时，尿布不但要洗干净而且还要用水把尿布煮一煮。

如果孩子已经得了尿布皮炎，护理就要更加注意。每次大小便后都要用温水把屁股洗净，轻轻地擦干，可以扑些无刺激的爽身粉，或4%的硼酸粉。皮肤有糜烂不能用爽身粉也不能用热水及肥皂擦洗。可用花生油或生理盐水轻轻擦，可涂抗生素油膏、氧化锌油等。把红药水与口服的鱼肝油混在一起，涂到臀红和糜烂处也能收到明显的效果。

房间里温暖时，可以将孩子的屁股晾着（暴露）也可以在户外让太阳晒一晒。

新生儿皮肤发黄是病吗

半数以上的新生儿在生后2~3天开始出现皮肤发黄，4~5天最明显，7~14天自然消退。而其他情况如精神、吃奶情况、大小便、生长发育等良好，称做“生理性黄疸”。发生“生理性黄疸”不需要治疗，黄疸期间，要注意吃足奶量和多饮水，帮助恢复。

许多家长为什么发现不了新生儿出现了皮肤黄疸呢？大多数有两个原因：一是室内光线太暗，因怕产妇及新生儿着凉受风而挂上了红色窗帘。二是不掌握正确的方法。我们认为新生儿居住的房间温度保持在16~22℃左右即可，不要太热，更不要忽冷忽热。室内空气要新鲜，不需要挂上窗帘遮风遮光，而且观察新生儿的皮肤颜色时，要把新生儿抱到窗户下，在自然光线处观察，否则很难发现皮肤黄疸。通常说灯下不观色，所以在灯光下也很难观察准确。另外，新生儿的皮肤发红也能遮盖黄疸，所以观察时要用手指压一下皮肤，很快抬起手指，立即观察此处皮肤颜色，才能看出皮肤有无