

第五編 外科

一、瘡瘍（包括皮膚爛肉）

治爛頭方

奎浮 區功蓋

- 【處方】用鯪魚一條，連腸臟用泥封固煨存性研爲細末，開茶油搽患處。

治對口瘡方

奎浮 李灼華

- 【處方】先用貓尿搽之，後用老靛蜆高瓜搗爛敷患處。

治對口瘡方

豐順 陳煥庭

- 【處方】蟾酥五分，雄精二錢，混冷茶水外搽。

又方

豐順 陳煥庭

- 【處方】桑螵蛸（螳螂巢）八個煨到六分黑，即刻研成幼末，放陰涼處退火毒，一、二小時久，混茶泔搽患處，二、三次可愈。已開口用效，最好兼服消毒劑。

後枕瘡方

封開 李昌瀚

- 【處方】川連，花粉，連翹，知母，黃芩，枝子，山豆根，桔梗

- 【用法】水煎服，另用大黃花粉二味研末，和塔池龍水開敷，四、五天可愈。

- 【適應】一名對口瘡，生後項，如鴨蛋大，紅腫刺痛。

塔池龍水（即酢塔水）

爛頭方

封開 盧鑑明

- 【處方】入地蜈蚣青蒿二味。

【用法】 爲末，和酒開搽患處，再用雄黃末搽膿水，一星期可收效。

【適應】 頭上全部浮腫、膿膜。

頭上黃水方

封開 陳泮林

【處方】 雄黃，兒茶，五倍子，歸尾，連翹，白芷各二錢，乳香沒藥各錢半，川連銀花各二錢半。

【用法】 共研末，開七夕水搽。

【適應】 頭上瘡流黃水。

黃善窠方

封開 陳泮林

【處方】 老茶窠，僕孖頭，血散藥。

【用法】 煲水洗。

【適應】 瘡生似黃善窠形。

回膿方

封開 彭同春

【處方】 榕樹強（取二層皮）梅片少許。

【用法】 二味搗爛敷，并用南蛇勒強煲水蒸鯉魚食可愈。

【適應】 外邊結痂，裡邊有膿的瘡。

飛瘍方

封開 符汝英

【處方】 白芷五分，冰片一分，好文茶一兩（即上好茶葉）。

【用法】 白芷冰片二味研末，用茶葉煎濃汁去渣，再入銅壳煎成膠，開藥末搽患處，馬上停止蔓延，第二天即乾水結痂待痂落自愈。

【適應】 面上突然起一黑泡，泡潰後愈起愈多。

又方

封開 蘇次平

【處方】 雄黃，冰片，熟石膏，黃連，黃芩，黃柏各等分。

【用法】 共研末開茶油搽，亦即停止蔓延，乾水而愈。

【適應】 面上初起白泡，泡潰後，滿面輪遍，像爛痘一般。

又方

封開 植式材

【處方】 黑狗撈（生草藥）。

【用法】 煲水洗。

【適應】 面上初起白泡，泡潰後，滿面輪遍，像爛痘一般。

馬眼瘡方

封開 八羅榮

【處方】 馬邊草，馬蹄菇。

【用法】 二味杵爛敷之。

【適應】 瘡生眉上，紅腫暗瘀色。

陰陽瘡效方

黃舉昌

【處方】 生地四錢，紅花三錢，歸尾四錢，赤芍三錢，銀花五錢，連翹四錢，牛子三錢，山甲四錢，乳香三錢，沒藥三錢，貝母錢半，防風錢，陳皮錢半，甘草二錢。

【用法】 熱腫痛加大黃五錢，在手加桂枝三錢，在脚加牛七三錢，木瓜三錢，體虛者去大黃加泡黨參錢，王芪五錢，西歸四錢，燈心爲引。

臙瘡驗方（臙瘡卽上五寸，下五寸）

順德 胡紹鼎

【處方】 陀僧四錢，石硫黃二錢，枯凡二錢，銅綠二錢，蜆壳灰六錢。

【製法】 將藥研末後，同猪中脊肥肉約一两，搗爛和藥末攪成膏。

【用法】 視瘡口大小，將藥膏攤成一貼，在臙紙上，敷上瘡口，外用綳帶紮住，睡眠不磨除，如有黃水流出，可用薄紙拭抹，隔一二日用苦參，枯凡，艾葉，兒茶，煲水洗瘡，復貼上藥。

【適應範圍】 祇適於臙瘡。

瘡科生肌驗方

順德 歐陽朝

【處方】珍珠末五錢，厚鳳胎壳十個（即鷄鐵胎）琥珀末一錢，煨白蛻一兩，（生於低約石罅及杉木邊長形的小蚌仔）梅片末五分。

【製法】將鳳凰胎壳石蛻二味入瓦塊內，用濕泥塗淨泥糊封之，畧晒乾，帶出爐灰火煨，煨二至三小時後取出，再與一些豆腐同研，至極細末爲止，搽去豆腐水，次日如法搗成。

【用法】瘡瘍潰後，抹淨毒水，俟乾，撒上海粉。

搭背毒瘡秘方

東山 時祖蔭

【處方】五倍子一兩，白蜜二兩。

【製法】將藥拌勻，用陰陽瓦以微火焙乾，以金黃色爲度，研成細末，用醋調之，攤在簾竹布上，（布之中間一孔洞，以便毒水由此流出，）再加蜂房同樣用陰陽瓦焙乾研成細末，滲在藥上，敷上患處，

【用法】將藥貼上患處，任其自流毒水，該藥每日更換一次，若年老人或小孩子氣力不足者，能用蜂房，敷藥時，先用溫暖的滾水，燂砂水，并火酒等洗淨然後敷上藥。

瘡科拔毒散

順德 李庭芬

【處方】生南星五兩，末笮三兩，草河車五兩，生川烏五兩，白芷五兩，黃連碎五兩，生牛銀五兩，乳香三兩，黃柏五兩，生半夏五兩，甘草三兩，大黃五兩，山茨菇五兩。

【製法】將藥研爲細末，加入麵粉少許調勻如糊狀，後用火煨成軟膏。

【適應範圍】治療一切陰疽，皮色不變，堅硬如石，沒有紅腫，祇有稀痛。

附註：此藥只可外敷，不能入口眼，煮過藥的用具，不可用以再煮食物。

治膿疽驗方

順德 李庭芬

【處方】用耙頭樹根一兩，燉米酒服之數次即愈。

爛頭驗方

東莞 李正

【處方】牛黃，冰片，樟腦，枯礬，紅黃糟。

【製法】將藥研成藥粉末，用油攪拌成膏，或研粉存貯。

【用法】將膏塗上或搽上患處。

【適應範圍】爛頭初起流惡水，耳內流膿作痛。

皮膚病驗方

李正

【處方】鳳尾草，怕鹹草，玉爭花，蛇炮立，烏桕，牛奶拈，王瓜龍，雌棠信，地胆頭，白掃地胆頭。

【製法】將藥曬乾研粉末，用油攪拌為膏。

【用法】把藥膏塗上患處。

【適應範圍】皮膚發爛流惡水，刀傷流血，粉瘤，及耳內流惡水。

傳染性膿疱疹驗方（土名叫水鹵）

李正

【處方】石決明（煨）四錢，文蛤錢半，雲母錢，雄精一錢，人中白錢半，水粉四錢，寒水石二錢。

【用法】將藥共為細末，水調勻搽患處。

【症狀】痘疹腳根紅暈，上面水泡色澄清，傳染很快。

治腦後疽驗方（即下山虎）

和平 袁俊三

【處方】海風藤（又名石鬚）

【用法】 將海風藤和黃糖燻搗敷上患處。

治壞指疽驗方

鄭甫仁

【處方】 塘角魚數頭。

【用法】 把塘角魚碎之醋拌，微溫敷上。

【適應範圍】 壞疽。

(土名)生瓜方

揭陽 楊 魁

【症狀】 初生惡寒發熱，全身筋絡酸痛，初起未見紅腫，唯現發成塊狀的患處發燒烙手，後則全身繼起四五個不等。

【治法】 用青草，槌酒餅一呷半粒，米粉一撮，候發醉槌成條三寸長，搭手脈口男左女右。

外效方如下：君藥：大藤苦奈，埔銀葉，蚌壳草，夢陀蘿葉。

臣藥：珠仔草，桔葉，過江龍，車前草，白担當，生艾葉，六角菱，消山虎，葉下紅，鹽鬚雞藤，白牽牛，芙蓉花葉。

兼內服藥方：用蛇舌草一大撮槌爛拌酒取汁燉服，以渣敷患處。

附註：繼服數日可消。(方：由山湖楊文憲付來)

蛇蟻瘡方 (又名瓜棚瘡方)

廣州 趙良傑

【處方】 雄黃三錢，康青錢半，梅片五分，蒜頭一個，新瓦焙枯爲末開茶油搽。

凍瘡治療效方

黃益之

【處方】 生蘿蔔頂(即生葉處之頂)一斤。

【製法】 蘿蔔頂和水各一斤，煮至鹽沸，水色青，傾入盆內。

【用法】 把脚入水中浸，並用煮過的蘿蔔頂擦患處幾次，便癒。

二、疔 腫

生蛇疔

雲浮 黃瑞林

- 【處方】 雄黃二錢，輕粉五分，蟾酥二分，梅片一分，川足一條，木鱉子三粒，川連二錢。
- 【用法】 共研爲末，開茶敷之，立愈。
- 【適應】 治蛇疔兼治反唇疔，馬咀疔有效。

頭面火毒紅腫方

封開 李宏文

- 【處方】 大血散藥，秤星樹蘗。
- 【用法】 煲水洗，並用秤星樹葉和 地黃搗爛敷患處留口，勿敷密。
- 【適應】 不論男女，頭面紅腫，或腫成癰範大。

入腦蛇方

封開 唐日光

- 【處方】 生白頭翁一斤，連頭春爛取汁。
- 【用法】 用藥棉蘸汁，左耳痛滴右耳，右耳痛滴左耳。
- 【適應】 腦部刺痛。

夾頸蛇方

封開 黃會周

- 【處方】 鴨仔菜，生鹽少許。
- 【用法】 二味搗幼敷之，一次可消。
- 【適應】 生頸項兩旁的瘡。

反唇疔方

封開 鍾盛南

- 【處方】 會子虫（一名水晉家，生塘，坑，圳水中）。
- 【用法】 用網子撈來，搗爛開酒多搽患處，夏秋天熱，可開七夕水搽，搽完後再取馬蹄菇煎水，半洗半飲有效。
- 【適應】 生在人中唇口的瘡。

馬咀疔方

封開 伍伯強

- 【處方】雄雞冠血。
【用法】用刀仔割雄雞冠上，取血搽之即消。
【適應】唇口堅硬疼痛的瘡。

又方

封開 蘇次平

- 【處方】燕子巢泥。
【用法】研末，開芝麻油搽。
【適應】唇口堅硬疼痛的瘡。

又方

封開 植炳南

- 【處方】水仙花子錢半（研末）蟾酥五分。
【用法】用酒浸化蟾酥，入水仙末和勻敷疔處，留疔頭勿敷，將藥末開稀搽之亦可。
【適應】唇口堅硬疼痛的瘡。

又方

封開 廖文廷

- 【處方】生蜘蛛三隻。（去頭足）
【用法】搗爛敷。
【適應】唇口堅硬疼痛的瘡。

面上腫毒症效方

封開 廖文廷

- 【用法】用雞肝敷上痛處。

生紅線瘡方（俗謂生牛瘡） 陳德品

- 【處方】路邊白菊花根一兩，沙朥二片。
【用法】將藥蒸燒酒搽患處。

馬咀疔方

廣州救濟分會 趙良傑

- 【處方】雄黃精一錢，大梅片三分，鷄公冠血混和塗患處。
【適應】上唇人中處，初起是極少紅粘，繼而全身不舒服，寒慄發熱、劇痛。

石硬驗方（腳底結石） 順德 胡少泉

- 【處方】斑蝥十只，梘水一箇，熟煙二錢。
【用法】熱洗約半點鐘，從不痛處漸漸洗入，後用熟煙敷痛處。
【適應】石硬初起未化膿者，收效達百分之百。

三、癰 瘰

瘰癧方

封開 八耀榮

- 【處方】石斛，草薢仁各四錢，木燐子仁三錢。
【用法】共研末，放母雞孵廿一天久，取出瓶貯用，用時找仙人掌（生草）搗爛取汁，開搽患處可消。
【適應】項下結核等慢性淋巴腺病。

又 方

封開 蘇次平

- 【處方】夏枯草四兩，玄參二兩半，桔梗，甘草，海草，海蛤粉川貝，連翹，當歸，生地，生軍，薄荷，花粉，麥冬，枳殼各五錢，土硫三錢。
【用法】共為細末，用青鹽浸水，澄清和藥煮透，加神曲煉糊為丸，每服三錢，沸水送下。
【適應】項下結核等慢性淋巴腺病。

瘰癧外搽

封開 蘇次平

- 【處方】老石灰（炭火煨透），桐油。

- 【用法】經火煨過的老石灰，晒乾研極細末，和桐油開搽患處，在未搽前，先用花椒蔥頭二味並煎水洗淨患處，後搽此藥。

頸癰驗方

吳寧 高偉強 高程賓

- 【處方】石玉粉二兩（俗名石灰），藥餅半兩（俗名鹼水），草霜八錢（錫撈），麝香五分。
- 【製法】先將出爐潔白之石灰，臨風自發一天，不能近水，次後篩去砂石，然後將餅藥草霜麝香秤足分量，互相攪勻，用小竹子，用力調煉，連續三天，使藥有粘性成膏質狀態，以後裝置瓶中，使勿洩氣。
- 【用法】病者先靜臥椅上，用火酒消毒患處，然後以墨圈癰子週圍，認明大小，再用棉花將藥膏塗上。
- 【用藥時間】普通癰子可用二時半，每四十分鐘換藥一次，共換藥三次，如屬頑核，可增加半小時換藥一次，換藥時，先用小竹鑷住棉花蘸滾水洗之，然後敷上藥膏，大約二天至十天內癰子慢慢陷入化為膿水，再處方內服排毒，使由大小便出，癰子自然痊癒。
- 【禁忌】一歲至八歲勿用此藥，戒煎炒，色慾。

又方

龍有忠

- 【處方】刺來藤，標貢子藤，中根藤，和豬脚煎食有效。

頸癰驗方

順德 盧曦庭

- 【處方】白甲五十隻，蜜糖一兩。
- 【製法】將白甲去頭足，腸囊，加入蜜糖一兩，搗成糊狀共燉一小時。
- 【用法】燉後便可服食，病重者約服四十次，至癒為止。
- 【適應範圍】頸癰。

四、痔 瘡

痔瘡驗

龍門 鄭仁甫

- 【處方】 荆芥四錢，蟬衣四錢，防風四錢，甘草節四錢，透骨草三錢（即白楓仙花梗）瓦松三錢（人家屋頂有）癩蝦蟆草四錢（又名臭婆娘草）老醋一兩，食鹽四錢。
- 【製法】 將藥清水洗淨濃煎至沸，加入老醋次下食鹽，溶盡，離火，傾入痰盂內，令患者端坐其上蒸之，候藥稍溫，復於患處洗之。

痔瘡及新久紅白痢症

- 【處方】 槐花米一兩，黃片糖一兩
- 【用法】 將藥煎服，大約服一至十劑可癒。
- 【外搽法】 用白花蠟蟻草旱蓮草三兩濃煎再加米酒和勻燻洗。

煲水浸外痔藥

陳福平

- 【處方】 冬青頭，榕樹鬚，六耳凌。
- 【用法】 將藥用水煲至數沸，俟溫，坐盆內浸之。

增補治療痔核痔瘻驗方資料

廣州 林紹庭

披閱健康報於一九五三年十二月廿一日，和本九月十六日發表，關於治痔核、痔瘻報告，收到良好的效果，這是足見祖國醫學經驗遺產是值得重視的。惟幾種治法，適應六種脫出肛門外的初期內外痔，但除此以外，「十男九痔」以及婦女患病者亦復不少，所以我將枯痔法缺憾的地方，補充一些材料，並注意到廣大地區患此病的人民，採用簡便有效的治療方藥，以達到健康；對於建設社會主義社會的祖國有其意義和影響。

茲將治病方藥列下：

(甲)至於枯痔散，砒是主藥，但砒是一種有強力的腐蝕劑，且容易入血中毒，雖經過改良，還需要精益求精，俾使藥力更純淨，腐蝕力和中毒力減少，而對其效用不變，故精製砒，是有此必要，茲將製砒法如下：

- 白砒一兩—(1) 大黃，黃芩各五錢，水煎去渣，入砒煎乾取起晒乾。
(2) 菜豆四兩，水煎至滾二十分鐘，去豆，入藥同煎乾晒乾。
(3) 甘草一兩，酒二大碗，先將砒放於酒中浸廿四小時取出，和入韭菜汁二碗煎小頃，將砒放於湯中，蒸乾晒乾。
(4) 西瓜汁二碗將砒同煮乾晒乾。
(5) 瘦豬肉三兩，攪爛如泥，入豆粉二兩和勻，將砒包於肉粉中。又用豆粉包作皮，放炭中烘至煙盡為度，候冷去肉粉，取砒用。
(6) 明礬末五錢，放在磁鍋內，又將製砒研末，與白礬調勻，火炭至礬枯為度，取起退火毒。

- 【枯痔處方】(一) 蟾蜍，冰片，熊膽，射香，牛黃，三仙丹，琥珀，朱砂，兒茶，乳香，沒藥，製砒各等份，右研細末，調蒸流水塗痔核，一日二次（冰片先用酒精化開加入）。
註：三仙丹是用水銀，牙硝，白礬，提升為丹。福建漳州出品最純力足，亦是具有腐蝕力，與砒配合，增強其藥力，在治療過程較短，減輕其中毒分量，而且配合止痛消炎藥。
(二) 銅青二，枯礬二，製砒三梅片二（酒精化開）右研極細末，調蜜塗。
註：銅青亦是一種銅類腐蝕藥，會增強砒力，但可能痛加劇，宜加奴佛卡因。
(三) 爐甘石，兒茶，三仙丹，冰片，硃砂，滑石粉，等份，右細末，調豬脊髓塗。

(四)活鯽魚一尾，刮去腸雜，入白礬令滿，火煨全性，
研細末，調豬膽汁搽上。

按第一、二處方，枯痔代替藥方。第三、四處方，是治尚未脫出
肛外第一、二期痔核。

分泌物增多，帶起肛門四周圍發生濕疹。利用下藥敷。

【處方】 一、白芨、生石膏、黃連三錢，枯礬一錢，冰片、射香
各二分，石細米、調蛋白、冬蜜各一兩，塗四周圍。
二、胡粉，(Clumbi carbonas) 一兩，裝入銀罐，煨開
成老金色研末，又加冰片三分研末，搽。痔核、痔
瘻，效驗治療法。

【內服藥處方】 一、甘草丸——每服輕者三錢，重者五錢，槐花三錢
煎湯送下，一日一次，常閉結痔核有效。

二、土杉根七錢 萆豆四兩，梨樹寄生、梧桐樹寄生各
三錢，同猪大腸頭(肚門)一節，烘熟聯服三次
至七七次自消。

三、正川七一錢半，半七七錢七分，大黃三錢二分，
銀花四錢四分，白蘚皮三錢三分，荆芥四錢四
分，赤楊葉七錢七分，連翹、枝子各二錢二分，
衰弱者加北沙參七錢七分，肉苁蓉四錢四分。
右末，神曲糊爲丸，桐子大，分作七次，七日空
心服，痔并下血，服後半個月自消。

四、水魚(鼈)一只約一斤，去血、去頭、腸雜、用
酒燉熟取肉，另用干柿葉一個燒灰，合甘石、珠
砂、中白各一錢，同水魚、酒再燉片時取肉藥一
起食。治痔瘻穿腸有效。

五、槐花(炒黑)青黛一兩，當歸一兩，右爲末糊丸。
先嚼胡桃肉一個，用淡鹽送下三錢，治痔瘻。

六、槐角子一斤，當歸三兩，右爲糊丸、桐子大，
每服百餘丸。酒送下，治痔核腫劇痛。

【薰核方】 九里明(青草藥店買)榕樹葉各四兩，水三斤，黃沸二

十分鐘，將藥汁傾入窄口痰壺，乘熱坐在壺上蒸候藥汁溫洗痔核，并用下藥抹。

【處方】阿魏、鹿角霜各二錢，右爲細末，再加冰片五分，調水敷。

【痔核軟膏處方】（甲）萊豆粉二兩，甘草八錢，黃柏六錢，黃連、黃芩各二錢，硼砂一錢半，梅片一錢，天竹黃五錢，牛黃二錢，薄荷冰一錢（另研末）右細末。

（乙）木鼈子白一兩二錢，天花二錢，虎咬簕一兩二錢，白豬母乳一十二兩，白花菜六兩，葉下紅四兩。（青草藥店有賣）

【製法】麻油二斤半，將（乙）藥同熬至滴水成珠，去渣加入黃腊九兩（夏天十二兩）候稍冷加入（甲）藥散。溫度極微時，最後加入薄荷一錢搖勻，裝入錫管，注入肛門，每日二次。內痔出血，同服 Tab. xianan K. (2mg) 每日二、三片，血止停服，比較檢檢，地花效力準確。以上處方都是臨床實驗有效的藥物，作爲治療和參考材料。

五、疥 癬

疥癬效方

順德 陳義生

【處方】硫磺五錢，三仙丹一錢，黃連末四錢，冰片五分，大楓子油適量。

【用法】將藥爲末，塗搽患處。

癬疥藥

珠海縣 徐偉高

【處方】雞爪蘭（西會土名）是盆栽品，採葉搗爛擠汁搽患處，這藥汁放存愈久愈好，性能不變，塗後無刺激，搽後無痕跡。

松皮癬

賓州 歐治源

【處方】地膚子五錢，蒼耳子三錢，澤蘭葉三錢，蘇合皮八錢，防風二錢，京芥錢半，薄荷錢，黃芩二錢。

【用法】清水煎服。

六、濕疹

飛瘍方

揭陽 曾鴻節

【症狀】如發冷膜，頭面虛腫，癢不可言或麻痺，最忌風寒，癒後若被風寒所感即要復發。

【應用藥物】老虎婆。藥店無備此藥，要平時採取酒乾為粗末用時加入山羊紅一錢至二錢，油虫屎二錢至三錢，紅酒共蒸，蒸後取紅酒食下一二杯，餘渣包布擦患處皮上無不見效者，服此藥不知有油虫屎味者便是飛瘍無疑。