

四庫全書存目叢書編纂委員會編


齊魯書社

四庫全書存目叢書

魯新登字 07 號

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0478-0



9 787533 304782 >

EB04/02

四庫全書存目叢書·子部五〇

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 42.375 印張

1995 年 9 月第 1 版 1995 年 9 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0478-0

Z·27 子部定價：78300 圓

子部第五〇冊目次

子部·醫家類

馬師津梁三卷

〔清〕馬元儀撰
湖南師範大學圖書館藏清鈔本

..... 一

張氏醫通十六卷

〔清〕張璐撰
中國科學院圖書館藏日本文化元年思得堂刻本

..... 五一

馬師津梁三卷

〔清〕馬元儀撰

湖南師範大學圖書館藏清鈔本

附《四庫全書總目·馬師津梁

八卷》提要


馬師津梁卷之上



眩暈證



新



夫眩暈之候當分虛實二症內經曰諸風掉眩皆屬肝木河間曰暈眩者由風木旺而木復生火風火皆屬陽主乎動兩動相搏則為旋轉丹溪曰痰在上火在下火炎上而動其痰也此眩暈之屬實者也內經曰上氣不足頭為之苦傾目為之眩曰上虛則眩曰髓海不足則腦轉耳鳴而眩冒此眩暈之屬虛者也至於治法風則分其扶寒扶火而解之火則辨其或微或甚而清之痰則審其屬寒屬熱而消之若所謂上虛者陽中之陽虛也凡飢飽勞倦大吐大下汗多亡陽者多有之此宜補脾肺之氣所謂髓海不足者陰中之陰虛也凡房室過度婦人產後金瘡失血過多者多有之此宜補肝腎之陰又有大醉之後濕熱上蒸而暈者傷其陰也有大怒之後木肆其強而暈者傷其氣也有痰飲留中治節不行而暈者脾之

弱也。此又有餘中之不足也。當各因其證治而求之也。

附方十枚

芎朮湯

治冒雨中濕眩暈嘔逆頭重不食

川芎

半夏

白朮

炙草

加姜煎服

升瀉方

治眩暈不可當者

大黃 三次酒炒為末

每服一錢至二錢茶調下

子和芎朮湯

治上焦風熱頭目眩運

大黃

荆芥

貫仲

為末水煎服以利為度

防風

防風通聖散

表裡之劑

防風

川芎

當歸

芍藥

大黃

薄荷

麻黃

連翹

芒硝

石膏

黃芩

桔梗

滑石

甘草

荆芥

白朮

梔子

為末加姜煎服

旋覆花湯

治中脘伏痰嘔逆眩暈

旋覆花

半夏

橘紅

乾姜

枳殼

人參

甘草

白朮

白茯苓

加姜煎服

益氣補腎湯

補氣之劑

人參

黃芪

白朮

白茯苓

炙草

山藥

山萸

加姜煎服

半夏白朮天麻湯

治氣虛扶痰眩暈

天麻 半夏 白朮 人參
 蒼朮 陳皮 黃芪 澤瀉
 白茯苓 神曲 麦芽 乾姜
 黃柏

水煎服

補肝養榮湯

補血之劑

當歸 川芎 芍藥 熟地
 陳皮 甘草

水煎服

沉香磁石丸

治上盛下虛。頭目眩暈。耳鳴耳聾。

沉香 蔓荊子 青蘘 甘菊
 巴戟 葫蘆 山藥 川椒
 磁石 山茱萸 陽起石 附子

為細末。酒煮米糊和丸。梧子大。每服五十丸。加至七十九。空心鹽湯送下。

青黛散

搗鼻取涎。治眩神翳。

牙皂 玄胡索 青黛

為末水調。豆許。鼻內灌之。其涎自出。

汗證

夫汗者。陰氣之所化也。肌表者。衛氣之所居也。汗生于陰。而出于陽。故汗之有無。由營氣以為之。變化而汗之出入。由衛氣以為之。啓閉也。然有自汗。有盜汗。有汗者。濺。然汗出無時。而動作則益甚。盜汗者。寐中適身汗出。覺來便收者也。臟氣法時論曰。肺病者。肩背痛。汗自出。腎病者。寢汗出。憎風。故自汗者。其病在肺。衛氣不固。腠理不密。而汗隨氣散也。盜汗者。其病在腎。陰虛者。陽必騰之。故陽蒸陰分。而汗隨火泄也。此其大法如此。然非參之以脈。合之以症。亦何從辨其陰陽乎。總之。脈數者。多陽。脈遲而微者。多陰。汗出而熱者。多陽。汗出而寒者。多陰。煩躁身熱。自汗者。多陽。厥逆身寒。汗出者。多陰。盛者。陽必衰。宜以參附。芩附之屬。寔表固陽。盛者。陰必弱。宜以當歸。六黃。湯。或六味地黃湯之屬。治火補陰。又有自汗不止。不

禁外風者。勝理之不密。亦陽虛之屬也。治宜實表散邪。玉屏風散主之。有自汗身重。麻緩而大者。此濕氣之乘脾。亦陰盛之屬也。治宜實表去濕。防己黃芪湯主之。若汗出而喘。肢腕神昏者。此其六陽氣絕。陰與陽相離。絕汗乃出。不可為也。

附方十二枚
周衛湯

治濕勝有汗。補衛氣虛弱。表虛不任外寒。

黃芪 麻黃根 生甘草 當歸稍

生黃芪 半夏

猪苓

羌活

羌活 生地

五味

紅花

茯苓

水煎服

羌活勝濕湯

治濕之劑

羌草 黃芪

生甘草

生黃芪

酒黃芪

人參

川芎

薑本

防風

獨活

升麻

柴胡

細辛 蔓荊子 薄荷

水煎服

參附湯

治真陽不足。上氣喘急。自汗盜汗。氣短頭暈之等症。

人參 熟附

加薑煎服

正元散

治下元氣虛。臍腹脹滿。心脇刺痛。泄利自汗之等症。

紅豆

白朮

川芎

烏藥

為細末

加姜煎服

當歸六黃湯

治盜汗

當歸

生地

熟地

黃柏

炮姜

茯苓

附子

乾姜

黃芪

補紅

茯苓

山藥

黃芪

人參

肉桂

川芎

黄芩 水煎服 黄连 黄芩

正氣湯

益陰之劑

黄柏 知母 炙草

水煎卧時服

大補黄芪湯

補氣益血之劑

黄芪 防风 山萸肉 當歸

白朮 肉桂 川芎 炙草

五味 人參 白茯苓 熟地

肉桂裝

加刺煎服

玉屏風散

固表之劑

防风 黄芪 白朮

加刺煎服

治盜汗方

麻黄根 牡蠣 黄芩 人參

龙骨 枸杞根 大棗

水煎服

黄芩六一湯

治男婦氣虛不足。体倦痿黃。自汗盜汗。

黄芩 炙草

加刺煎服

白朮散

牡蠣 白朮 防风

為末。溫水調服

黄芪建中湯

治表虛自汗

芍藥 官桂 炙草 黄芩

加刺煎服

健忘證

夫健忘之症。古人方論皆以為心腎不交所致。然究不詳其所以交不交之故。今試言之。夫心之與腎。自水火也。自壯也。心以陽藏而位乎南。得卦之離。

為陽也。而奇中有偶。則陽中有陰也。故心居火。而火中有至陰之精。以降流于腎者也。腎以陰藏。而位乎北。得卦之坎。一為陰也。而偶中有奇。則陰中有陽也。故腎雖屬水。而水中有真陽之氣。以上溯乎心者也。所以至人淡薄無求。以寧其心。恬靜寡慾。以安其腎。但使離之陰靜。則心可交。坎之陽寂。則腎可通。此交之道也。若其煩勞太過。則心陽亢而上炎。嗜慾無窮。則腎陰弱而下趨。陽亢者陰不生。而心中無陰。將何以下通于腎。精去則氣亦去。而腎中無陽。將何

以上交于心。此不交之道也。人知心之火。腎之水。而不知水中之火。中之水也。人知心之火。降水之火。升而不知心中之陰。始能降于腎。中陽始能交於心也。不然心火下流。腎且為其所侮。腎水上凌。心且受其賊邪。又何交之足云。至于治法。古人用天王補心以抑心火。而使之下。六味地黃丸以滋腎水。而使之上。愚又以為不然。夫欲心之交。須養其血。欲腎之交。必固其氣。豈抑心火滋腎水之謂哉。況乎心居于上。腎居于下。其間心腎而居者為脾。道家以心為嬰

兒。腎為姪。皆脾為黃婆。黃婆者媒妁也。所以交引水火使之相見者。實黃婆之力居多。故雖治其心腎。又必調養中州。始得以勝通上。滋下之任也。余因世之治健忘者。動稱心腎不交。及觀其論方。罕有能盡乎此者。故為辨之如此。其他又有因痰因火因鬱之不

同。當各因其症而治之。

附方七枚

歸脾湯

補養之劑

人參

茯神

龍眼肉

黃芪

酸枣仁

白朮

當歸

遠志

木香

炙草

加製紅棗煎服

寧志膏

人參

酸枣仁

辰砂

乳香

為末。蜜丸。薄荷湯下。

二丹丸

天冬

熟地

升參

養丸。硃砂為衣。

菖蒲益智丸

菖蒲

遠志

牛膝

桔梗

人參

桂心

茯苓

附子

養丸。桐子大。每服三十丸。食前用溫酒米飲任下。

補心丹

寧心保神。益血固精。強力益志。令人不忘。

人參

當歸

五味子

麥冬

天冬

東仁

柏仁

白茯苓

玄參

丹參

桔梗

遠志

生地

黃連

養丸。硃砂為衣。燈心湯下。

孔子大聖枕中丹

常服令人聰明

龜甲

龍骨

遠志

菖蒲

為末。酒服方寸匕。日三服

治多忘方

菖蒲 遠志 茯苓 茯神 人參

為末。酒服方寸匕。日三夜一。五日効。

癩狂證

難經云。重陽者狂。重陰者癡。故癩狂之病。其本不同。狂病之發。妄行妄言。不避親疏。癩病之發。或歌或哭。喜常獨處。狂病成于大驚大怒。故其候多躁而常醒。癩病成于積憂積鬱。故其候多靜而常昏。此其陰陽之辨。自有冰炭之異。故狂病多火。而病通肝胆。非寒下之藥。不足以殺其木火之邪。癩病多痰。而病涉心脾。非溫燥之劑。不足以破其沉滯之氣。然此特其大法耳。終當以脈之遲速。症之寒熱。辨其屬陰屬陽。為痰為火。而分治之。庶無失矣。

附方三枚

三聖散

湧痰之劑

瓜蒂

附風

藜蘆

為粗末。每服五錢。以薑汁三茶盞。先用二盞煎。

三五沸去蓋。注水入水一。善煎至三沸。却將先
二蓋同一。煎熟。二沸去查。澄清。放溫。徐服之。
以吐為度。不必盡劑。

控涎丹

次下之劑

甘遂

紫天戟 白芥子

為末。煮糊。丸。梧子大。曬乾。臨卧淡姜湯下。
湯下五十丸。

寧心丸

清心安神之劑

好硃砂一兩

右將熟絹包。裹綠茶。豬心一枚。竹刀切開。抵
去血。入硃砂包于內。再縛合。外用甜茅殼重裹。
麻皮紮定。無灰酒二升。入砂礮內煮。酒盡取出。
朱砂另研。以豬心細切。砂礮內研爛。却入後藥
末。并朱砂末。同為丸。留少許。朱砂為衣。藥末酒
隔日研下。至兩午煮。豬心日乾。早煮熟。去皮核。
取肉四兩。用。

人參 茯苓 當歸 石菖蒲
乳香 杏仁

為末和丸。桐子大。以留下朱砂為衣。每服五十
丸。人參湯送下。

痢證

夫痢之為病。發作無時。卒然昏仆。口中作聲。筋脈痠
痲。冷汗吐沫。或一二時。或半日許。乃醒。其發也。或數
月一發。或數日一發。或一日二三發。病愈深者。發愈
頻也。原其受病之由。或以大驚卒恐。或以飲食不節。
以致藏氣不平。滯而成涎。留積結絡。乃成此病。其後
一遇驚恐。奔走勞力之事。觸動藏氣。則其所積痰涎
一時暴逆。如風之發。如火之熾。莫有能止之者。所以
卒然昏仆。隨其五藏所傷。發為五證。錢氏方論言之
詳矣。至于治法。丹溪所云。尋痰尋火。分多少治。雖為
合論。但其所用。葱連梅。薑刺。夏南星之屬。非肩弘任
重之品。恐不足以迅掃毒邪。而驅除痼疾。當用礞石
滾痰丸為主。審其何藏受病。即以何色為衣。以為引
經。如心病用硃砂。肝病用青黛。之使之直達病所。驅

除痰熱後以清心安神之藥調治百日可取愈甚
者如子和所云三聖散于暖室中使汗吐下三法並
行次服通聖散百餘日若不先去其蓄痰積熱而惟
以姑息為事雖多服湯液吾未見有能愈者也

附方六枚

琥珀壽星丸

天副星片

極坑用火煨燒坑紅出炭淨入好酒一升添火
穴中放入南星盛穴勿令洩氣過一宿取出焙

未用

琥珀屑 硃砂二兩一兩為末

右以猪心血。新汁糊丸。如桐子大。每服五十九
人參湯送下。

五生丸

治痲脈弦細緩者

南星 半夏 川烏 白附子

大豆

為細末滴水為丸每服三丸至五丸。不過七丸

姜湯下

安神丸

黃連 珠砂 生地 歸身

炙草

為末蒸餅和丸如黍米大。珠砂為衣。津液下五
十九丸。

清神湯

茯神 黃連 杏仁 石菖蒲

榔仁 遠志 甘草

水煎服

龍腦安神丸

治男女五般痲瘋。無問遠近發作無時

茯神 人參 地骨皮 珠砂

麝香 犀角 馬牙硝 龍骨

射香 牛黃 桑皮 甘草

金箔

蜜丸如彈子大。金箔為衣。冬月溫水下。夏月涼
水下。

犀角丸

治風痲發作有時。揚手擲足。口吐涎沫。不省人事等病。

犀角

赤石脂

朴硝

芩藜

薄荷葉

為末。麩糊丸。桐子大。每服二三十丸。溫水下。日三服。

厚朴丸

治痲瘡。病久成核。

厚朴

蜀椒

川烏頭

紫苑

吳茱萸

菖蒲

紫胡

桔梗

茯苓

官桂

皂角

炮姜

人參

黃連

巴豆霜

右為末。入巴豆霜研勻。煉蜜丸。如桐子大。每服二丸。漸加五七丸。以利為度。

驚恐證

夫驚症有二。有因病而驚者。有因驚而病者。內經云。二陽一陰。發病主驚駭。又東方青色。入通于肝。其病

發驚駭。又陽氣與陰氣相搏。水火相惡。故惕然而驚。此因病而驚者也。經云。驚則氣亂。而心無所倚。神無所歸。慮無所定。此因驚而病者也。因病而驚者。藏氣先傷。當審其火盛則清之。痰凝則消之。中虛則補之。因驚而病者。神氣暴奪。當以安神養心為主。然神去則合空。合空則液聚。恐非兼理痰氣不可也。而恐亦有二。內經曰。肝氣虛則恐。血不足則恐。又心怵惕思慮則傷神。傷則恐懼自失。此因病而恐者也。曰恐則氣下。恐懼者神蕩憚而不收。恐懼而不解則傷精。此因恐而病者也。因病而恐者。精神內弱。當養心血。兼補肝腎之精。因恐而病者。神氣多鬱。當調養心脾。兼微和其痰氣。然而治驚頭者。治恐寔難。治外來之驚。恐猶易。治內生之驚。恐寔難。蓋驚則傷于氣。虛可以卒致。恐則傷于精。傷難復。外來之驚。恐病出于暴。但使氣平即已。內生之驚。恐損成乎漸。使非恢復精神不已。此驚恐二症。病原之異。治法之分。不可不詳辨也。

附方十枚

温膽湯

治心胆虛怯。觸事易驚。氣鬱生涎。短氣自汗。
半夏 枳實 竹茹 橘紅

甘草 姜枣煎服

黃連安神丸

治心亂煩熱。胸中氣亂。兀欲吐。膈上伏熱。
硃砂 黃連 炙草 生地 歸頭

為末。蒸餅丸。黃米大。每十九津下。

寒水石散

清熱之劑

寒水石 滑石 生甘草

為末。姜枣湯下。

鎮心丸

治心血不足。怔忡多夢。如墮崖谷。
酸枣仁 車前 白茯苓 麥冬
五味子 茯神 肉桂 熟地

龍齒 天冬 遠志 山藥

人參 硃砂

家丸米飲下

琥珀養心丹

琥珀 龍齒 遠志肉 石菖蒲

茯神 人參 酸枣仁 當歸

生地 黃連 柏子仁 硃砂

牛黃

為末。猪心血為末。凡黍米大。金箔為衣。燈心湯

送下五錢

定志丸

菖蒲 遠志 茯神 人參

為末。家丸。桐子大。朱砂為衣。米飲下。

人參散

治肝腎虛而多恐。不能獨臥

人參 枳壳 五味子 桂心

芍花 茯神 山茱萸 枸杞子

柏子仁 熟地

為末温酒調下

升漢方

治周本心年六十。形氣俱衰。因大恐。正月間。病心不自安。如人將捕之狀。夜卧亦不安。兩耳後亦見火光。炎上。食飲雖進。而不知味。口乾而不欲飲。

人參

白朮

歸身

陳皮

黃柏

炙玄參

水煎服

茯神散

治胆胃不足。心神恐怯

茯神

遠志

防風

細辛

白朮

前胡

人參

桂心

熟地

菊花

枳壳

為末加姜煎服

補膽防風湯

治胆虛目暗眩冒。夢見闕訟。恐惧而色變。防風 人參 細辛 川芎

甘草

茯神

獨活

前胡

為末每服四錢。加姜煎服

怔忡證

夫怔忡者。心中振動不安。即心悸也。考之內經。無有言怔忡者。金匱獨出二條云。食少飲多。水停心下。甚者則悸。半夏麻黃丸主之。脉結代。心動悸者。炙甘草湯主之。故古人云。心悸之由。不越心虛與飲二者是也。蓋心者。藏神之地。心虛則神去。神去則心無所主。而振恐不安。故用炙甘草湯。以益虛而養神也。又心為火藏。而水能勝之。若水停心下。則賊邪逼處。而心君焉能泰然。故用半夏麻黃丸以行水蠲飲也。然此特其一端耳。愚謂虛而悸者。則有氣虛血虛之異。水而悸者。則有中焦下焦之分。氣虛者中虛也。宜補其胃。血虛者心虛也。宜養其心中焦之水。胃府之所積也。治宜分利而兼補胃陽下焦之水。腎藏之所積也。治宜温補而兼逐水邪。此二者之中。又有不同如此。醫理深。豈一證所可綫哉。

附方八枚

茯苓飲子

治痰飲伏于心胃。悸動不已。

赤茯苓

半夏

茯苓

炙甘草

橘紅

檳榔

沉香

炙甘草

姜煎服

濟生益榮湯

當歸

黃芪

小豆

杏仁

柏子仁

茯苓

木香

白芍

人參

炙甘草

紫石英

炙甘草

姜煎服

酸棗仁湯

酸棗仁

遠志

黃芪

白茯苓

道子

當歸

人參

茯苓

陳皮

炙甘草

姜煎服

辰砂寧志丸

辰砂

白朮

鹿茸

黃芪

茯苓

人參

菖蒲

為末入辰砂研勻。桑肉和丸。如桐子大。每三十丸。溫酒米飲任下。

天王補心丹

炙甘草

遠志

菖蒲

香附

日甘

熟地

茯苓

骨皮

人參

當歸

牛膝

黃芪

木通

養心丸服

滋陰抑火湯

當歸

芍藥

生地

川芎

黃連

知母

熟地

肉桂

甘草

水煎服

龍齒丹

治心火虛寒。怔忡不已。或痰多恍惚者。

龍齒

遠志

杏仁

官桂

當歸

琥珀

附子

南星

木香

沉香

熟地

紫石英

養心脾氣血而已。縱有微痰微火。所不計也。若夫不

辰砂遠志丸

安心神化風痰

石菖蒲

遠志

人參

茯神

辰砂

川芎

山藥

鉄粉

麥冬

細辛

天麻

半夏曲

南星

白附子

為末。生薑汁入水。煮糊丸如菟豆大。朱砂為衣

臨卧等湯下

得寤者。非脾濕有餘。即精神內弱。蓋衛氣行陽則寤

行陰則寐。故寐屬陰而寤屬陽也。不寐由陰氣之虛

不寤由陽氣之困。故不寐當養陰而不寤當養陽也

若年高之人。晝反多卧。而夜反不寐者。此其陰陽兩

敗。營衛之行失其常經。不可治也。

附方四枚

酸枣仁湯

治虛勞虛煩不得眠

酸枣仁 甘草 知母 茯苓

卧證

夫不寐之病。蓋有多端。若傷寒傷風瘧疾而然者。邪

氣內擾也。飲食過度而然者。胃不和則卧不安也。憂

勞憤鬱而然者。痰火內亂也。曲運成神機而然者。心

血耗損也。大病新產。年高而然者。氣血交傷也。然雖

有雖種不同。總之虛實二字。足以盡之。若體氣素盛

偶為風寒所客。痰火所擾。飲食所滯。而致不眠者。此

為有餘。但去其邪而正自寧。若體氣素弱。或因過勞

或因病後。或以憂思。而致不寐者。此為不足。但宜調

驚甲丸

治四肢無力。瞻虛不眠

驚甲 酸枣仁 羌活 牛膝

黃芪 人參 五味子

蔡丸酒送下