

續修四庫全書



《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

一〇一·子部·醫家類

辨證錄十四卷 洞垣全書脉訣闡微一卷 (辨證錄卷十三至洞垣全書脉訣闡微卷一)

〔清〕陳士鐸撰

醫學心悟五卷附華佗外科十法一卷

〔清〕程國彭撰

雜病源流犀燭三十卷

〔清〕沈金鳌撰

洞辨
垣全書脉訣闡微錄

證

二
〔清〕陳士鐸 撰

據南京圖書館藏清乾隆十二年黃
嚴槐蔭草堂校刻本影印原書版
框高一八二毫米寬二七四毫米

辨證錄外科卷之十三

山陰陳士鑄敬之甫號遠公爻號朱華子著述

會稽陶式玉尙自號存齋文號

參訂

背癰門七則

人有背心間先發紅爛後漸漸紅腫此發背之兆也最爲可畏古人云外大如豆內大如拳外大如拳內大如盤言其外小而內實大也然而癰疽等毒必須辨其陰陽有先陰而變陽者有先陽而變陰者有前後俱陽者有

前後俱陰者陽症雖重而實輕陰症雖輕而實重先陰

辨證錄

卷之十三 外科背癰

而變陽者生先陽而變陰者死病症既殊將何以辨之

陽症之形必高突而腫起陰症之形必低平而陷下陽

症之色純紅陰症之色帶黑陽症之初起必痛陰症之

初起必癢陽症之潰爛必多其膿陰症之潰爛必多其

血陽症之收口身必輕爽陰症之收口身必沉重至于

變陰變陽亦以此消息斷斷不差也倘見紅腫而高突

乃陽症之癰也乘其肉腫初發毒猶未化急以散毒之

藥治之可隨手愈也發背而至橫決者皆因循失治以

致破敗而不可救陽變陰者多矣救癰如救火宜一時

撲滅切勿見爲陽症無妨而輕綏治之也方用急消湯

忍冬藤二兩茜草三錢紫花地丁一兩甘菊花三錢貝

母二錢黃柏一錢天花粉三錢桔梗二錢生甘草三錢

水煎服一劑輕二劑又輕三劑全消不必四劑也此方

消陽毒之初起極神旣無迅烈之虞大有和解之妙世人不知治法謂陽毒易於祛除孟浪用狼虎之藥雖毒幸消散而真氣耗損於無形往往變成別病乃醫者成之也

人有背心發瘰癧甚已而背如山重悠悠發紅暈如盤之

辨證錄

卷之十三 外科背癰

大此陰癰初起之形象也最爲可畏尤非前症陽癰可

比乃一生罪孽鬼祟纏身必然譖語胡言如見此等症

候本不可救然而人心善惡成于一念之遷悔求生無

術亦見醫道無奇蓋陽症有可救之術陰症豈無可生

之理總在救之得法耳大約陰癰之症雖成于鬼祟之

纏身然必正氣大虛邪得而入之也設正氣不虛邪將

安入故救陰癰之症必須大用補氣補血之藥而佐之

散鬱散毒之品則正旺而邪自散矣方用變陽湯人參

二兩黃芪二兩金銀花半觔煎湯代水附子一錢荆芥

炒黑三錢柴胡一錢白芍一兩天花粉五錢生甘草五錢井花水煎汁一碗服渣再煎服後陰必變陽而作痛再一劑而痛亦消再服一劑而全愈竟消滅無形也然人不致皮破血出斷不肯信雖然先用此等之藥以治發背母論病人不肯服卽醫生亦不肯用或醫生知用此治療而病人之家亦不肯信往往決裂潰爛瘡口至如碗大而不可收始悔參芪之遲用矣予旣論此症又多戒辭勸人早服此方萬不可觀望狐疑喪人性命蓋陽毒可用攻毒之劑而陰毒須用補正之味用人參黃芪以補氣氣旺則幽陰之毒不敢入心肺之間而金銀花性補善解陰毒得參芪而其功益大然非得附子則不能直入陰毒之中而又出于陰毒之外毒深者害深又益之生甘草以解其餘毒然毒結于背者氣血之壅也壅極者鬱之極也故加柴胡荆芥白芍天花粉之類消痰通滯開鬱引經自然氣宣而血活痰散而毒消矣人有背癰潰爛洞見肺腑瘡口黑陷身不能臥口渴思飲人以爲陽症之敗壞也誰知是陰虛而不能變陽乎夫

背癰雖有陰陽之分及至潰濃之後宜補內不宜消外

則陰陽之症一也潰爛而至肺腑皆見此乃失補之故使毒過于沿燒將好肉盡化爲瘀肉耳肉癰自必成腐肉而腐自必洞見底裏見此等症候亦九死一生之兆也倘胃氣健而能食者猶可救倘見食則惡者斷無生意雖然能用參芪歸熟亦有可生不可棄之竟不救也方用轉敗湯救之人參二兩生黃芪一兩熟地二兩肉桂二錢白朮四兩當歸一兩金銀花四兩麥冬二兩山茱萸一兩遠志三錢北五味子一錢茯苓三錢水煎服一劑而胃氣大開者即可以轉敗爲功也倘飲之而稍能健飯亦在可救惟恐飲之杳無應驗者是胃氣已絕也不必再治之矣或飲之而飽悶少煩而少安者亦有生機此方補其氣血而更補其肺腎之陰蓋陰生則陽長陰陽生長則有根易于接續而後以金銀花解其餘毒則毒散而血生血生而肉長肉長而皮合必至之勢也倘日以解毒爲事絕不去補氣血之陰陽則陰毒不能變陽有死而已可勝悲悼哉

人有背癰將愈而瘡口不收百藥敷之絕無一驗人以爲餘毒之未盡也孰知是陰虛而不能濟陽夫癰疽初起

則毒盛變膿則毒衰濃盡則毒化矣瘡口不收乃陰氣之虛而非毒氣之旺世人不知治法尚以敗毒之藥攻之是已虛而益虛也欲其肌肉之長何可得乎然亦有用補法而仍未效者但用陽分之品以補其陽而不用

陰分之藥以補其陰也獨陰不長而獨陽亦不生癰疽至膿血已盡則陰必大虛止補其陽則陽旺陰虛陰不能交於陽矣陽有濟陰之心陰無濟陽之力所以愈補陽而陰愈虛而瘡口愈難合也治法必須大補其陰使陰精盛滿自能灌注于瘡口之中不用生肌外敷之藥

辨證錄

卷之十三 外科背腫

五

而瘡口之肉內生矣方用生膚散麥冬一兩熟地二兩

山茱萸一兩人參五錢肉桂一錢當歸一兩忍冬藤一兩白术五分水煎服二劑而肉自長又二劑外口自平又二劑全愈此方補陰之藥多於補陽使陰勝陽也然補陽仍是補陰之助以其能入陰之中交於陽之內也忍冬藤非特解餘剩之毒取其能領諸藥至于瘡口之間也

人有背瘡長肉瘡口已平忽然開裂流血人以為瘡口之肉未堅也誰知是色慾惱怒之不謹耳大凡瘡癰之症

最忌色慾次忌惱怒犯惱怒新肉有開裂之虞色慾新肉有流血之害犯惱怒者不過疾病犯色慾者多致死

亡其瘡口開裂之處必然色變紫黑而流水之處必然肉變敗壞矣此時必須急補氣血萬不可仍治其毒蓋

前毒未盡斷難收口復至腐爛新肉不堅而自湧決裂也况發背新愈之後其精神氣血盡爲空虛若交合泄精遂至變害非常含補氣血又安求再活乎卽補氣血以些小之濟欲收危亂之功大廈傾頽豈一木能支哉故又須大劑救之而後可方用寒變回生湯人參四兩

辨證錄

卷之十三 外科背腫

六

黃芪三兩當歸二兩北五味子二錢麥冬二兩肉桂三

錢白术二兩山茱萸五錢忍冬藤一兩茯苓一兩水煎服一劑而肉不腐二劑而肉自生三劑而皮仍合四劑瘡口平復切戒再犯再犯無不死者卽再服此方無益也可不慎乎此救瘡湯壞症仙丹不止療發背愈後犯色之敗腐也人疑泄精以致決裂宜用熟地以大補之何故反置而不用以熟地補陰最緩而症犯甚急所以舍熟地之不可用此方服數劑之後各宜減半惟多加熟地留爲善後之計耳

人有夏月生背癰瘍口不起脈大而無力發熱作渴自汗盜汗用參芪大補之劑益加手足逆冷大便不實喘促嘔吐人以爲火毒太盛也誰知是元氣大虛補不足以濟之夫癰分陰陽瘍口不起乃陰症而非陽症也脈大似乎陽症大而無力非陰而何發熱作渴此水不足以濟火故陡渴陡汗也既陰症似陽用參芪陽藥以助陽正氣足以祛陰而返陽矣何以愈補而反逆冷嘔吐此陰寒之氣正甚而微陽之品力不能勝耳非加附子辛熱之品又何能斬關入陣以祛蕩其陰邪哉方用助陽

辨證錄

卷之十三 外科背癰 二

消毒湯人參半効黃芪一兩當歸四兩白朮四兩陳皮

一兩附子五錢水煎膏作二次服諸症退連服數劑瘍起而潰乃減半又用數劑而愈此非治癰之法也然治

癰之法而輕治此等之症鮮不立亡可見治癰不可執

也大約陽癰可以消毒化痰之藥治之陰癰之病萬不

可用消毒化痰之味此實治癰之變法醫者不可不知

人有背生癰疽潰膿之後或發熱或惡寒或作痛或膿多

或流清水自汗盜汗膿成而不潰口爛而不收人以爲

毒氣之未盡也誰知五臟虧損血氣大虛之故凡人氣

血壯盛陰陽和平何能生毒惟其臟腑內損而後毒氣得以內藏久之外泄及至癰疽發出其毒自不留內然臟腑原虛又加流膿流血則已虛益虛觀其外瘍口未斂似乎有餘審其內氣血未生實爲不足法當全補不宜偏補夫一臟致有偏勝之虞也方用十全大補湯最妙以其合氣血而兩補之耳然而用之往往不效者非方之不佳乃用方之不得其法耳夫背癰何等之症豈用尋常細小之劑所能補之必須多加分兩大劑煎飲庶幾有濟乎因酌定一方以請正于同人也用人參一

辨證錄

卷之十三 外科背癰 八

兩黃芪二兩白芍五錢肉桂二錢川芎三錢熟地二兩

當歸一兩白朮五錢茯苓五錢生甘草三錢水煎服服一劑有一劑之效世疑此方絕不敗毒如何化毒而生

肉不知癰疽未潰之前以化毒爲先已潰之後補正爲急縱有餘毒未盡不必敗毒蓋敗毒之藥非寒涼之品

節消耗之味也消耗則損人真氣寒涼則傷人胃氣真

氣損則邪氣反盛胃氣傷則穀氣全無又何能生長肌

肉哉惟十全大補湯專助真氣以益胃氣故能全效耳

且此方不特治背癰之已潰卽瘍瘍已潰者皆宜用之

肺癰門四則

人有胷膈間作痛咳嗽時更加痛極手按痛處尤增氣急人以爲肺經生癰也誰知是肺熱生癰耳夫肺爲嬌臟藥食之所不到者也故治肺甚難肺熱害肺既可成癰將何法療之療之法似宜救火以瀉肺肺藥不可入而肺爲脾之子脾經未嘗不受藥也補其脾經之土則土能生金也平其肝經之木則金不能尅木矣清其心經之火則火不能刑金也三經皆有益于肺無損于金則肺氣得養而後以消毒之品直解其肝中之邪何難于辨證錄

卷之三

外科肺癰

九

不收乎方用全肺湯元參三兩生甘草五錢金銀花五兩天花粉三錢茯苓三錢白芍三錢麥冬二兩水煎服一劑而痛減二劑而內消矣大凡癰疽之症必須內消不可令其出毒內消之法總不外脾肝心三經治之而無別消之道或曰肺之子腎也獨不可治腎以消乎然肺癰之成雖成于火燭肺金之液實因肝氣之自虛也補腎雖使肺氣不來生腎惟是肺氣相通補腎之水恐肺氣下降而火毒反不肯遽散不若止治三經使肝氣得養自化其毒不遺于腎之爲妙也

人有胷膈作痛咳嗽不止吐痰更覺疼甚手按痛處不可忍咽喉之間先聞腥臭之氣隨吐膿血此肺癰不獨已成而且已破矣夫肺癰未破者易于消已破者難于治爲膿血未能遽淨耳然得法亦不難也蓋肺之所以生癰者因肺火不散也然肺火來因肺氣虛也肺虛而火留於肺火盛而後結爲癰不補虛而散火而未成形者何以消已成形者何以散既潰爛者又何以愈哉是虛不可不補而補虛者補何礙乎必須補肝氣之虛而肺不能直補其氣補胃氣之虛則肺氣自旺也今癰已破矣多吐膿血則肺氣尤虛雖毒尚存不可純瀉其毒于補氣之中而行其攻散之方而行其攻散之法則毒易化而正氣無傷方用完肺飲人參一兩元參二兩蒲公英五錢金銀花二兩天花粉三錢生甘草三錢桔梗三錢黃芩一錢水煎服一劑膿必多二劑膿漸少三劑終亦能入肺不單走於胃然而入胃者十之八入肺者十

之二仍是治胃益肺之藥也或問肺癰已破病已入裏似不宜升提肺氣南昌喻嘉言謂宜引之入腸而先生仍用桔梗以開提肺氣恐不可爲訓嗟乎予所用之藥無非治胃之藥藥入于胃有不引入腸者乎然肺氣困頓清肅之令不行用桔梗以清肺上氣通而下氣更速然則上之開提正下之迅遂也

人有久嗽之後肺受損傷皮膚黃瘦咽嗌嘶啞自汗盜汗臥眠不得口吐稠痰腥臭難聞而毛悴色憔悴之時必忍氣須臾輕輕吐痰始覺膈上不痛否則必大痛不已

辨證錄

卷之十三 外科 肺癰

十一

氣息奄奄全無振興之狀人以爲肺中生癰也誰知是肺痿而生瘡耳此症本係不救之病然治之得法調理又善亦有生機者夫肺癰與肺痿不同肺癰生于火毒治之宜速肺痿成于勞傷治之宜緩火毒宜補中用瀉勞傷宜補中帶清瀉與清不同而補則同也惟是瀉中用補可用大劑清中用補可用小劑忽忘勿助若有若無庶能奏功也方用養肺去痰湯金銀花三錢生甘草五錢生地二錢麥冬三錢紫苑五錢百部五分百合二錢款冬花三分天門冬一錢貝母三分白薇三分水煎

服服十劑膈上痛少輕者便有生機再服十劑更輕再服十劑而漸愈前後共服六十劑而始全愈也是方不寒不熱養肺氣于垂絕之時保肺葉子將發之頃實有奇功倘捷效於一旦必至輕喪于須臾寧忍耐以全生切勿欲速而送死

世有膏梁子弟多食厚味燔熬炙煎炒之物時時吞嚥或美醞香醪乘興酣飲遂至咽乾舌燥吐痰唾血喘急膈痛不得安臥人以爲肺經火熾也誰知是肺癰已成耳夫肺爲五臟之蓋喜清氣之薰蒸最惡燥氣之炎逼

辨證錄

卷之十三 外科 肺癰

十二

今所飲所食無非辛熱之物則五臟之中全是一團火氣火性炎上而肺金在上安得不受害乎肺既受害不能下生腎水腎水無源則腎益加燥勢必取資于肺金而肺金又病能不已虛而益虛已燥而更燥也况各經紛然來逼火烈金刑肺間生癰必然之勢也治之法化毒之中益之養肺之法降火之內濟之補腎之方庶幾二成者可痊未成者可散也方用枝桑清肺丹桑葉五錢紫苑二錢犀角屑五分生甘草二錢款冬花一錢百合三錢杏仁七粒阿膠三錢貝母三錢金銀花一兩熟

地一兩人參三錢水煎將犀角磨末沖服數劑可奏功也此方肺腎同治全不降火蓋五臟之火因飲食而旺乃虛火而非實火也故補其水而金氣堅補其水而虛火息况補中帶散則補非呆補而火毒又容易解也

肝癰門二則

人有素多惱怒容易動氣一旦兩脇脹滿發寒發熱既而脇痛之極手按痛處不可忍人以爲肝火之盛也誰知是肝葉生瘡耳世人但知五臟中惟肺生癰不知肝亦能生癰也且靈素諸書亦未有及得母創論以驚世乎

辨證錄

卷之十三 外科 肝癰

三

余實聞異人有謂脇痛手不可按者肝葉生癰也靈素二經不談者肝經生癰世不常有古人未有此症所以畧而不言蓋古今之氣運不同而癰毒之生長不一肝一惱怒則肝葉張開肝氣即逆大怒之後肝葉空脹未易平復且怒必動火怒愈多而火愈盛火盛必燥乾肝血燥乾則肝氣大燥無血養肝更易發怒怒氣頻傷欲不鬱結而成癰烏可得乎然癰生於內何從而見然內不可見而外即可辨也凡生癰者脇在左而在右左脇之皮必現紅紫色而舌必現青色以此辨症斷斷無

差治之法必平肝爲主而佐之瀉火去毒之藥萬不可

因循時日令其潰爛而不可救也方用化肝消毒湯白芍三兩當歸三兩炒梔子五錢生甘草三錢金銀花五

兩水煎汁一碗飲之一劑而痛輕二劑而痛又輕三劑而痛如失減半再服數劑而全愈此方用當歸白芍直入肝中以滋肝血則肝血驟生易解肝血之燥又得甘草以緩其急梔子清火金銀花解毒安得不取效之捷哉蓋是火毒既盛肝血大虧用此方而不如此大劑煎飲亦自徒然倘執以肝火之旺而非是肝癰之成單用

歸芍以治脇痛斷不能取效也

辨證錄

卷之十三 外科 肝癰

古

人有左脇間疼痛非常手按之更甚人以爲脇痛而不知非脇痛也此乃肝經之癰耳夫肝經生癰多得之惱怒予前條已暢論之矣然而肝癰不止惱怒能生而憂鬱亦未嘗不生癰也惟因惱怒而得之者其痛驟因憂鬱而得之者其痛緩當初痛之時用逍遙散大劑煎飲痛立止又何至成癰也因失于速治而肝中鬱氣苦不能宣而血因之結矣血結不通遂化膿而成癰其勢似乎稍緩然肝性最急癰成而毒發其驟也世有脇痛數日

而死者正因生癰毒敗而死非脇痛而卽能死人可不急救治之乎方用宣鬱化毒湯柴胡一錢白芍一兩香附二錢薄荷一錢當歸一兩陳皮一錢枳殼一錢天花粉三錢生甘草三錢金銀花一兩水煎服一劑而痛輕二劑而痛減三劑而痛又減四劑全愈重則不出六劑愈後用四物湯大劑調治不再發也夫肝癰世不常見旣有前條不必又論及此然肝癰不可見而腸漏世人之所常病吾特發明憂鬱之能成又若此則人知急治何至成癰哉

辨證錄

卷之三 外科肝癰 五

大腸癰門

三則

人有腹中痛甚手不可按而右足屈而不伸人以爲腹中火盛而存食也誰知是大腸生癰耳大凡腹痛而足不能伸者俱是腸內生癰耳惟大腸生癰亦實有其故無不成于火火盛而不散則鬱結而成癰矣然而火之有餘實本于水之不足水衰則火旺火旺而無制乃養成其毒而不可解然則治之法又何必治火哉壯水以治火則毒氣自消方用清腸飲金銀花三兩當歸二兩地榆一兩麥冬一兩元參一兩生甘草三錢薏仁五錢黃

芩二錢水煎服一劑而痛少止二劑而足可伸再二劑而毒盡消矣此方純陰之物而又是活血解毒之品雖瀉火實滋陰也所以相濟而相成取效故神耳倘不益陰以潤腸而惟攻毒以降火則大腸先損又何勝火毒之凌燶哉母怪愈治而愈不能效也

人有大腸生癰右足不能伸腹中痛甚便出膿血肛門如刀割此腸癰已經潰爛也能食者生不能食者死雖然不能食之中亦有非因火毒之熾而然者又不可因其不能食而棄之也大凡生此各種癰瘍俱以有胃氣爲以扶胃氣爲第一法而少加之敗膿祛毒之藥則正氣無傷而火毒又散今大腸癰破而致飲食不思則胃氣已盡絕大危之症也不急補胃惟治癰必死之道也方用開胃救亡湯人參一兩金銀花二兩山藥一兩生甘草三錢薏仁一兩元參一兩白朮一兩山羊血研末一錢水煎調服一劑胃開二劑膿少三劑痛止四劑全愈

此方全去救胃而敗膿祛毒已在其中妙在金銀花雖治毒而仍滋陰之藥爲瘡家奪命之物軍乃至仁至勇

之師又得參术以補助其力卽散毒尤神山羊血止血消渴且善通氣引諸藥入癰中解散之乃鄉導之智者也合而治之則調合有人撫綏有人攻剿有人安得不奏功如神乎自然胃氣大開化精微而轉輸于大腸也倘胃氣未傷服之尤奏功如衛萬勿疑畏不用此方枉人性命耳

人有大腸生癰小腹痛甚淋漓不已精神衰少飲食無味面色瘀黃四肢無力自汗盜汗夜不能臥人以爲火盛生癰也誰知水衰不能潤腸耳夫大腸之不能傳導者

辨證錄

卷之三 外科 大腸癰

全藉腎水之灌注今因醉飽房勞過傷精力大泄其精遂至火動而水涸又加生冷並進以致氣血乖違濕動痰生腸胃痞塞運化不通氣血凝滯而成癰也然則生癰之先本是腎水不足癰潰之後又復流其水是因虛而益虛矣若作久毒治之鮮不變爲死症必須大補其腎水而並補其脾胃之氣則脾胃化精生水更易枯涸之腸一旦得滂沱之潤自然淹足不必治癰而癰已化氣血足而肌肉生也方用六味地黃湯加味治之熟地二兩山藥八錢牡丹皮六錢山茱萸八錢茯苓三錢澤

瀉一錢人參一兩黃芪五錢麥冬一兩水煎連服數劑腹痛止而精神健前症頓愈此方六味以補腎水加入參麥冬黃芪以補脾胃之土土旺而肺氣自旺肺與大腸爲表裏且又爲腎之母自然子母相需表裏相顧故奏功如神也

小腸癰門三則

人有腹痛口渴左足屈而不伸伸則痛甚手按其痛處更不忍人以爲腸中生癰也然而腸中生癰不同有大小腸之分屈右足者大腸生癰屈左足者小腸生癰也

辨證錄

卷之三 外科 小腸癰

今屈而不伸者卽在左足是癰生于小腸而非生于大腸矣惟是大腸之癰易治小腸之癰難醫以大腸可瀉而小腸難瀉也雖然得其法又何不可瀉哉蓋大腸可瀉其火從糟粕而出小腸可瀉其火從漫溺而泄也方用泄毒至神湯金銀花三兩茯苓一兩薏仁一兩生甘草三錢車前子三錢劉寄奴三錢澤瀉三錢肉桂三分水煎服一劑而水如注二劑而痛頓減三劑而症如失不必四劑也此方俱利水之藥止一味金銀花消毒之味何以建功之神如此蓋小腸之毒必須內消而內消

之藥舍金銀花實無他藥可代以他藥消毒皆能損傷正氣而小腸斷不可損傷故必須以金銀花爲君但金銀花不能入小腸之中今同茯苓薏仁澤瀉車前子之類引入小腸又加肉桂一分得其氣味引入膀胱從溲溺而化又恐火毒太盛諸藥不能迅速更加劉寄奴之速祛甘草之緩調剛柔遲速並行旣無留滯之虞而復無峻烈之害自然火毒殆盡膀胱小腸而出也

人有腹痛呼號不已其痛却在左腹按之痛不可忍不許

人按醫以爲食積在大腸也誰知是小腸之生癰耳凡辨證錄

卷之三 外科小腸癰

腸癰必屈其足而今不屈足似非腸癰之病然腸癰生於腸內者必屈其足在大腸者屈右足而不伸在小腸屈左足而不伸也若癰生于腸外者皆不屈足痛在左則小腸生癰痛在右則大腸生癰也至食積燥屎之痛時而痛時而不痛故痛在左明是小腸之外生癰也大小腸生癰于腸內尚可破潰而大小腸生癰于腸外斷不可使之破潰者以腸外無可出之路皆必死之症也而小腸更甚必須急早治之方用內化丹金銀花四兩當歸二兩車前子五錢生甘草三錢茯苓一兩薏仁一

兩水煎服一劑而痛大減二劑而痛又減三劑而痛全止四劑全愈此方卽前方之變方也但前方以利水之中而行其敗毒之法此方于利水之中補血以敗毒之法也蓋癰破利水則毒隨水出易于祛除癰未破不補血以利水則水泄而血虛難于消化同中之異不可不知也然此方亦須急早治之則有益否則癰雖愈而瘀血流于腸外必有終身腹痛之病也

人有腹痛驟甚小便流血左足不能伸人以爲小腸生癰也誰知是小腸之火太盛耳夫小腸生癰必屈左足今

辨證錄

卷之三 外科小腸癰

左足不伸明是生癰之證而予獨謂是火盛者何故不知生癰必有其徵未有一日驟生而卽流血者也癰日久而膿生膿欲盡而血出豈有不潰不爛而先出血者然左足之屈則又何也蓋小腸與大腸不同小腸細而大腸寬寬者可以容邪而細者難以容邪此必然之理小腸受火煎熬則腸中逼迫腸不能舒而左足應之故暫屈而不伸耳但不可因足之不伸卽信是癰而妄用解毒之藥然從何處辨之因其初病之時辨其小便之有血無血耳初起痛而足屈若小便無血乃是生癰初

起痛而足屈小便有血乃是火痛斷不可差也治之法
瀉其火邪不必化毒而痛止足伸矣方用小柴胡湯加
味治之柴胡一錢黃芩三錢甘草一錢茯苓五錢人參
二錢半夏一錢水煎服一劑而足伸二劑而血止腸亦
不痛矣小柴胡湯非治小腸之藥也何以用之而效驗
之捷如此因小腸之火盛者起于肝膽之鬱也木鬱則
火生不敢犯心而犯小腸耳夫火性炎上今不上炎反
致下熾拂其火性矣此小腸所以受之而作疼痛也至
于流血于小便中者又是何故蓋是小腸之血爲火所
辨證錄

卷之十三 外科小腸癰三

逼惟恐爲火之熾乾故越出于小腸之外直走膀胱反
使火道不行而流血也小柴胡湯既舒其肝膽之氣則
火氣上炎其生既順而不逆又得茯苓以清消其水氣
水流而血自歸經此方之所以奇耳

無名腫毒門二則

人有頭面無端忽生小瘡癰甚第二日卽頭重如山第三
日面目青紫世人多不識此症此乃至危至急之病苟
不速救數日之內必一身發青黑而死若青不至心胸
者尙可救療因其人素服房中熱藥熱極便爲毒也凡

人入房而久戰不泄者雖氣主之而實火主之也氣旺
而非火濟之則不足以鼓動其興趣而博久戰之歡補
氣之藥斷不能舍參芪而求異味世人貪歡者多吝惜
者亦復不少用熱藥以助火非多加人參不足以駕馭
其猛烈之威無如人參價高力難多備方士不得已遷
就世人乃少減人參則功力自薄及多加熱藥以壯其
火於是金石火焜之藥紛然雜用謂不如此不足以助
其命門之火也夫命門之火腎火也非真陰之水不養
不同于脾胃之火可以外水解之也且腎火旣旺則外
辨證錄

卷之十三 外科無名腫毒三

勢剛強必多御女一取快樂偶爾縱慾亦復何傷無柰
淫心無盡愈戰愈酣火熾則水乾火沸則水涸卽不頻
泄其精水亦不足以制火而熱毒有結于腸胃者矣况
戰久則興必深未有不盡興而大泄者精泄過多則火
更旺未免陽易舉而再戰或歸于前藥之太少更多服
以助其勢熟知藥益多而火益烈戰益頻而水益竭乎
久之水涸火炎陽雖易舉而不能久戰未免有忍精繼
綻之時勉強而鬪精不化而變爲毒結于陰之部位而
成癰結于陽之部位而成毒頭上者正陽之部位也較

生于陰之部位者更爲可畏非多用化毒之藥又安能起死爲生哉方用回生至聖丹生甘草五錢金銀花半觔玄參三兩蒲公英三兩天花粉三錢川芎一兩水煎服一劑而頭輕青紫之色淡矣再服二劑青紫之色盡消而瘡亦盡愈不必三劑也此方化毒而不耗其氣敗毒而不損其精所以建功甚奇也此毒原係水虧之極而瀉毒諸藥無不有損于陰陽惟金銀花攻補兼妙故必須此品爲君但少用則味單而力薄多用則味重而力厚又加玄參以去火甘草以瀉毒蒲公英之清熱天

辨證錄

卷之二十三 外科無名腫毒主

花粉之消毒川芎之散結自然相助而奏效也

一無名腫毒生于思慮不到之處而其勢凶惡有生死之關皆可以無名腫毒名之不必分上中下也前條止言頭上而在身之左右前後與手足四肢尙未言也不知得其治法無不可以通治失其治法則在上者不可以治中在中者不可治下在下者不可以治上中也得其治法者若何大約上中下之生無名腫毒者多起于淫慾無度之人又加之氣惱憂鬱火乘其有隙之處蘊藏結毒故一發而不可救所以無名腫毒盡是陰症而絕

無陽症也然則治之法宜用解陰毒之藥矣惟是解陰毒之藥多半消鑿真陰因虛而結毒復解毒而虧陰安有濟乎故無名腫毒往往不救乃是故也余得異人之傳仍于補陰之中以行其散鬱之法可佐之解毒之品微助行經之味是以多收其效余不敢隱秘傳之書而負萬世之人也方用玄參一觔柴胡三錢生甘草一兩三味煎湯十碗爲主倘生於頭面加川芎二兩附子二錢再煎汁取三碗分作二日服完未破者卽消已破者卽生肌而自愈不必二劑也倘生于身中前後左右加

辨證錄

卷之二十三 外科無名腫毒主

當歸二兩甘菊花一兩附子三分亦如前煎服倘生于手足四肢加白朮二兩附子五分茯苓一兩亦如前煎服無不收功此方名收黑虎湯言卽至惡之人見黑虎亦未有不寒心者是惡毒得之盡散也玄參最善退浮游之火得甘草之助能解其迅速之威得柴胡之輔能舒其抑鬱之氣且又有各引經之味引至結毒之處大爲祛除妙在用至一觔則力量更大又妙是補中去散

則解陰毒而不傷陰氣所以奏功更神人勿驚其藥料之重而不敢輕試深負鉛一片懸念救世之懷也若些