

湖南药物志

第一辑

湖南药物志

第一辑

湖南中医研究所编

湖南科学技术出版社

1962年4月

书号：0299

湖南药物志

第一辑

湖南中医药研究所编

*

湖南科学技术出版社出版（长沙市新村路）

湖南省新华印刷厂印刷 湖南省新华书店发行

开本：787×1092 印张：55 1/2·插页5·字数：682,000

1962年4月第一版

1962年4月第1次印刷

印数：1—3,500 定价：(11) 9.50元

(其中精装500本)

统一书号：14162·35

前　　言

湖南位于亚热带边缘，气候温暖。五岭、武陵、雪峰、幕阜、武功诸山遍布四周，山林茂密，中草药资源丰富。广大群众在长期与疾病作斗争中，积累了很多宝贵的经验。近百年来，由于国内反动统治的压迫与国外殖民主义的侵袭，这些宝贵的民族医药遗产未能发扬光大，药材调查研究工作也长期处于停滞状态。解放以来，在党的正确领导下，湖南各地继承和发扬了祖国医药遗产，中草药得到普遍的重视和采用，对保障人民身体健康，促进社会主义建设事业的发展，起了重大的作用。特别是在党领导的除害灭病运动中，广大群众在中草药的运用方面，更创造了很多新的经验。《湖南药物志》一书的编写，就是为了及时总结推广各地的经验；同时，也为各地介绍新品种、澄清名实混淆、鉴定辨认药物以及发展药材生产提供可靠的资料。希各地在现有整理材料的基础上，进一步研究应用。

在中共湖南省委及湖南省卫生厅党组的重视和领导下，湖南药物志编纂委员会于一九五九年三月成立，下设编纂办公室，由湖南中医药研究所主其事。湖南省药政局、湖南省药品检验所抽调专人参加。在调查编写过程中，湖南省长沙卫生学校、衡山县医药研究所曾派员协助。并在各地党委的重视与支持下，在其他有关生产、教学、研究等单位的大力协作下，广泛地发动群众进行实地调查、采集标本及搜集民间经验，在不到一年的时间内，共得标本近万件，品种千余，其中有不少是民间用之有效而为历代本草均无记载的。为了使《湖南药物志》一书能更全面地反映我省实际情况，我们又召开了全省草医座谈会及长沙市中药工作人员座谈会，反复审定标本，补充内容，现初步选出常用药物四百一十七种，编纂成《湖南药物志》第一辑。

本志仅是我省中草药调查整理的开始，今后还将陆续编写，以期把我省中草药资源情况基本调查清楚。由于我们的水平有限，错误之处在所难免，诚恳地希望广大读者予以批评指正，以便再版时修改。兹当本志第一辑出版之际，谨向为本志提供标本、资料并派专家协助鉴定标本、审查稿件的中国科学院南京植物研究所、湖南医学院、湖南师范学院、湖南林学院等单位表示谢意，并向全省各地为本志搜集标本、资料的单位致谢。

湖南中医药研究所

1961年10月

凡例

一、本志收載之藥物，均通過實地調查，采集有原植物標本，經鑑定後，查明科屬，訂出學名。并搜集《本草綱目》、《植物名實圖考》等古籍及近代中藥書籍、雜誌等有關資料分類敘述，按志書形式編纂。內容着重記載調查研究之實際情況，以供進一步實驗研究時參考。

二、本志收載藥物按中文名稱首字筆劃順序排列。

三、每種藥物一般均有下列各項記載，若某一項缺乏可靠資料，編者又無增補可能者，則缺項不列。各項編寫體例如下：

中文名稱 以全國通用名稱為主；缺者則用本省通用名稱。

各地別名 記載本省各地習慣用名，以括弧注明縣名。（其中如藍嘉、汝桂、桂新等縣現已劃分為藍山、嘉禾、汝城、桂東、桂陽、新田等縣，仍用原縣名，未予分列。）其中亦有屬該縣少數草醫、藥農之習慣用名者。

學名 根據標本鑑定，查明科別，訂出學名。

【原植物】 記載該藥原植物之有關資料。

形態 根據采集標本，參考有關文獻，按照現代科學方法加以描述，并繪圖以資識別。

生長環境 記載藥物生長時對土壤、氣候、地形地勢、陽光等之要求，為各地尋找藥物及變野生為家種等研究提供資料。

分佈 根據調查資料記錄該藥在我省的分布情況，借以幫助各地尋找藥源及引種參考之用。由於調查不够全面，此項記載尚不能反映全省藥物分布實況，有待補充。

栽培 凡本省已栽培之品種確已取得豐產經驗者，則詳細介紹其栽培方法。雖已栽培未取得成熟經驗及尚未栽培之品種，只提供方向，供各地試驗研究。

【藥材部分】 記載中藥有關下列資料（民間草藥無此項記載）。

產地 記載本省主產地、次產地及一般產地。

采收 記載本省采收季節及方法。

产地加工 記載本省產地初步加工方法。

品質 此項記載以本省各地傳授之實際經驗為主。

炮制 炮制方法一般如洗、切、烘、炒、炙、煅等，均列入本項。

儲藏 包括儲藏、保管方法的有關注意事項。

【效用】 主要記載本省民間經驗。其次如《本草綱目》、《植物名實圖考》、《本草綱目拾遺》、《救荒本草》等書的有關效用部分，亦予適當收入。《本草綱目》所載之諸家各說均以《綱目》為准，故統以《綱目》概括。至於《綱目》所未具載者，則以括弧注明出處，如《植考》、《綱目拾遺》、《救荒》等。民間經驗尤其是有效用而無詳細用法者，為了保存民間經驗及提供應用參考，均將其效用收

入此項，亦以括弧注明（民間）。

性 味 中藥以歷代本草記載多數相同及與效用相符者為准；民間草藥則以原始資料為據。

功 效 同上。

主 治 同上。

民間應用 包括本省各地民間流傳的使用經驗及群眾在除害滅病運動中創造的新經驗，均一一記載其處方。惟因原始資料不够完整和民間習慣所稱病名無法統一，雖經整理加工，仍有少數病症名稱过于廣泛、用法不全及處方中有个別藥不知其為何藥之缺點。為提出作為今后研究之線索，此項資料仍予載入本志。

【附 注】以上各項未能包括之問題均列入此項。

四、本志采用國家科學技術委員會公布的統一公制計量單位。藥用量仍沿用舊制。

長 度： 米（1米=3市尺）

厘米（1厘米=3市分）

毫米（1毫米=3市厘）

容 量： 升（1升=1市升）

毫升（1毫升=1/1000市升）

藥用重量： 斤（1斤=16兩=500克）

兩（1兩=10錢=31.2克）

錢（1錢=10分=3.12克）

公斤（1公斤=2斤=1000克）

目 录

一枝黃花	(1)	山梗菜	(61)
刀豆	(3)	卫矛	(63)
人蔴	(5)	万年青	(65)
丁香蓼	(7)	飞龙掌血	(67)
八角楓	(9)	天葵	(69)
九里光	(11)	天麻	(71)
九头獅子草	(13)	天名精	(73)
千層塔	(15)	天胡荽	(75)
千日紅	(17)	木樨	(77)
女萎	(19)	木槿	(79)
女貞	(21)	木姜子	(81)
土荆芥	(23)	木芙蓉	(83)
土匱儿	(25)	水苏	(85)
土大黃	(27)	水蘄	(87)
土馬驥	(29)	水蜈蚣	(89)
大青	(31)	水楊梅	(91)
大麻	(33)	五加	(93)
大血藤	(35)	五色梅	(95)
大車前	(37)	五叶木通	(97)
大叶三七	(39)	牛蒡	(99)
大叶井口邊草	(41)	牛皮消	(101)
三白草	(43)	牛筋草	(103)
三七草	(45)	毛茛	(105)
三色堇	(47)	毛大丁草	(107)
三叶木通	(49)	凤尾草	(109)
小蘖	(51)	凤仙花	(111)
小槐花	(53)	凤丫蕨	(113)
山蠣蟬	(55)	云实	(115)
山藥	(57)	及己	(117)
山木香	(59)	元宝草	(119)

化香树	(121)	羊乳	(195)
无花果	(123)	羊踯躅	(197)
六月雪	(125)	合欢	(199)
月季花	(127)	合萌	(201)
长叶冻绿	(129)	合掌消	(203)
文殊兰	(131)	地黄	(205)
石蕨	(133)	地茄	(207)
石松	(135)	地瓜	(209)
石吊兰	(137)	地锦	(211)
石胡荽	(139)	地榆	(213)
龙葵	(141)	地耳草	(215)
龙芽草	(143)	地构叶	(217)
白前	(145)	地瓜儿苗	(219)
白勒	(149)	地刷子	(221)
白薇	(151)	华山矾	(223)
白薇	(153)	华薺草	(225)
白芨	(155)	百日草	(227)
白牛胆	(157)	老鎗谷	(229)
白叶野桐	(159)	伏石蕨	(231)
白花除虫菊	(161)	扛板归	(233)
四方麻	(163)	向日葵	(235)
四片瓦	(165)	竹叶椒	(237)
玉簪	(167)	夹竹桃	(239)
玉竹	(169)	光叶海桐	(241)
冬葵	(171)	吉祥草	(243)
玄参	(173)	观音座莲	(245)
甘遂	(175)	安石榴	(247)
瓜子金	(177)	阴行草	(249)
仙人掌	(179)	阴地蕨	(251)
仙人球	(181)	赤小豆	(253)
东风菜	(183)	赤车使者	(255)
半边莲	(185)	过坛龙	(257)
兰香草	(187)	过路黄	(259)
节节草	(189)	杜若	(261)
西番莲果	(191)	杜仲	(263)
西氏毛茛	(193)	杜茎山	(265)

沙參	(267)	金果櫞	(347)
炒氏鹿茸草	(271)	金錢草	(351)
杏香兔儿风	(273)	金疮小草	(353)
麦斛	(275)	金色狗尾草	(355)
麦門冬	(277)	青葙	(357)
車前草	(281)	卷柏	(359)
补骨脂	(283)	芭蕉	(361)
鸡矢藤	(285)	花榈木	(363)
鸡冠花	(287)	芡	(365)
鸡眼草	(289)	泡桐	(367)
何首烏	(291)	泥胡菜	(369)
牡丹	(293)	迎春花	(371)
肖梵天花	(295)	远志	(373)
辛夷	(301)	奇蒿	(375)
芒萁	(303)	昆明雞血藤	(377)
决明	(305)	抱石蓮	(379)
芋	(307)	刺槐	(381)
芦	(309)	板栗	(383)
杉	(311)	枇杷	(385)
丽春花	(313)	委陵菜	(387)
泽泻	(315)	枸杞	(389)
泽漆	(317)	枸骨	(391)
狗牙根	(319)	柳	(393)
狗筋蔓	(321)	柚	(395)
莞花	(323)	柞木	(397)
虎刺	(325)	柘树	(399)
虎杖	(327)	榦木	(401)
虎耳草	(329)	枳椇	(403)
鬼絲子	(331)	茅根	(405)
兔儿伞	(333)	茅薺菜	(407)
金毛狗	(335)	苦参	(409)
金樱子	(337)	苦棟	(411)
金錦香	(339)	苦蘗	(413)
金絲梅	(341)	茉莉	(415)
金挖耳	(343)	胡桃	(417)
金絲桃	(345)	胡麻	(419)

胡荽	(421)	粉背蕨	(499)
胡氏排草	(423)	粉条儿菜	(501)
胡蘿蔔	(425)	狭叶山胡椒	(503)
姜	(427)	狼尾草	(505)
前胡	(429)	夏枯草	(507)
美人蕉	(433)	茵陈蒿	(509)
紅花	(435)	草石蚕	(511)
紅欃楊	(437)	商蒿	(513)
韭	(439)	茺蔚	(515)
扁豆	(441)	茴香	(517)
香椿	(443)	荏	(519)
牽牛	(445)	茶	(521)
看麦娘	(447)	蚕豆	(523)
秋海棠	(449)	徐长卿	(525)
匍伏堇	(451)	缺腰叶蓼	(527)
厚朴	(453)	鬼臼	(529)
盾蕨	(457)	射干	(531)
窃衣	(459)	盐肤木	(533)
南天竹	(461)	桃	(535)
南蛇藤	(463)	桑	(538)
冤州卷柏	(465)	积雪草	(541)
烏柏	(467)	細叶鼠鞠草	(543)
烏芋	(469)	細叶沙参	(545)
烏药	(471)	蛇莓	(547)
烏蘇毒	(473)	蛇菰	(549)
烏龙摆尾	(475)	蛇舍	(551)
馬桑	(477)	野山楂	(553)
馬尾松	(479)	野鴉椿	(555)
馬鞭草	(481)	野芝朮	(557)
臭娘子	(483)	野棉花	(559)
臭牡丹	(485)	野扇花	(561)
铁线莲	(487)	野莧	(563)
铁扫帚	(489)	紫薇	(565)
海芋	(491)	紫荆	(567)
海金沙	(493)	紫苏	(569)
浮萍	(495)	紫蕨	(571)

紫茉莉	(575)	絡石	(659)
紫牽牛	(577)	景天	(661)
紫花堇菜	(579)	費菜	(663)
鹿藿	(581)	棠梨	(665)
鹿蹄草	(583)	鉤藤	(667)
硃砂根	(585)	黃荆	(671)
接骨金粟蘭	(589)	黃獨	(676)
麻口皮子藥	(591)	黃檀	(678)
婆婆納	(593)	黃楊	(679)
淡竹叶	(595)	黃蜀葵	(681)
透骨草	(597)	黃胆草	(683)
通泉草	(599)	黃常山	(685)
連錢草	(601)	葫	(687)
梧桐	(603)	葱	(689)
梔子	(605)	蘂草	(691)
梅叶冬青	(607)	萹蓄	(693)
莎草	(609)	萱草	(695)
莧菜	(611)	落花生	(697)
商麻	(613)	槭樹	(699)
敗醬	(615)	楊梅	(701)
商陸	(621)	楓	(703)
寄生	(623)	楓楊	(705)
側柏	(629)	瑞香	(707)
假地蘭	(631)	廊茵	(709)
降龍草	(633)	雷公藤	(711)
棕櫚	(635)	腹水草	(713)
酢醬草	(637)	蜈蚣草	(715)
裂葉秋海棠	(641)	碎米薺	(717)
波穎菜	(643)	飯湯子	(719)
菸草	(645)	鼠麴草	(721)
蒸菜	(647)	蜀葵	(723)
菰	(649)	蜀黍	(725)
博落回	(651)	樓梯草	(727)
筋骨草	(653)	豨莶	(729)
棣棠花	(655)	酸模	(731)
結香	(657)	翠雲草	(733)

算盘子	(735)	橐吾	(787)
蒟蒻	(737)	鴨跖草	(789)
蒺藜	(739)	薤	(791)
蓍草	(741)	薜荔	(793)
蓖麻	(743)	薏苡	(795)
綬草	(745)	賽番紅花	(797)
福氏星蕨	(747)	檉柳	(799)
蜘蛛抱蛋	(749)	蕺菜	(801)
槐	(751)	爵床	(803)
蜡梅	(753)	薯蕷	(805)
漆姑草	(755)	鵝掌金星草	(807)
漆树	(757)	韓信草	(809)
銀錢草	(759)	櫻花	(811)
銀杏	(761)	薺菜	(813)
樟	(763)	翻白草	(815)
槲蕨	(765)	藿香	(817)
醉魚草	(767)	櫧蘭	(819)
豌豆	(769)	獮猴桃	(821)
鋪地蜈蚣	(771)	櫟樹	(823)
蔊菜	(773)	櫻桃	(825)
蕷蒿	(775)	蓼藪	(827)
蓮	(777)	續斷	(829)
蔓性千斤拔	(781)	續隨子	(833)
蕎麥	(783)	鱠腸	(835)
燕麥	(785)		

一枝黃花

各地別名 小白龍須、朝天一柱香、黃花草(長沙)、黃子草(衡山)、~~開口劍(湘湖)~~、~~火燄蘭~~(漣源)、小柴胡(衡南)、紅柴胡(新寧)、一柱香(岳陽)、黃花箭(麻陽)、見血飛、黃花馬蘭(永興)、鴉油草(藍嘉)、五爪見(辰谿)、小救駕(桃源)、三風散(耒陽)、紅花刀、青山菜(藍嘉)、大敗毒(吉首)、一枝箭(衡陽)、升麻(安化)。

學名 *Solidago virgo-aurea* L. ——菊科

【原植物】

形 态 多年生草本，高20—70厘米。莖直立，光滑，暗紅色，不分枝。莖上葉互生，卵圓形至長圓形，長1—2.5厘米，先端尖，基部楔形或下延成柄，近全緣，葉面有疏毛；根生葉橢圓形或長卵形，長3—6.5厘米，寬1—3厘米，先端尖或鈍圓，基部渾圓，葉片下延成翼，邊緣細疏齒，有長柄。深秋，莖頂或葉腋開黃色小花，頭狀花序，排列成總狀；苞片通常三層，外層苞片呈卵狀披針形。瘦果，圓筒形，光滑或有小柔毛。

【效 用】

性 味 辛苦微甘無毒(民間)。

功 效 疏風解毒，退熱行血，消腫止痛，散寒止嘔，去頭風(民間)。

主 治 洗腫毒(植考)。

民間應用

1. 小兒臍風 全草3錢，水煎服(永興)。

2. 腹痛泄瀉 一枝黃花、大紅花、算盤子、夏枯草、地枇杷、三月泡、石榴、夜关门、鳳仙花，各2錢水煎，加紅糖沖服(麻陽)。

3. 喉痛 根搗汁，加白糖開水沖服，或晒干研末，開水沖服(湘阴)。

4. 头風 根3錢，水煎服。

5. 腰痛 全草4錢，水煎服(衡山)。

6. 劳傷吐血 一枝黃花、肺經草、老鴉花、麥冬、沙參，各3錢，水煎服(新寧)。

7. 瘰積 全草3錢，水煎服(永興)。



图1 一枝黄花 *Solidago virga-aurea* L.

刀豆

各地別名 刀壩豆(長沙)。

學 名 *Canavalia gladiata*(Jacq.)DC.——豆科

【原植物】

形 态 一年生纏繞性草本，高达數米。莖纏繞性他物而向上長，淡綠色，有3—4條縱紋，被短茸毛。三出複葉，互生；小葉闊卵形，長6—14厘米，寬5—12厘米，先端漸尖或急尖，基部圓形，兩側小葉基部偏斜，全緣，葉面深綠色，背面淡綠色，主脈隆起，側脈8—9對。夏末，葉腋生花數朵，白色或淡紅紫色，總狀花序，長3—3.5厘米。莢果，帶形，稍彎，長10—30厘米。種子10—14粒。

【藥材部分】

產 地 各縣均有產。

采 收 农曆7—8月。

产地加工 摘取成熟的莢果，剝開莢壳，取出種子，分別晒干或烘干。

品 質

刀豆(莢) 以全干肥厚，外黃褐色，內白色者為佳。

種子 以全干，粒大飽滿，淡紅色，無蟲傷者為佳。

炮 制

刀豆(莢) 洗淨潤透，切成約0.3厘米厚的片絲，晒干或烘干。

種子 拣去雜質，洗淨晒干或烘干。

貯 藏 放干燥處，防蟲霉鼠食。

【效 用】

性 味 甘平無毒(綱目)。

功 效 溫中下氣，利腸胃，止呃逆，益腎補元(綱目)；滋陰補虛，祛風散寒(民間)。

主 治 久痢(民間)。

民間應用

1.鼻渊 老刀豆壳不去子，焙干研末，每次3錢，酒調服(長沙)。

2.腰痛 刀豆壳燒存性研末，每次3錢，甜酒沖服，或用开水送下(東安)；又方 刀豆壳1片、辣椒莖(根及莖之近地部份)5錢，豨莶草5錢，徐長卿5錢，天薺麥5錢，煮鵝蛋食(長沙)；又方 刀豆壳1片；絲瓜莖(根及莖之近地部份)3錢，燒存性，兌酒服(長沙)。

3.嘔吐 刀豆壳焙枯研末，每次1錢半，开水泡服(長沙)。

4.坐板疮 刀豆壳燒灰，調桐油外擦(芷江)。

5.月經病 刀豆3錢，水煎，沖白糖服(長沙)。

6.呃逆 種子研粉，每次2錢，加白糖开水沖服(永興)。

7.小儿疝氣 種子研粉，每次1錢半，开水沖服(新邵)。



■ 2 刀豆 *Canavalia gladiata* (Jacq.) DC.

人 寬

各地別名：皮撮珍珠、海蚌含珠、珍珠草（長沙）、海藏珠（衡南）、鐵寬菜、瓢里珍珠（湘陰）、田螺草（新寧）、海底藏珍珠（永興）。

學 名 *Acalypha australis L.* ——大戟科

【原植物】

形 态 一年生草本，高30—60厘米。莖直立，細長，多分枝，有縱條紋，具毛。葉互生，菱狀卵形、卵狀披針形或橢圓形，長2—6厘米，寬1—3厘米，先端尖，基部楔形，邊緣有鋸齒，基部有時全緣，兩面有毛或近於光滑；葉柄長約1—3厘米。夏季，葉腋生細小褐色花，單性，雌雄同株，雄花成穗狀花序，雌花單生；花被三角形舟狀，邊緣有鋸齒，基部心臟形，合時成蝶形。無花瓣。蒴果，三角狀半球形，含于苞內。

生長環境 生于山坡、原野、半陰濕肥沃的地方。多為群生。

【效 用】

性 味 辛苦無毒（民間）。

功 效 清熱止血，順氣（民間）。

主 治 腹脹痛，泄瀉（民間）。

民間應用

1.痢疾 人寬5錢、鳳尾草1兩、翻白草6錢、辣蓼5錢、烏梅肉2錢，水煎服，每日3次（衡山）；又方 人寬1—2兩，水煎服（衡南）。

2.刀傷出血 叶搗烂，敷伤口。