



第四集

安徽药材

安徽省卫生厅编
安徽人民出版社

安 徽 藥 材

第 四 集

安 徽 省 卫 生 厅 編

安徽人民出版社出版(合肥市金寨路)

安徽省书刊出版业营业许可证出字第2号

安 徽 印 刷 厂 印 刷

安 徽 省 新 华 书 店 发 行

开本: 787×1092毫米 1/32 印張: 3 字数70,000

1960年2月第1版

1960年2月合肥第1次印刷

印数: 1—3,000册

統一書号: 14102·54

定 价: (7)0.28元

A7
704
• 24

目 錄

全 草 類

白草	(1)
見愁	(2)
鳶草	(3)
老鸛草	(4)
卷柏	(5)
海金砂	(7)
透骨草	(9)
傅落迦	(9)
決菟榮	(11)
鴨跖草	(12)

根 類

及已	(14)
王孫	(15)
四叶王孫	(17)
石蒜	(18)
白鮮皮	(19)
地榆	(21)
延齡草	(22)

拳参.....	(23)
紫参.....	(25)
紫草.....	(26)
蚤休.....	(27)
椿根皮.....	(30)
蒟蒻.....	(31)
錦鷄兒.....	(33)
薤白.....	(34)

茎 及 茎 叶 类

大血藤.....	(36)
水苏.....	(37)
光叶水苏.....	(39)
长圆叶水苏.....	(40)
石韦.....	(41)
有柄石韦.....	(42)
侧柏叶.....	(43)
梗通.....	(44)
黄荆 (附 黄荆叶、黄荆根、荆沥).....	(45)
椿树叶.....	(47)
醉鱼草.....	(47)
薛荔.....	(49)

花 类

凤仙花.....	(51)
除虫菊.....	(52)

蚕豆花	(54)
鷄冠花	(55)
槐米	(56)

果 实 类

刀豆壳 (附 刀豆根)	(58)
凤眼草	(59)
牡荊子 (附 牡荊条、牡荊叶、牡荊根、荊蘆)	(60)
黄荊子	(61)
胡荽子 (附 胡荽根叶)	(62)
南瓜蒂 (附 南瓜肉、南瓜瓢)	(63)
蚕豆衣 (附 蚕豆肉、蚕豆荚壳、蚕豆叶)	(64)
鬼馒头	(66)
蒔蘿子	(66)
槐角 (附 槐叶、槐枝、槐树皮、槐根白皮、槐胶)	(68)
蔓荊子	(70)

种 子 类

刀豆子	(72)
大麻仁 (附 大麻花、大麻嫩果、大麻叶、大麻根)	(73)
白花菜子 (附 白花菜全草)	(74)
柏子仁	(76)
南瓜子	(76)
急性子	(77)
葶藶子	(78)
黑芝麻 (附 胡麻花、胡麻叶、胡麻根)	(79)

动 物 类

凤凰衣 (附 鸡蛋白、鸡蛋黄、鸡蛋壳)	(81)
蚯蚓	(83)
紫河車	(84)
蛇蛻	(85)
蛻螂	(86)
独角蛻螂	(87)
蟻蛭	(88)

矿 物 类

自然銅	(89)
秋石	(90)

全 草 类

三 白 草

三白草我省各地均有出产。

药用带根的全草，为利尿、催吐药；治脚气水肿、关节肿痛、胸膈热痰。煎汤洗治癬疮有效。叶捣烂敷治疗疮炎肿。

三白草属于三白草科、三白草属，为多年生草本植物。地下茎粗大，节节生须根。茎高一至二尺，有纵稜脊。叶互生，叶片长卵圆形，有尖，无锯齿，柄短，有基出叶脉五条。夏日于枝顶抽穗，开多数白色小花。穗下有白色苞片二至三个。花后结蒴果，熟时顶部开裂，内有多数圆形种子。

栽培方法：三白草野生于水边湿池，适宜在浅水冲积壤土或砂质壤土栽培。用种子及分根繁殖。(1)播种：在秋后采收成熟的种子，随时下种，翻松土层，撒播种子，即自行生长。(2)分根：在谷雨至芒种间、掘起地下根茎，剪断分栽，每段节间要带有一两个幼芽。



三 白 草

1. 植物全形 2. 雄花

(据中国药用植物志 4 图)


用手扒开烂泥，将根茎横埋泥中，芽尖向上，常不断水，即易成活生长。

采制及貯藏：夏季連根挖取，洗淨，泡热水中数分鐘，取出晒干即成。用繩扎捆，注意放干燥通风处保存，以免受潮生霉。

收購規格：全草帶根，身干，无泥沙雜質。

其他用途：三白草为养猪的良好飼料。

血 見 愁



血 見 愁

1. 植物全形 2. 花枝 3. 叶 4. 花序
5. 剖开的花序，示雄花和雌花 6. 雌花
7. 雄花 8. 种子

（据江苏南部种子植物手册 703 圖）

血見愁又名地錦草，是一种常見的小野草。我省各地均有出产。药用带根的全草，为止血、消肿、利尿药；用治血痢、小便带血、血崩、肿痛恶疮，并有通乳汁的作用。外用治疥癬、头疮、刀伤出血不止等症。

地錦草属于大戟科、大戟属，为一年生匍匐小草本植物。茎細，分枝很多，表皮紫紅色，有时有柔毛。叶对生，叶片长圓形，微帶紅色，叶边有細齿，两面略有細毛。夏末秋初于枝頂，节間开紅紫色的小花。总苞倒圓錐形，有四个裂片，內有多数无瓣的雄花，中央有一个雌花。花后結三稜球形蒴果。

栽培方法：地錦草是田野、

路旁、篱边、墙角常見的小野草，不择土壤，到处可以种，阴湿处生长較好。秋末采收成熟的种子，次年清明下种。将种子与細土拌勻，趁雨后地湿撒播，即自行生长。

采制及貯藏：春末采收，連根拔出，除淨杂草泥沙，晒干即成。用簍或蒲包装，放干燥通风处保存，以免受潮生霉。

收購規格：全草帶根，叶多，身干，无泥沙雜質。

收購量：我省每年收購量約 1,000 斤。


附註：“血見愁”同名异物的很多。我省有“茜草”（茜草科茜草属）、“鉄莧菜”（大戟科、鉄莧菜属）和“地錦草”三种，均称“血見愁”。这三种草虽然都有止血的作用，但疗效不完全相同。根据“本草綱目”記載，“血見愁”的正品是“地錦草”。可參閱“茜草”及“鉄莧菜”（11頁）。

老 鸛 草

老鸛草，我省各地均有出产，蕪湖、安庆专区产量較多。药用帶根的全草，为去风、活血药；能健筋骨、通絡脉，用治损伤、麻痺不仁等症。

老鸛草属于牻牛儿苗科、老鸛草属，为多年生草本植物。茎高一尺左右，有膨大的关节，分枝多，全身密生柔毛。叶三裂，裂片卵形、有尖，叶边有粗鋸齿，中間裂片較大，两边裂片較小而不对称。夏季于枝頂、节間开白花，花萼、花瓣各五片。花后結細长蒴果，成熟时自下而上裂开，内有黑褐色种子五粒。

栽培方法：老鸛草生长于山野、路旁，可以用种子或扦插繁殖，不择土壤。夏秋季采收成熟的种子，次年春分下种。鋤松地面，撒播种子，即



老 鸛 草

1. 果枝 2. 花 3. 雄蕊 4. 花和柱头
5. 雄蕊和雌蕊 6. 开裂的蒴果 7. 种子
(据江苏南部种子植物手册 679 圖)

自行生长。老鸛草也可以在立夏前后剪取枝条，插入阴湿泥中，即生根成活。

采制及貯藏：秋初割取全草，晒干，拣净杂草即成。用蒲包装，放干燥通风处保存，以免受潮生霉。

收購規格：枝全叶多，身干，无杂质。


收購量：我省每年收購量約 7,000 余斤。

附 註：我省各地除收購本品以外，也收購同科同属植物“野老鸛草”，参阅“野老鸛草”。

野 老 鸛 草

野老鸛草我省各地均有出产，燕湖、安庆专区产量較多。药用不带根的全草，为去风、活血药，能健筋骨、通絡脉，用治损伤、麻痺不仁等症。

野老鸛草属于牻牛儿苗科、老鸛草属，为一年生草本植物，高一尺左右，密生柔毛。叶片半圆形，有五个深裂，各裂片又分为三至五裂。初夏于枝頂、叶腋出花枝，每枝开淡紅色花两朵。萼片与花瓣各五片，



野老鸛草

1. 植物全形 2. 花 3. 花瓣 4. 雄蕊
5. 雌蕊 6. 苞片 7. 裂开的蒴果 8. 种子
(据江苏南部种子植物手册 680 圖)


萼片尖部有短芒。
花后結細长的蒴果，成熟时由下向上裂开，內有种子五粒。

栽培方法、采制、貯藏、收購規格、产量可參閱“老鸛草”(4頁)。

附註：我省收購的老鸛草有本品及“老鸛草”两种，这两种药疗效相同，可參閱“老鸛草”。

卷 柏

卷柏又名“九死还魂草”，我省六安、蕪湖、蚌埠专区均有出产。药用茎叶，为收斂、止血药，治腸出血、脱肛、尿血等症，也能通經、下血，外用可治刀伤。民間单方用来治小儿惊风、脑膜炎等。



卷 柏

1. 植物全形 2. 叶的一部分(腹面)


(据南京民间药草 1 图)

片較大,腹面叶片較小,因而腹面好象有小叶四排。小枝頂部生四稜形的孢子囊穗,孢子囊叶三角形,孢子囊腎形。

栽培方法: 卷 柏 野 生 于 高 山 岩 石 裂 縫 处, 喜 湿 潤, 也 能 耐 受 旱 瘠, 用 孢 子 繁 殖。采 收 成 熟 孢 子, 用 細 土 拌 勻, 撒 播 在 石 头 縫 里, 就 能 自 行 生 长。

采制及貯藏: 一年四季都可采收,但以夏秋季为主。連根拔出,抖淨泥土,剪掉大部分須根,只留一些根头以保持茎叶不散,晒干即成。用簍装,放干燥通风处保存,并注意防止虫蛀。

收購規格: 棵大,整齐不碎,青綠色,不带大根,身干,无泥沙杂质。



卷 柏

(据江苏省植物药材志 301 图)


收購量：我省每年收購量約 20,000 斤。

海 金 砂

海金砂，我省安庆、蕪湖专区及滁县均有出产。不带根的全草及叶上的孢子均供药用。孢子为利尿、清凉性鎮靜药，用治水肿、急性淋病、尿道炎、小便不通、膀胱結石、急性热病，煩热惊狂等症。民間用全草煮水，可以通大便。

海金砂属于海金砂科、海金砂属，为多年生纏繞草本植物。根茎細长，有毛。地上茎細长，綠褐色，有白色細毛，常纏繞树上生长。叶对生，有叶柄，叶片一再分裂、小叶片卵形，也有不規則的分裂。孢子囊卵形，生在叶片背面和小叶的尖部。秋后裂开，散出許多棕褐色的細小孢子。

栽培方法：海金砂野生在山野灌木丛下，适宜在腐殖質多的砂質壤土栽种，用孢子繁殖。秋季采收成熟的孢子叶，晒干，揉下孢子，次年夏季播种。用灰土将孢子拌勻，撒播在山林阴湿的



海 金 砂

1. 地下茎 2. 地上茎有孢子囊叶
3. 地上茎无孢子囊叶 4. 孢子囊叶
5. 孢子囊叶的一部分 6. 孢子囊
7. 地下茎的节毛

(据中国药用植物志 2 圖)

地方。出苗后，拔除周围的杂草，常培土壅根，不用鋤土，以免损伤根須。

采制及貯藏：立秋前后于晴天清晨、露水未干时割取茎叶，攤在厚帑或布上晒干。抖下或拍下孢子，用細籬过篩，除去杂草、碎叶即成。用罎或鉄桶装，放干燥处保存，以免受潮生霉。

收購規格：質輕，黄棕色，身干，无杂质，能漂浮水面，燃烧时有火焰及爆炸声。过去曾发现有掺入黄土、細黄沙伪充海金砂的。泥沙可沉水，也不能燃烧，所以很容易鑑別。

收購量：我省每年收購量約 3,000 斤。

其他用途：海金砂茎叶晒干磨成粉或搗烂泡水制成土农药，可以防治棉蚜、紅蜘蛛。

透 骨 草

透骨草就是帶根的凤仙花全草。我省各地均有出产。透骨草能散血通經、軟坚透骨，用治跌打損伤、鷄魚骨哽喉等。

凤仙花属于凤仙花科，凤仙花属。其植物形态及栽培方法參閱“凤仙花”(51頁)。

采制及貯藏：夏秋两季种子成熟时采收，連根拔起，抖淨泥土，晒干即成。用繩扎成捆，放干燥通风处保存，以免受潮生霉。

收購規格：全草帶根，身干，无泥沙雜質。

收購量：我省每年收購量約 40,000 斤。

其他用途：全草搗爛泡水，或加一点肥皂，使汁液乳化，可以防治蚜虫、螟虫等軟体农业害虫。



透 骨 草

(据江苏省药材志 63 圖)

博 落 迴

博落迴，我省安庆、蕪湖专区均有出产。药用不带根的全草，为驅虫药，有大毒，不可內服，只供外用，治疮瘻、癰肉、白癜風、惡疮等。


博落迴属于罂粟科、博落迴属，为多年生的高大草本植物。茎高六至七尺，圓柱形。叶互生，叶片圓心脏形并有掌状浅裂，叶边有粗鋸齿。

叶片表面綠色，背面帶白色并有短毛。夏季于枝頂抽穗，开多数白色或微帶紅色的花。花后結扁橢圓形的蒴果。

栽培方法：博落迴野生在山脚、山坡、沟边路旁，用根及种子繁殖。在清明前后挖掘老根，分株移栽，随即浇水定根。二十至三十天后即生新苗。也可以在立秋以后采收成熟的种子，在谷雨以前下种。打穴深七、八寸，寬一尺左右，每穴下种三、四粒，复土一指厚。苗长至三、四寸高时間苗，每穴只留壮苗一株，株距两尺左右；同时要进行中耕、松土、培土。

采制及貯藏：秋季生长旺盛时，割取全株，抖淨泥土，拣除杂草，晒干即成。用簍蓆捆包，放干燥通风处，以免受潮生霉。

收購規格：枝全叶多，身干，无霉烂，无杂质。



博 落 迴

1. 花枝 2. 花蕾 3. 花
4. 雄蕊 5. 雌蕊 6. 果枝
7. 种子

(据中国药用植物志 264 圖)

产 量：我省产量很多，目前尚未收購。

除 四 害：全草放粪坑中能杀蛆。鮮叶二十倍水浸液能杀了了。

其它用途：全草煮水制成土农药，可以防治茶毛虫、苧蓆虫、豆蚜，以及小麦秆锈病等。

鐵 莧 菜


鐵莧菜，別名“榎草”、“血見愁”，是常見的野草，我省各地均有出產。藥用帶根的全草，為止血藥，可以治刀傷出血。

鐵莧菜屬於大戟科、鐵莧菜屬，為一年生草本植物。莖細長，通常直立，高一兩尺，分枝很多，表面有柔毛和縱條紋。葉互生，葉片卵形、有尖，葉邊有鈍齒，葉兩面均生有短毛。夏季于節間抽短穗，開多數綠色小花。花單性，雌雄同株。雄花有花瓣狀的花萼四片，雌花生在腎臟形的苞片內。花後結三角形扁圓的蒴果，成熟時裂開。

栽培方法：鐵莧菜野生于田野、路旁，不擇土壤，用種子繁殖。秋後采收成熟的種子，次年清明下種。可以利用山崗、堤壩、荒地打穴點種。打穴深寬各五寸左右，每穴下種三、四粒，復土半寸厚，即自行生長。

采制及貯藏：春末夏初開花

以前采收，連根挖出，去淨雜草、泥沙，曬干即成。用繩扎成捆，再用蒲包



鐵 莧 菜

1. 雌花枝 2. 雌花序 3. 雄花
4. 雌花 5. 果實

(據江蘇南部種子植物手冊 712 圖)