



河南药材

25

內容提要

本書介紹了河南省药材的生產分布情況，還介紹了山藥、生地、牛夕、菊花等二十多種主要药材的產地、產量、性能和功用；并有重點地介紹了幾種药材的培養和繁殖的技術經驗。

河 南 藥 材

河南省農業廳編

*

河南人民出版社出版(鄭州市行政區經五路)

河南省書刊出版業營業許可證出字第1號
公私合營開封印刷廠印刷 新華書店河南分店發行

*

豫總書號：959

787×1092毫米^{1/32·7/8}印張·14,900字

1958年4月第1版 1958年4月第1次印刷

印數1—20,088冊

統一書號：T16105·75

——
定價：(6)0.10元

目 錄

一、河南省藥材生產概況.....	(2)
二、河南省主要藥材概述.....	(4)
(1)山藥 (2)生地 (3)牛夕 (4)菊花 (5)紅花 (6) 茯苓 (7) (亦名鴉子) (8)金銀花 (9)白芷 (10)冬花 (11)山芋肉 (12)半夏 (13)桔梗 (14)党 參 (15) (16) (即瓜蔞根) (17)瓜蔞 (別名天瓜) (18)牛黃 (19)麝香 (20)黃芩 (21)蒼朮 (22)柴胡 (23)蜈蚣 (24)防風 (25)連召 (26)石斛	
三、主要藥材種植經驗	
溫縣東林召農業社山藥丰產經驗.....	(11)
溫縣前東南王農業社生地增產經驗.....	(14)
武陟北陽農業社牛夕大面積丰產經驗.....	(17)
商城茯苓培植經驗.....	(20)
延津城關一社紅花增產經驗.....	(24)
南陽飼養全虫經驗.....	(25)

一、河南省药材生产概况

河南省为全国药材主要产区之一，分布地区很广，品种甚多，而且质量亦好，不仅畅销国内，在国际市场上也很受欢迎，曾有“南货”之称。其中尤以新乡专区的武陟、温县、孟县、博爱、沁县所产的生地、山药、牛夕、菊花最为有名，被称为“四大怀药”（因该地旧属“怀庆府”）。其次如许昌专区的长葛、禹县所产的白芷被称为“禹白芷”，南阳专区的南阳、镇平、唐河所产的金虫（蝎子）被称为“南金虫”，开封专区的密县、登封、荥阳所产的金银花被称为“密银花”，也都是很有名的。

目前国家统一收购的药材共有38种，其中河南省大宗出产的就占11种。包括有生地、山药、牛夕、菊花、红花、金虫、芋肉、白芷、茯苓、银花、桑叶等。~~1956年~~按照国家分配计划开始了生产。

河南所产~~38种药材~~据1957年的统计，

总產量即达8,867万斤，价值3,862万元；其中並有不少的珍貴药品，如金釵、牛黃、冬虫草、琥珀等。

另據統計，1957年出口的即有70余种，总量达248.7万斤，价值139.4万元，為國家換來了大量外匯。

河南药材，在太行山脈出產的有黨參、東查、花粉等200余种；在伏牛山脈出產的有全虫、芋肉、冬花、辛夷、朱苓、杜仲、葛卜、防風、蒼朮、桔梗、柴胡、元寸、牛黃、金釵等280余种；在大別山脈出產的有茯苓、木瓜、班毛、紅娘等180余种；在豫东平原地帶出產有白芍、白芷、白扁豆、卜黃、虫蛻、銀花、棗仁、二丑、荆芥、薄荷等100余种。

河南所產药材，可分为以下三类：

(1)植物類：共318种。目前人工栽培的有生地、山藥、牛夕、菊花、紅花、黨參、白芷、白芍、白豆、荆芥、二丑等46种；野生的有柴胡、連召、蒼朮、桔梗、半夏、香附、防風等273种，其中可以栽培的有銀花、山芋肉、棗仁、茯苓、杜仲等21种。

(2)動物類：計有牛黃、麝香、班毛、

紅娘、全虫、土龜、鷄內金、牛蛇等31种。

(3) 矿物類：計有琥珀、黃丹、龍骨、雄黃、化石等18种。

由此可見，河南药材在人民醫療方面和國家建設当中所处的重要地位。因此需大大提高药材產量，滿足人民需要。

二、河南省主要药材概述

(1) 山藥：主要產于武陟、溫縣等地，因同屬懷慶府，故称怀山藥。年產量300余万斤。含淀粉質多，入药能益腎濟虛，健脾胃，潤利化痰。暢銷中外。為河南的名貴特產。

(2) 生地：即地黃，主產于武陟、溫縣、孟縣、博愛、沁陽。年產有1,000余万斤，歷年大量出口，暢銷中外。性溫，入药能解血熱，消毒，利尿，通經。為河南名貴特產。

(3) 牛夕：主產于武陟、溫縣、博愛。宜在沙土地生長，年產量100余万斤。味甘酸，能舒筋活血。銷路很廣，是河南怀藥名產之一。

(4) 菊花：主產于武陟、博愛、修武等縣。藥用其花，分黃、白兩種，性平無毒，能清風明目，一般代之以茶，故作飲料者多。年產量42余萬斤，暢銷中外，為河南主要名產之一。

(5) 紅花：產于延津、原陽、西華、扶溝等縣，年產量35万余斤。性溫味辛，去淤生新，為解熱生血要藥。暢銷中外。

(6) 袋苔：系菌生植物，為人工培養，主產于大別山、商城等縣。年產量145萬斤。功能祛瘀，安胎保肺，健脾利水，又可提煉苓餅、苓霜。

(7) 全虫(亦名蝎子)：為蜘蛛類的毒蟲，用為治瘡及驚風之藥，功能驅風逐邪。主要產于南陽、西陝、內鄉、確山、輝縣等地，普產全省。年產約15萬斤，暢銷中外。規格：分清水貨，即全身不缺者品質佳，全蝎八只爪。每年立夏交伏節後，為捕捉季節。

(8) 金銀花：花分黃白二色，故名“金銀花”。性涼清香，能清血消毒殺菌，並有清暑退熱功效。主產于密縣、登封等地，年產量40萬斤。暢銷中外，為河南有名的特產藥材。

(9) 白芷：主產于長葛、禹縣，年產量40余萬斤。味辛性溫，功能利竅，鎮痛，溫散血癖。行銷國內各地，曾有“禹白芷”之称。

(10) 冬花：因在冬后成熟，故稱冬花。為潤肺，化痰，止嗽要藥。以嵩縣、內鄉、盧氏、南召等縣為主產地，年產量25萬斤，行銷廣州、漢口、上海等地。

(11) 山芋肉：野生无主，農民于山芋肉果實成熟時，用棍棒打落或用手采集，拾回家中，晒干去核即成。山芋肉酸澀微溫，能發汗，暖腰膝，固精，秘氣補腎溫汗。主產于內鄉馬山口等地，年產量28萬斤。因銷路很廣，年年脫銷，因此應組織有計劃的生產。

(12) 半夏：採取時節在5月份，過期即會變質失去效用。半夏性燥，能去濕清痰，利肺開胃，消腫止汗。主要產于息縣、潢川、新蔡、鄧縣等地，年產80余萬斤，暢銷中外。

(13) 結梗：味微苦，宜通血，瀉火，散寒，凡痰壅喘促、鼻塞目赤、喉痺咽痛、齒痛口瘡、腹痛、腸鳴等症皆治。河南的伏牛、桐柏、太行山皆產，主產于信陽、桐柏、南召、內鄉、

嵩縣、盧氏、輝縣、林縣等地，地面極廣，年產約230萬斤。馳名全國，為河南主要藥材。

(14) 黨參：主產于林縣、輝縣等地靠山一帶，分野生和種植兩種，以野生的質高。黨參性平，味甘，無毒，用以製藥劑，功能補虛助氣，為滋養之良藥。年產量15萬斤，暢銷各地。

(15) 天花粉（即瓜萎根）：主產于安陽、林縣、輝縣等地，年產量約160萬斤。味辛性寒，功能祛淤清熱，化痰解渴，並可製造化粧品的原料。

(16) 瓜萎（別名天瓜）：俗稱全瓜萎，河南各地均產，年產量20余萬斤。分野生和家種兩種，其性寒無毒，味苦，功能祛淤、鎮靜、解熱、利喉。銷路極廣。

(17) 細母：為多年生草本植物。能解熱潤肺，止渴利尿。主產于林縣、輝縣等地，年產量50萬斤。每年白露後收穫，銷于全國各地。

(18) 牛黃：為耕牛（黃牛）腹內之牛膽裏面自然積聚的一種病菌，極不易得。由於我國科學發達，在天津、北京發明人工配制的牛黃，其療效與耕牛黃同。牛黃味苦性清涼，功能清熱、鎮靜，為小兒抽風（即腦膜炎、肺炎之

类)之特效药。四季皆产，行銷全國，为國药中主要而价值昂贵的药味之一。河南虽產不多，但也是一项特產珍品。

(19)麝香：为麝体内分泌液，其香味能射散甚远，故名麝香。主產我國康藏高源，其次东北、蒙古、陝西、云南等地均產，河南非主產地，僅南陽、洛陽兩專区出產。麝香性溫毒，能通竅避穢，搜風逐邪，可制香剂，若以酒精冲淡麝香，则發揮特种香味，長久不散。如制造名貴化粧用品，有保香氣之能力。

(20)黃芩：为根生植物，生山中，三月發芽，秋后即枯；莖高尺許，每棵生粗細之芽3—4枝，其根如指粗，長約6寸，内外均是金黃色，故名黃芩。其性涼味苦，是國药中良好瀉熱剂之一。主產于嵩縣、洛寧、西峽、淅川、輝縣、濟源等地，年產量約140万斤，是河南產量較大的药材。

(21)蒼朮：为根生植物，莖高2尺，細如香条，每棵生莖2—3枝，三月發芽，霜后即枯，其根曲形疙瘩狀，类似生薑，外皮黑黃色，內層黃白，周圍生鬚根，横切有硃砂点者为优。蒼朮有香味，为避瘟、燥湿之國產佳

藥。江南生瘴地帶羣眾多購此燃烟，以避瘴氣；產地羣眾也有磨細制神奇者，每逢端陽佳節，羣眾又多用以小布袋裝佩身边作避瘟用。產于河南大別、桐柏、伏牛、太行等山地，信陽、內鄉、嵩縣、光山、林縣、輝縣等地，均有大量出產，當地農民視為主要副業生產。全省年產約300萬斤，為河南主要大宗藥材產品之一。因無銷路，不能全面開展生產。

(22)柴胡：系多年根生草本植物，莖約2—3尺高，葉狀如柳葉，開黃色小花，其根入藥名柴胡。三年以後始可長成，野生無主，勞動者可隨時挖掘。其性苦微寒，為退熱、升陽、解鬱、調經之良劑。河南省伏牛、桐柏、太行山各縣均產，年產量在150萬斤以上，居全國首位，暢銷中外，為河南主要大宗藥材產品之一。

(23)蜈蚣：屬於多足爬行蟲類。性溫有毒，能殺虫。主產信陽等地，年產約100余萬條。陰曆清明谷雨前(4—5月間)為捕捉季節，這時蜈蚣腹裡無卵，每逢悶熱天氣可捉。信陽等地孩童多攜罐子等器具，用竹籤捕捉之。

(24)防風：系野生植物之根，多生在山區及荒地上。性甘微溫，為清腎去熱、去風之

藥。主產于洛寧、宜陽、盧氏等縣，年產量30余萬斤，冬季為旺季，以冬季挖掘為佳。除內銷本省外，並外銷上海、漢口、湖南、江西等地。為河南大宗藥材產品之一。

(25)連召：系野生植物，多長于山溝、路邊空荒地上，其形狀如小石榴樹，實則似蓬房有瓣。連召味苦微寒，而性升浮，能殺蟲止痛，消腫排濃，但癰疽潰後勿服。主產於嵩縣、洛寧、內鄉、洛陽、盧氏等地，年產量有700余萬斤，銷國內各地，可供出口。

(26)石斛：俗稱吊蘭草，年產4万余斤，為多年生草本植物，自生于高山、深澗之岩石或寄生于古樹上。莖青紫而心實，高3—4寸至5—7寸，每隔寸許有節，每節生葉，葉為披針形；初夏之季每梢端開二朵花，有淡紅或白色，花後結實，似蘭英但較小，因其形如金釵之狀，故古有“金釵石斛”之稱，亦名麥斛、石斛草、長生草、千年潤。以干濕分為干石斛、鮮石斛兩種。石斛用供中醫作清熱，代溫益肺，及滋陰劑。其生產季節為陰曆4—5月，秋冬亦可採取。采後經烤制即成干石斛。

三、主要药材种植經驗

溫縣東林召農業社山藥丰產經驗

溫縣東林召農業社土地絕大部分是白沙土和兩合土，最宜山藥作物的生長。該社1957年种植的124畝山藥，平均單產鮮山藥1,285斤，合成貨(加工好的干貨)257斤(另外每畝還收山藥蛋1,500余斤)，畝產比1956年增產162%，其中有2畝平均單產成貨488斤，比1956年平均單產增產三倍多。其主要丰產关键是：

(1)選好裁保好種：山藥收穫後，該社就隨即進行了选裁挑種工作。具体选法是：三要，三不要，即要圓頭，不要尖頭；要肥大長像棒槌，不要弯曲形和一窩蜂；要不受病蟲害的，不要有病斑和虫咬的。这样选好后，再將选好的种山藥由上部約4—5寸長處，折斷作裁(群众叫作籠頭)。然后注意單獨保存，以备來年春天下种。由于山藥怕冻，出水發虛，不易出苗，和受熱裁頭發霉等現象，因此他們在保种工作方面特別注意。具体作法是：

首先將剛折下來的種栽放入室內，防止受凍，待好天中午氣候溫暖時，在太陽下曝曬六次左右（約6天），減去其本身部分水分，使其斷面處傷口很快癒合。以後選一陰涼處挖個1.2尺深、1.5尺寬的土坑，把種栽平鋪橫擺坑內，並注意不要種栽四邊靠坑牆，上蓋一層稻草，天冷時再加蓋3寸厚土，到上大凍時，再加蓋2寸厚土。如下大雪，要隨時注意扫除坑上的雪，以保溫防凍；到立春後溫度增高，就隨把種栽從坑內挖出來，讓太陽曝曬。為防止變天受凍，天晚必須收進室內。

(2)深耕整地，施足底肥：該社的生產山藥地前茬為紅薯，土質系兩合土。在收紅薯後緊接着就深翻了一次，約1—2尺深，翻後未耙，讓土壤充分風化，到來年春天解凍後每畝施牲口糞4,000斤，施後隨耕一遍，深約9寸，耕後隨耙，耙後再淺鋤一次，接着可多耙几遍，使土壤平整疏松塌實。最後在田地四邊進行打埂，等待下種。

(3)適時下種：山藥的下種時間是清明至谷雨季節，但還必須看氣候，看地溫，如清明谷雨季節已到，天氣還很冷，即可稍晚些。地

溫必須平均在攝氏13度時才可下種，否則會凍死栽子，過晚也会影响產量。註新的山藥是清明後10天下種。在下種前將種栽排隊，把大栽、小栽、沒芽栽，分別種在一起，這樣便於管理，產量還高。下種密度為1.2尺見方，行距必須預先作好計劃。開個2寸深的小溝，按距離順着平放種栽，並注意栽頭向上，栽後將溝平好；每四行打成一畦，畦埂要固，約高4寸，以免跑水。下種後緊接着澆上一水，待6天後見苗還未出土，再采用五指抓輕輕的摟破地皮，以免土面板結，影響出苗，這樣還可起到防旱保墒作用。

(4) 掌握灌溉，注意施肥：山藥在生長階段是最怕旱怕澇的，若不適時適量的澆水，會影響增產和質量的好壞。所以在澆水方面，該社掌握了四個原則：①不旱不澆；②旱了必澆；③看天可能下雨不澆；④雨後必澆（雨後不隨即澆水，會被雨水燒壞）。在天旱澆水時，必須是在下午，以免炎熱天氣水熱把山藥煮死。因此，羣眾總結澆山藥的經驗是：看天，看地，看時候。所以該社就根據這些經驗掌握適時澆水五次，水量都在不超過山藥根扎深度，由淺

到深，最后待山药胚胎長成时，約在秋后澆一次大水，超过根扎深度，这样会使山药根不再繼續下扎，而向粗發展。在澆第一次水前，每畝施人糞尿40担約3,600斤，施后澆水。

(5)作好田間管理，防治虫害：山药虽不中耕，但拔草要緊，1957年东林召社种的山药共計拔草四次，保証了地无雜草。在除治虫害方面，山药最怕螭螬攻，因此在施底肥时，每畝預先施入3斤黑礬，除治了螭螬沒有發生，保証了全苗和順利成長。

溫縣前東南王農業社生地增產經驗

溫縣位于河南省的西北部，緊靠黃河北岸，全縣絕大部分地区多系白沙土和兩合土，最适宜生地的生長。溫縣是歷史悠久的怀药主產区之一，主產地道的生地、山药、牛夕等。当地群众不但喜愛种植怀药，而且有种植怀药的丰富經驗。1957年，溫縣前东南王農業社种植生地25畝，平均單產(成貨)388斤，其中1.4畝增產(成貨)达980斤，超过全社單產一倍多，比1956年單產增產四倍左右。

其主要增產关键是：

(1) 選用良種，培育好栽：該社歷年來經過精細的挑選種籽，1957年的25畝生地全部選用了產量高、品質好的金狀元品種，在1956年7月下旬作好了種栽的培育。在選種方面，採用根少、葉子稀、圪節細、芽眼多，去掉串根和抓地龍，留下主根作良種，擗成8分——1寸長，育種到畦內，天熱時再刨出來進行窖內貯藏。這樣防止了生芽發虛、不易生長的現象。同時為防止爛栽缺苗，並分了一次練頭，這便保證了全苗。

(2) 選擇地塊，注意輪作：該社根據生地生活力弱，不宜在重茬和芝麻茬地生長的特點，採用了7——8年的輪作制度，選擇了兩合土和地下水位都在10尺以下的土地上進行了種植。

(3) 深耕細耙，施足底肥：一般冬耕一次深約一尺，耕後不起，使土壤風化。該社立春後每畝施灰土糞四大車作基肥，其中的1.4畝率產地施入了8大車，施後又普翻一遍，深約8——9寸，然後進行多耙几遍，平整土地。

(4) 遵時早種，注意淺栽：生地分早晚兩種，早生地在清明至谷雨斷霜時節下種，晚生