

要藥分劑

清沈金鰲輯著

上海衛生出版社

自序

按徐之才曰。藥有宣、通、補、瀉、輕、重、滑、澀、燥、濕十種。是藥之大體。而本經不言。後人未述。凡用藥者。審而詳之。則靡所遺失。誠哉是言也。內經發揮宣通等義亦甚詳。而十劑之說。誠足盡藥之用。以爲依據矣。隱居陶氏續入寒熱二條。仲淳繆氏以寒有時不可治熱。熱有時不可治寒。皆爲背謬。因去寒熱而增升降二劑。夫繆之訾陶。其說良是。但卽升降二義釋之。十劑中如宣輕則兼有升義。瀉滑則兼有降義。且諸藥性。非升卽降。或可升可降。或升多降少。或升少降多。別無不升不降專爲宣通等性者。則升降二字可以概羣藥。不得另立二門次於十劑後。宜之才以十劑爲藥之大體。靡所遺失也。自神農著本經。歷代藥性書。悉以草木金石等依類相次。讀者幾忘十字之義。並忘藥有此十種之性。宜其製方用藥。相反相戾。錯雜以出之也。余輯是書。爰據十劑以分門類。非敢好異。欲閱者儼然於藥之各有其性。因各有其用。庶臨症時可無背云爾。沈金鰲自書。

凡例

一、要藥者。尋常日用必需之藥。所以別乎險僻之味也。古人云。良藥治病。十全八九。毒藥治病。治不一二。可見用藥之當慎矣。茲編所錄。止四百餘品。稍涉險僻者。概屏去之。

一、是編照十劑分類。欲人曉然於藥之各有其性。而宣、通、補、瀉、輕、重、滑、澀、燥、濕。一覽易知。不至引用錯悞也。

一、每藥首明主治。見藥之功用不一也。次詳歸經。見藥與經各有所入。不相襲也。次列前人議論。見藥之味性運用有至當也。次標禁忌。見藥之於症宜詳審也。次及炮製。見藥之味性有偏。其相救相制。不可略也。

一、前人云。用藥依本經所治。總無大錯。故是編所錄之藥。凡有本經者。無不首列。至名醫別錄。所以補本經未備者。亦無不錄。其歷代諸賢。發明諸藥功用。又足備別錄之缺。悉皆採入。

一、上自本經。下至綱目備要等。所言治法。或不與是藥相合。即刪削之。或又彼此所言相同。則存前而刪後。

一、引前人議論。必於是藥功用。及與是藥所治病。發揮精切。其旨畫一者。方始錄之。非徒徵引繁博爲也。一、主治及前論俱直書前人之語。不敢改竄。以其語皆至當莫易也。隨各注其名或字。不敢沒人善也。或

有前人識所未及。而鄙見偶及者。則用鰲按字附其說於後。

一、歸某經下。必着爲如何之品句。此數字。或括是藥全性。或專及是藥最重之用。其故不一。當意會之。

一、仲淳經疏。爲自來本草第一精細之書。其著簡誤。尤爲審量極至。故是編禁忌一宗之。

一、編中有不列炮製者。或以是藥無甚製法。或製法衆共皆知。便不復贅。

目錄

卷一 宜劑上 共四十一種

桔梗	一
天麻	二
秦艽	三
柴胡	三
前胡	五
防風	六
獨活	七
羌活	七
延胡索	八
貝母	九
細辛	九
白茅根	一〇
川芎	一一
蛇床子	一二

藁本	三
白芷	三
木香	四
高良姜	四
白豆蔻	五
縮砂仁	五
鬱金	六
香附	六
藿香	七
蘭草	八
荊芥	八
薄荷	九
紫蘇 附蘇梗 蘇子	一〇
菊花	一一
豨薟草	一二
款冬花	一三
常山 附蜀漆	一三

卷二 宜劑下 共五十五種

百部	二四
威靈仙	二四
茜草	二五
剪草	二六
鉤藤	二六
絡石	二七
馬勃	二七
辛夷	二九
檀香	二九
烏藥	三〇
乳香	三一
沒藥	三一
龍腦香	三一
茯神木	三一
海桐皮	三三

皂莢	三	葱白	四	五靈脂	五
西河柳	三	白芥子	四	虎骨	五
蕪荑	三	萊菔	四	麝臍香	五
五加皮	三	萊菔子	四	穿山甲	五
蔓荊子	三	生姜	四	蛇脫	五
紫荊皮	三	乾姜	四	白花蛇	五
密蒙花	三	胡荽	四	烏鰂魚骨	五
川椒	三	橘核	四	淡菜	五
椒目	三	枇杷葉	四	露蜂房	五
穀芽	三	荔枝核	四	白殭蠶	五
酒	三	橄欖	四	蝎	五
秫米	四	甜瓜蒂	四	蜈蚣	六
大麥	四	銅青	四	卷 三 通劑全 共 三十三種	
麥芽	四	蓬砂	四		
陳神麴	四	秋露水	五		
紅麴	四	陰陽水	五		
豉	四	白鴿	五		
				白鮮皮	五
				通草	六
				木通	六

澤蘭	三	草薺	四	黃耆	八六	
香薷	四	土茯苓	五	沙參	八七	
澤瀉	四	防己	五	丹參	八八	
菖蒲	五	猪苓	七	蕨蕪	八八	
茵陳蒿	六	茯苓 赤白	七	白朮	八九	
益母草 附茺蔚子	七	琥珀	六	金毛狗脊	九〇	
紅花	六	赤小豆	九	遠志	九〇	
大薊	六	大豆黃卷	九	巴戟天	九一	
小薊	六	薏苡仁	八〇	淫羊藿	九二	
地膚子	充	韭	八一	當歸	九三	
瞿麥	七	流水	八一	石斛	九四	
王不留行	七	白魚	八二	骨碎補	九五	
車前子	七	蜚蠊	八二	續斷	九五	
刺蒺藜	七	卷 四 補劑上 共三十七種			乾地黃	九六
海金沙	七				熟地黃	九六
甘遂	七				生地黃	九七
芫花	七				牛膝	九八

麥冬	九六	地骨皮	一〇七	蓮鬚	一六
旱蓮草	九八	枸杞苗葉	一〇八	黃土	一七
沙苑蒺藜	一〇〇	卷五 補劑下 四十六種 共		髮髮 附風	一七
菟絲子	一〇〇			人乳	一八
使君子	一〇二			秋石	一八
天冬	一〇二			紫河車	一九
何首烏	一〇二			鴨 附野	一九
側柏葉	一〇三	小麥	一〇	烏骨雞	二〇
柏子仁	一〇三	黑穠豆	一〇	雞肫皮	二〇
血竭	一〇三	白穠豆子	一〇	雞尿白	二一
茯神	一〇四	韭子	一一	鹿茸	二一
桑寄生	一〇四	薯蕷	一二	鹿角	二三
杜仲	一〇五	百合	一二	鹿角膠	二三
棗仁	一〇五	棗 附橘紅	一三	麋茸 附藥	二三
山茱萸	一〇六	胡桃	一四	羊肉 附羊肝	二三
女貞實	一〇七	龍眼	一四	牛乳 附牛髓	二四
枸杞子	一〇七	甘蔗	一五	阿膠	二五
		蓮藕	一五		
		蓮子	一六		

臘肭臍.....二六

魚鰾.....二六

龜甲.....二七

鼈甲.....二六

蜂蜜附蜜蟻.....二六

桑蠟蛸.....二六

雄原蠶蛾.....二〇

卷 六 海劑土 六十七種 共

葶蘆.....二三

大黃.....二三

知母.....二三

元參.....二三

白頭翁.....二四

三七.....二五

黃連.....二五

胡黃連.....二五

黃芩.....二七

苦參.....二六

龍胆草.....二六

白薇.....二六

白前.....二六

丹皮.....二六

姜黃.....二四

蓬莪朮.....二四

荊三稜.....二四

海藻附海帶.....二四

昆布.....二四

蒲公英.....二四

青蒿子.....二五

夏枯草.....二五

劉寄奴.....二五

旋覆花.....二四

青葙子.....二四

漏蘆.....二七

苧根.....二七

牛蒡子.....二六

大青.....二六

青黛附靛藍 汁青布 葉.....二六

扁蓄.....二六

蘆根笋花.....二六

紫苑.....二六

決明子.....二五

紫花地丁.....二五

射干.....二五

馬兜鈴.....二五

瓜蒌實附仁霜 天花粉.....二五

山豆根.....二五

忍冬藤金銀花.....二五

降真香.....二五

阿魏.....二五

蘆薈	一五	荳蔻	一六	羚羊角	一七
黃柏	一五	冬瓜皮	一六	熊胆	一六
厚朴	一五	杏仁	一六	刺猾皮	一六
苦楝子	一五	桃仁	一六	龍齒	一六
槐花 附槐角子	一五	梨	一七	眞珠	一六
蘇木	一五	山查	一七	石決明	一六
巴豆	一六	青皮	一七	海蛤粉	一六
桑根白皮 桑葉桑枝	一六	檳榔	一七	瓦楞子	一六
枳實	一六	西瓜	一七	水蛭	一六
枳殼	一六	海浮石	一七	五穀蟲	一六
山梔子	一六	食鹽	一七	蝨蟲	一六
郁李仁	一六	青鹽	一七	蟾蜍 附蟾酥	一六
大腹皮	一六	寒水石	一七	白頸蚯蚓 附蚯蚓泥	一六
竹葉 附竹茹竹瀝	一六	人中黃 附清養	一七		
天竺黃	一六	人中白 附人溺	一七		
雷丸	一六	夜明砂	一七		
		犀角	一七		

卷

七

瀉劑下 共三十四種

卷

八

輕劑全 重劑全 共三十二種

麻黃
葛根
附葛花葛粉

升麻	密陀僧	胡麻
·一八七	·一九七	·二〇八
蒼耳子	硃砂	麻油
·一八六	·一九六	·二〇九
木賊草	雄黃 附雌黃	大麻仁
·一八六	·一九九	·二〇九
燈心草	石膏	薤白
·一八六	·一九九	·二一〇
連翹	陽起石	柿
·一八九	·二〇一	·二一〇
穀精草	磁石	榧子
·一九〇	·二〇二	·二一一
百草霜	青礞石	海松子
·一九〇	·二〇二	·二一一
墨	代赭石	滑石 以上滑劑
·一九一	·二〇三	·二一二
蟬退 以上輕劑	伏龍肝 以上重劑	地榆
·一九一	·二〇四	·二二三
沉香	卷 九 滑劑全 重劑全 共四十一種	
·一九三		
紫檀		
·一九三		
金箔	冬葵子	芍藥 赤白
·一九五	·二〇五	·二二四
銀箔	肉蓯蓉	五味子
·一九五	·二〇五	·二二五
自然銅	鎖陽	覆盆子
·一九六	·二〇六	·二二六
鐵砂	紫草	椿樗白皮
·一九六	·二〇六	·二二七
青鉛 黑錫灰 附鉛粉	蒲黃	秦皮
·一九六	·二〇七	·二二八
黃丹	榆白皮	訶黎勒
·一九七	·二〇七	·二二八
		棕櫚皮
		·二二九

金櫻子	三九
南燭子	三〇
醋	三〇
罌粟殼 粟米	三二
烏梅	三二
木瓜	三三
芡實	三三
赤石脂	三三
白石脂	三四
禹餘糧	三四
明礬	三四
皂礬	三五
胆礬	三五
烏爹泥	三六
龍骨	三七
牡蠣	三七
五倍子	三六

百藥煎	三九
以上 滴劑	
卷十	
燥劑全 濕劑全 共三十四種	
蒼朮	三〇
仙茅	三一
草豆蔻 草蔻	三一
肉豆蔻	三一
益智仁	三一
楠骨脂	三三
胡盧巴	三四
附子	三四
川烏	三六
草烏頭	三七
白附子	三八
天南星 牛胆星	三八
半夏	三九
桂肉桂	三九

桂心	四〇
桂枝	四〇
柳桂	四一
官桂	四二
丁香	四三
胡椒	四四
畢澄茄	四五
吳茱萸	四五
茴香 附小茴	四六
爐甘石	四七
硫黃 以上 燥劑	四七
飴糖	四八
白石英	四九
紫石英	四九
朴硝 附芒硝 風化硝 馬牙硝 硝石	五〇
元明粉 以上 濕劑	五一

要藥分劑

清 沈金鰲 輯著

卷一

宣劑上

徐之才曰。宣可去壅。生姜、橘皮之屬是也。李杲曰。外感六淫之邪。欲傳入裏。三陰實而不受。逆於胸中。窒塞不通。而或噦或嘔。所謂壅也。三陰者脾也。故必破氣藥如生姜、橘皮、藿香、半夏之類瀉其壅塞。王好古曰。木鬱達之。火鬱發之。土鬱奪之。金鬱泄之。水鬱折之。皆宣也。

桔梗 味苦辛。性微溫。有小毒。感輕清之氣而生。升也。陽中陰也。畏白芨、龍胆草。忌豬肉、伏砒。

【主治】主胸脇痛如刀刺。腹滿腸鳴幽幽。驚恐悸氣。本經利五臟腸胃。除寒熱風痺。療咽喉痛。下蠱毒。別錄治下痢。破血積氣。消聚痰涎。去肺熱氣促嗽逆。除腹中冷痛。主中惡。小兒驚癇。甄權下一切氣。止霍亂轉筋。心腹脹痛。除邪辟溫。破癥瘕肺癰。養血排膿。補內漏。及喉痺。大明利竅。治肺部風熱。清利頭目。咽隘胸膈滯氣及痛。除鼻塞。元素治寒嘔。東垣主口舌生瘡。赤目腫痛。時珍

【歸經】入肺心二經。兼入胃經。爲開發和解之品。兼瀉劑 肺經氣分藥

【前論】張元素曰。桔梗清肺氣。利咽喉。其色白。故爲肺部引經。同甘草爲舟楫之劑。如大黃苦洩峻下。

之藥。欲引至胸中至高之分。須用辛甘升之。譬如鐵石入江。非舟楫不載。所以諸藥有此一味。不能下沉也。朱震亨曰。乾咳嗽。乃痰火之邪鬱在肺中。宜桔梗開之。痢疾腹痛。乃肺金之氣鬱在大腸。亦宜桔梗開之。後用痢藥。此藥能開提氣血。故氣藥宜用。

【禁忌】經疏曰。凡攻補下焦藥中勿入。氣逆上升不得下降。及邪在下焦。均忌。

【炮製】雷公曰。凡用。須去頭上尖硬二三分。并去浮皮。泔浸。微炒。

天麻 味辛。性平。無毒。得土之辛味。兼感天之陽氣以生。升也。陽也。一名定風草。苗名赤箭根。即天麻。

【主治】主諸風濕痺。四肢拘攣。小兒風癇驚氣。利腰膝。強筋力。開寶治冷氣瘡痺。難緩不隨。語多恍惚。

善驚失志。甄權治風虛眩暈頭痛。元素

【歸經】入肝經。為祛風之品。肝經氣分藥

【前論】東垣曰。肝虛不足者。天麻。川芎以補之。羅天益曰。眼黑頭旋。風虛內作。非天麻不能治。天麻為定風草。故為治風之神藥。久服則遍身發紅丹。是驅風之驗也。寇宗奭曰。天麻須別藥相佐使。然後見其功。仍須加而用之。圖經曰。天麻用根。有由內達外之理。赤箭用苗。有自表入裏之功。

【禁忌】經疏曰。風藥多燥。風能勝濕。故也。凡病人覺津液少。口乾舌燥咽乾痛。大便澀。及火炎頭暈。血虛頭痛。南方似中風症。均忌。

【炮製】備要曰。凡用。以明亮堅實者佳。濕紙包煨熟。切片。酒浸一宿焙。

秦朮 味苦辛。性平。無毒。感秋金之氣而生。降多於升。陰中微陽也。菖蒲爲使。畏牛乳。

【主治】主寒熱邪氣。寒濕風痺肢節痛。下水利小便。本經療風無間久新。通身攣急。別錄傳尸骨蒸。治疳疾。及時氣。大明療酒疸黃疸。解酒毒。去頭風。甄權除陽明風濕。及手足不遂。口噤。牙痛。口瘡。腸風瀉血。能養血榮筋。元素治胃熱。虛勞發熱。時珍

【歸經】入胃大腸二經。兼入肝胆二經。爲洩散疎利之品。胃大腸去風濕藥

【前論】李時珍曰。此手足陽明藥。兼入肝胆。故手足不遂黃疸煩渴之病。須之。取其去陽明濕熱也。陽明有濕。則身體酸疼煩熱。陽明有熱。則日晡潮熱骨蒸。三痺必用之藥。

鰲按。感受風寒發熱。遍身疼痛。必以秦朮治之。以其能散結除邪也。并能養胎。

【禁忌】經疏曰。下部虛寒人。及小便不禁者。均忌。

【炮製】雷公曰。凡使。以布拭去黃白毛。乃用還元湯浸一宿。晒乾用。時珍曰。形作羅文相交。長而黃白左紋者良。

柴胡 味苦。性平。一云微寒。無毒。稟仲冬之氣。兼得地之辛味以生。升也。陰中陽也。半夏爲使。惡皂莢。畏藜蘆。

【主治】主傷寒邪熱。痰熱結實。虛勞肌熱。嘔吐心煩。諸瘧寒熱。頭眩目赤。胸痞脇氣。口苦耳聾。女人熱入血室。胎前產後諸熱。小兒痘疹。五疳羸熱。散十二經瘡疽血凝氣聚。功同連翹。備要腸胃心腹中結

氣。五臟間遊氣。胸中邪氣。大腸停積水脹。及濕痺拘攣肩背疼痛。脾痺。陽氣下陷。平肝胆心包三焦相火。及頭痛眩暈。本草括

【歸經】入肝胆心包三焦四經。爲表散之品。四經引經藥 少陽經表藥 其功發表和裏退熱升陽

【前論】東垣曰。柴胡能引清氣行陽道。傷寒外諸有熱病則加之。無熱不必加之。能引胃氣上行。升騰而行春令。時珍曰。瘧有五。瘧在肝胆心包有熱。則柴胡乃此四經必用之藥。瘧在脾胃有熱。或陽氣下陷。則柴胡爲升清退熱必用之藥。惟瘧在肺腎。當斟酌用之。然亦非必禁用也。孫琳曰。凡瘧瘵熱從髓出。若加剛劑。氣血愈虧。熱有在皮膚。在臟腑。在骨髓。在骨髓者。非柴胡不可。若得真銀柴胡。一服可愈。南方者力減。必三服乃可愈。汪昂曰。凡脇痛。多是肝木有餘。宜小柴胡湯加青皮、川芎、白芍。又左脇痛。宜活血行氣。右脇痛。宜消食行痰。又熱入血室。男女皆有之。柴胡在臟主血。在經主氣。

鰲按。今人治瘵。必用柴胡。若非柴胡即不足以爲治者。故致輾轉淹滯。變生不測。竟能殞命。則知瘵本非死症。惟概以柴胡治瘵者殺之也。夫柴胡爲少陽表藥。若其瘵果發於少陽。而以柴胡治之。無不立愈。若係他經用之。則必令他經之邪輾轉而入少陽。遷延日久。正氣已虛。邪氣仍盛。而且彌漫諸經。又或調養失宜。以至斃命。所必然矣。乃既至於死。而醫家猶曰柴胡爲治瘵要藥。吾開手即用之。不知其何以死。病家亦曰以柴胡治瘵而竟不效。此其命之當死也。彼此昏迷。不得一悟。良可浩嘆。古人云。凡瘵悞服柴胡。令人淹纏不已。是在古人未嘗不提醒此旨。而醫者總不能讀書。或讀而

未明其理。故至此也。今人又以柴胡爲治癆要藥。不知柴胡專於升散。並不能治癆熱。其始皆由日華子補五癆七傷。藥性能治勞乏羸瘦之語。誤之。以致後人妄用殺人。衍義云。有一種真臟虛損。復受邪熱。邪因虛而致勞。當須斟酌用之。此亦推究其極而言。惟其因虛。復受邪熱。以致成勞。故猶可斟酌而用。若但真元虛損。其不可再用表散之藥明矣。余非好異。實以人命攸關。故爲辨論於此也。

【禁忌】經疏曰。凡虛人氣升嘔吐。及陰虛火熾炎上。法所同忌。瘡非少陽經者勿入。

【炮製】備要曰。產銀州者色白黃而大。北產者色微黑而細。並良。南產者強硬不堪用。外感生用。有汗欬者蜜水炒。內傷升氣酒炒。下降用梢。

前胡 味苦。一云甘辛。性微寒。無毒。得土金之氣。而感秋冬之令以生。降也。陽中陰也。半夏爲使。惡皂莢。畏藜蘆。

【主治】主痰滿胸脇中痞。心腹結氣。風頭痛。去痰下氣。治傷寒寒熱。本經能去熱實。及時氣內外俱熱。甄權治一切氣。破癥結。開胃下食。通五臟。主霍亂轉筋。骨節煩悶。嘔吐反胃。氣喘咳嗽。安胎。小兒一切疳氣。大明清肺熱。化痰熱。散風邪。時珍

【歸經】入肺三焦二經。兼入脾胃大腸肝膀胱五經。爲解散之品。兼瀉劑降痰下氣要藥

【前論】時珍曰。前胡性降。與柴胡純陽上升不同。故其功長於下氣。氣下則火降。痰亦降。爲痰氣要藥。