

重修臺灣省通志

宋楚瑜



卷二  
土地志  
博物篇  
植物章

第二冊



林洋港 李登輝 邱創煥 連戰 宋楚瑜

監修

高育仁 邵恩新 劉裕猷 陳孟鈴 陳正雄 張麗堂

林豐正 徐德錡 謝金汀 林衡道 江慶林 簡榮聰

主修

劉寧顏

總纂

# 重修臺灣省通志

卷二

土地志

博物篇

植物章

第二冊

臺灣省文獻委員會編印

# 重修臺灣省通志

卷二  
土地志  
博物志  
植物志  
章

(第二冊)

監修：林洋港 李登輝 邱創煥

連戰 宋楚瑜

主修：高育仁 邵恩新 劉裕猷

陳孟鈴 陳正雄 張麗堂

林豐正 徐德錡 謝金汀

林衡道 江慶林 簡榮聰

總纂：劉寧 鄭元春 顏

編纂：林善雄 蔡振聰 鄭元春

廖日京 張慶恩 徐國士

出版：臺灣省文獻委員會

地址：南投市中興新村光明一路二五二號

電話：(〇四九)三一二〇一二

印刷：臺灣省政府印刷廠

地址：臺中縣大里鄉中興路一段二八八號

電話：(〇四)三三九三一 二六八

定價：新臺幣肆佰玖拾元

中華民國八十二年八月十五日

ISBN 957-00-2790-8

### 第三十九目 蓮葉桐科 (Hernandiaceae)

#### 一、臘樹 別稱：蓮葉桐。

學名：*Hernandia sonora* L.

常綠大喬木。葉互生，闊卵狀盾形，全緣，銳頭，基圓。花成繖房及聚繖花序，雌雄同株，雌花位於中央，雄花位於兩側，花被六，雄蕊三，核果藏於金黃而作壺狀之苞內。

產地：產恒春鵝鑾鼻半島香蕉灣及蘭嶼之朗島東邊與望南角下，分布南洋及印度洋沿岸各島嶼。

用途：防風定砂樹種。

#### 二、呂宋青藤

學名：*Iligera luzonensis* (Pr.) Merr.

匍匐藤本狀灌木。葉三出複葉，小葉卵形，長四至六公分。聚繖花序。果具翅。

產地：產恒春半島，如高雄經楓港以至墾丁公園等地，分布菲律賓之呂宋與巴拉灣等地。

用途：藥用。

### 第四十目 罂粟科 (Papaveraceae)

#### 一、薊罂粟 別稱：老風芳。

學名：*Argemone mexicana* L.

直立一年生草本，莖可達一公尺，多刺。葉無柄，長橢圓狀倒卵形或披針狀倒卵形，長七至二十五公分。基葉生羽狀深裂，齒牙緣，牙端有刺。花無柄或幾乎小短梗，萼片三，花瓣倒卵形，鮮黃色，柱頭暗紅，三至六裂。蒴果具有稜溝，長橢圓形，長二十五至四十公厘，蒴片三至六枚。

產地：已成馴化種，原產西印度諸島，分布臺灣南部及澎湖地區之海濱砂地。

用途：全草爲發汗劑，種子爲瀉劑。

## 二、彎果黃堇

學名：*Corydalis ophiocarpa* Hook. f. & Thoms.

多年生草本，平滑粉白，莖綠色，叢生，具有稜角。葉具有柄，二回羽狀複葉，長八至十六公分，小葉卵狀長橢圓狀，三至九深裂或全裂，裂片卵形，常呈缺刻。花頂生，總狀花序，花瓣綠黃色，有時帶暗紫色，有短距。蒴果線形，長三公分，頗彎曲。

產地：產全省山區之草地與森林內，分布我國、日本及印度。

用途：藥用。

## 三、臺灣黃堇

學名：*Corydalis tashiroi* Mak.

二年生草本，軟柔，平滑，粉白。葉闊卵形，長十至二十公分，二回羽狀複葉，小葉羽狀深裂至全裂。總狀花序與葉對生，苞片卵至披針形，花淡黃色，具短距。蒴果線形，直線，長三十至四十五公厘，種子黑，壓扁圓形。

產地：全省低中海拔處之山麓小丘及叢林，分布我國南部、日本九州南部及琉球。

用途：觀賞

## 四、金英花 別稱：花菱草。

學名：*Eschscholzia californica* Cham.

一年生草本，液汁無色。葉互生，數回羽狀至掌狀細裂，裂片線形，具長柄。花頂生，單一，萼連成帽狀，先端尖，花瓣四，黃色，大形，頗美麗，雄蕊多數。蒴果細長。

產地：栽培種，原產北美。

用途：觀賞。

#### 五、博落迴

學名：*Macleaya cordata* (Willd.) R. Br.

多年生草本。葉闊卵形，掌狀或羽狀分裂，裂片具粗齒牙裂，葉背被灰白與密短毛，長十至三十公分。花頂生，圓錐花序，直立，雄蕊多數。蒴果扁平，平滑，長二公分，灰褐色。

產地：臺灣北部山麓小丘或平地開闊荒地，分布我國及日本。

用途：全草為殺蟲劑，外用治惡瘡及皮膚病。

#### 六、鬼罌粟

學名：*Papaver orientale* L.

多年生草本，莖葉被長粗毛。根生葉具長葉柄，羽狀全裂，裂片闊披針形，上部之葉，長二十至三十公分。

花無苞片，深紅色，徑三公分，萼片二或三，厚質，花瓣四至六，倒卵形。蒴果闊倒卵體，平滑。

產地：栽培於庭園，分布地中海地區原產。

用途：觀賞。

#### 七、虞美人 別稱：麗春花。

學名：*Papaver rhoeas* L.

一至二年生草本，莖具短毛。葉互生，齒牙或羽狀分裂，裂片披針形。花紅色、紫色或白色，萼片二，綠色，花瓣四，圓狀。蒴果倒卵形，平滑。

產地：栽培於庭園，原產歐洲、非洲北部及亞洲西部。

用途：觀賞。

八、罌粟 別稱：罌子粟、鴉片花。

學名：*Papaver somniferum* L.

二年生草本，莖直立。葉長橢圓形，長三至二十公分，邊緣有不規則缺刻，無柄，基抱莖。萼片二，花瓣四，圓形，全緣，大形，紅色、深紅色或紫色，早落；雄蕊多數。蒴果卵狀球形。

產地：栽培種，原產歐洲。

用途：花供觀賞，果實流出之乳汁稱為鴉片，有鎮痛止瀉之效用。

#### 第四十一目 白花菜科 (Capparidaceae)

一、銳葉山柑

學名：*Capparis acutifolia* Sweet.

小喬木。葉厚紙質，長卵形。花單一或四至五，於葉腋上方或列著生。萼片及花瓣各四片，雄蕊多數。漿果，徑十二至十五公厘，橢圓形。

產地：產中南部及恒春半島一帶之闊葉樹林內，分布我國南部、越南南部及琉球。

用途：觀賞。

二、繁花山柑

學名：·*Capparis floribunda* Wight.

灌木。葉長五至十二公分。花頂生或腋生，稍繖形或部份成圓錐花序，花瓣白色，雄蕊七至九（十二）。漿果球體，熟時橙色，種子一至三。

產地：產本省南部海濱地區之石灰岩土壤之森林內，分布印度、錫蘭、安達曼諸島、緬甸、馬來西亞、麻六甲、泰國、越南、爪哇及菲律賓等地。

用途：觀賞。

### 三、蘭嶼山柑

學名：·*Capparis lanceolaris* DC.

纏繞性灌木，具反刺。葉稍呈革質，兩面均平滑，長橢圓形，長五至十五公分，先端漸尖，稀呈圓至稍凹頭，基銳至圓或稍心形。近於繖形花序，腋生，稀頂生，花瓣倒卵形，長八至十一公厘，雄蕊二十（至四十）。漿果球形長二十三至三十五公厘，熟呈青黑，種子三或更多。

產地：產蘭嶼石灰岩土或叢林內，分布菲律賓、馬來西亞、麻六甲、順達島、帝汶、西里伯島、新幾內亞及澳洲等地。

用途：觀賞。

### 四、小刺山柑

學名：·*Capparis micracantha* DC. var. *henryi* (Matsum.) Jac.

灌木，具刺。葉革質，卵至倒卵形，長八至十三公分，先端呈圓或漸尖。花一至十，雄蕊十二至十六。果球形，乾時呈黃色。

產地：產本省南部及恒春半島低海拔叢林或後生林內，分布緬甸、泰國、中南半島至馬來西亞。

用途：觀賞。

#### 五、毛花山柑

學名：*Capparis pubiflora* DC.

灌木，小枝被密絹毛，具有刺。葉革質至稍革質，卵狀披針形，長七至二十五公分，先端漸尖，基圓形。短總狀花序，一至五朵，雄蕊二十至三十（可達五十）。漿果橢圓形，長十二至二十一公厘，種子五至十五（可達二十五）。

產地：產綠島乾地，分布帝汶、爪哇、順達島、蘇門答臘、婆羅洲、西里伯島、新幾尼亞、泰國、越南、海南島及菲律賓。

用途：觀賞。

#### 六、山柑

學名：*Capparis sihimensis* Kurz. subsp. *formosana* (Hemsl.) Jacobs.

攀緣灌木。葉稍革質，長橢圓形，八至十八公分，先端圓形、短漸尖頭，基銳形。花三至八（可達二十），腋生，稍呈繖形花序，稀頂生圓錐花序或單一，花瓣倒卵形，雄蕊三十至一百二十。漿果橢圓體，深紫色。

產地：產本省南部及恒春半島森林陰處、開闢叢林及河溪邊，分布琉球及海南島。

用途：觀賞。

#### 七、魚木

學名：*Cratogeomys adansonii* DC. subsp. *formosensis* Jacob.

落葉大喬木。葉互生，三出葉，七至十七公分，叢生於枝端，小葉長倒卵形，全緣，先端銳形，長五至十七公分。花頂生，繖房花序，黃白色。萼片四，花瓣四，倒卵形，雄蕊多數。漿果球形至卵形，長六至七公分。

產地：產本省北部特多，產全省低海拔常見。原種在熱帶及亞熱帶地區，香港有原種的行道樹。

用途：觀賞及行道樹。

#### 八、白花菜 別稱：羊角菜。

學名：*Cleome gynandra* L.

一年生草本。莖直立。葉互生，掌狀五小葉，具長葉柄，小葉倒卵形，全緣或屢具細鋸齒緣。花成總狀花序。苞片三，萼片四，花瓣白色，倒卵形，雄蕊六。蒴果，長十公分，殆平滑，種子黑色，圓腎形，有皺紋。

產地：產本省南部海濱砂地與附近島嶼。

用途：觀賞。

#### 九、向天黃

學名：*Polunisia viscosa* DC.

一年生草本，莖具腺狀毛。葉掌狀三至五小葉，小葉倒卵形。花成總狀花序，萼片四，花瓣四，黃色，狹長橢圓形，雄蕊八至十六。蒴果長橢圓形。

產地：普遍產於全省海濱地區，分布熱帶地區。

用途：草地。

### 第四十二目 十字花科 (Cruciferae)

#### 一、臺灣筷子芥 別稱：臺灣筷子芥。

學名: *Arabis formosana* (Masam.) Liu & Ying

多年生草本，叢生具星狀毛，莖單立或稍分枝，基生葉倒卵狀長橢圓形，鋸齒緣，莖葉卵狀心形、無柄，短總狀花序，花白色或帶粉紅色生於花莖先端，瓣片鐘形，長角狀線形，每一果實內具種子二十粒。

產地：本省中央山脈。

用途：莖葉可供食用。

二、基隆筷子芥菜。

學名: *Arabis kelung-insularis* Hay.

多年生草本，株高三十分，莖上部分枝具星狀毛。莖葉上部者長橢圓形，長三分具不規則鋸齒緣，下部者卵形長約五公分，鋸齒緣皆生有細毛。花頂生，總狀花序，花白色並具花梗。長角果線形，長三至五公厘，直立性。

產地：基隆地區。

三、玉山筷子芥

學名: *Arabis morrisonensis* Hay.

多年生草本，基部木質狀具毛茸，呈單生或分歧狀，高約二十至二十五公分。葉有根生葉或莖生葉兩大類，根生葉呈叢生狀，具長柄，葉長約三至五公分，有星狀毛茸，羽狀裂葉。莖生葉，單生呈倒披針形，先端鈍而基部漸狹，邊緣有鋸齒，花白色，頂生，總狀花序，花梗長一至二公分，萼片狹長橢圓形，花瓣長橢圓狀卵形。長角果呈線形、直立或略呈彎曲狀，種子長橢圓形。花期五至八月。

產地：南湖大山至大武山等中央山脈。

#### 四、臺灣芥菜

學名：*Barbarea taiwaniana* Ohwi.

多年生草本，莖直立，高約二十至四十公分有分枝。根生葉，有葉柄呈羽狀裂片，頂生裂片大，側生裂片小，基部左右不對稱。莖生葉無柄，裂片五至七對。花頂生，鮮黃或金黃色，花多數，總狀花序，花梗細長，萼片黃綠色長橢圓形，花瓣黃色倒卵形，花柱細長。長角果呈直立或斜上昇，扁平不彎曲，種子九至十二粒，腎形細小點光澤，平滑無毛。

產地：分布在南湖大山二千至三千六百公尺高山地區。

用途：莖葉可供食用。

#### 五、阿里山芥菜

學名：*Barbarea arisanense* (Hay.) Ying

多年生草本，莖直立，高約三十至四十公分。葉根生呈提琴形，羽狀細裂，長十至十五公分，具長柄而先端圓鈍而基部漸窄，裂片十一至十二對，倒卵形。莖生葉與根生葉相似，但較小。花叢生於頂端，金黃色，總狀花序而具長花梗，萼片線形，花瓣舌狀先端圓鈍而基部漸窄，雄蕊長零點二至零點三公分。長角果實，直立，線形具扁平。

產地：阿里山地區。

#### 六、芥藍菜 別稱：隔葉菜、佛光菜、隔暝仔菜。

學名：*Brassica alloglabra* Bail var. *acephala* DC.

一年生草本，全株無毛，帶灰青色。葉廣橢圓形，稍展開，葉柄細長。萼片披針形，花瓣萼形。晚秋或初冬

開花。長角果圓柱形。

產地：目前本省栽培種，原產我國大陸。

七、油菜 別稱：薺臺菜。

學名：*Brassica campestris* L. subsp. *mapus* Hook. f. & Anders. var. *nippo-orientalis* Nak.

二年生草本，分枝多，根葉大，鮮綠色，倒卵形或橢圓形，鋸齒緣，下部有缺刻，莖葉無柄，抱莖而生。總狀花序，頂生，花瓣四枚，黃色。長角果圓柱形。

產地：栽培種，原產中國大陸。

用途：嫩葉供食用，種子榨油可供調味料。

八、不結球白菜 別稱：土白菜、無心菜。

學名：*Brassica chinensis* Li.

一年生草本，根生葉廣闊，倒卵形，全緣或波浪狀，葉柄粗壯而基部具狹翼。花黃色，總狀花序。長角果圓柱形。

產地：目前在本省各地田地栽培，原產我國大陸。

用途：葉可供食用。

九、芥菜 別稱：刈菜、大芥。

學名：*Brassica juncea* (L.) Coss.

二年生草本。根葉大而剛硬，長倒卵形，長二十至八十公分，先端鈍，不整齊鋸齒緣，莖葉長橢圓披針形，波狀緣，表面有皺紋，無柄。花黃色，總狀花序。長角果實卵狀圓柱形，種子細小。

產地：廣被栽於田圃，原產亞洲大陸。

用途：嫩葉可供食用。

#### 十、花菜 別稱：花椰菜、球花甘藍。

學名：*Brassica oleracea* L. var. *botrytis* Li.

二年生草本，莖硬而肥大，上有大葉痕。葉闊大，長三十至五十公分，不整齊細齒緣。花密生成肉質塊狀。

產地：廣被栽於田圃，原產於歐洲。

用途：花球可供食用。

#### 十一、甘藍

學名：*Brassica oleracea* L. var. *capitata* Li.

一、二年生草本，葉闊大，平滑無毛，藍白色，不規則鋸齒緣，多層重疊，密集成球狀。花瓣倒卵形有具爪，四強雄蕊，長角果圓柱形。

產地：臺灣廣被田圃栽培，原產歐洲。

用途：嫩葉可供食用。

#### 十二、球莖甘藍

學名：*Brassica caulorapa* Pasq.

二年生草本。地上莖呈球狀，多肉質，色白，徑三至八公分，上生常葉並具長柄，邊緣鋸齒緣並具有淺裂。

產地：本省廣被栽培於田圃，原產地中海地區。

用途：球狀莖可供食用。

十三、結球白菜 別稱：臺東白菜。

學名：*Brassica pekinensis* Rupr.

根基生葉，多數且大形，倒卵狀長橢圓形或闊倒卵形，波狀邊緣或鋸齒緣，中肋闊，莖葉合抱成頭狀。

產地：廣被栽培於田圃，原產我國大陸。

用途：葉可供食用。

十四、薺菜 別稱：薺、只只菜、地末菜。

學名：*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic

一或二年生草本。根生葉叢生，羽狀分裂，全株有粗毛及星狀毛，葉披針形，基部箭狀，無柄。花瓣倒卵形，四片有爪呈白色，總狀花序而呈十字排列，雄蕊六枚。短角果倒三角形，果梗細長，種子多數。

產地：本省中北部原野及澎湖地區，原產歐洲。

用途：幼嫩葉可供食用，根部可供藥用治淋病。

十五、阿玉碎末薺

學名：*Cardamine agrykumontana* Hay.

多年生草本，根生葉具長柄，光滑，心狀腎形，長二公分，波狀緣，五至七脈，莖葉一至二枚。總狀花序，頂生，萼片長橢圓形，先端鈍，花瓣倒卵狀堇形，先端圓，雄蕊六枚，子房線形。

產地：阿玉山。

十六、高山碎末薺

學名：*Cardamine crisanensis* Hay.

多年生草本，無毛，莖直立，高約三十至四十公分，羽狀葉，長十至十五公分並具長葉柄，葉尖較圓而基部漸細，卵形。花頂生，密生總狀花序，花梗約三公厘，花萼直線花瓣先端較圓而基部較細。

產地：中央山脈地區，爲本省特有植物。

十七、細葉碎末薺 別稱：薺菜、碎末菜、小葉碎末薺。

學名：*Cardamine flexuosa* With.

一年生草本，高約五十公分。葉互生，羽狀分裂，裂片二至三對，橢圓形或倒卵形，頂裂葉最大。花白色，腋生或頂生，總狀花序，花瓣倒卵形呈十字形排列，直徑約零點二公分，雄蕊六枚，果實長角果，成熟時果皮扭轉彈出種子，每果種子約十至十八粒。

產地：本省中海拔地區開墾地或山徑旁或潮濕的庭園、水邊成群生長。

十八、水花菜

學名：*Cardamine simpatiens* L.

一年或多年生草本，全株具稀疏短軟毛，莖細長直立，有分枝，高約二十至六十公分。葉豎琴狀，羽狀葉，七至十九對，羽狀裂，根生葉，無葉柄而基部耳狀。花綠白色，總狀花序，有花梗長約零點三至零點七公分，花萼扁圓形有毛，花瓣扁圓形。長角果直線形，長約一點五至二點五公分。

產地：臺灣中部地區。

十九、日本薺菜

學名：*Cardamine nipponica* Fr.

球根性的多年生草本，多分枝，成簇生長，高約十至十五公分。根生葉，長約一點五至三公分，羽狀葉有三

至七對小葉片，橢圓形或卵形，無柄、全緣，頂葉較大。花白色，總狀花序，花萼橢圓形，長約零點二至零點三公分，花瓣楔狀倒卵形。長角果。

產地：本省各地平原地區。

二十、腎葉碎末薺

學名：*Cardamine reniformis* Hay.

草本，株高八至九公分。根葉有長柄，柄長約五公分，葉片圓柱形，先端鈍，波狀緣，六至七掌狀脈，近於光滑。花小長約零點三公分，萼片四枚橢圓形，花瓣萼形，雄蕊六枚。角果線形，長約二公分。

產地：本省原野。

二十一、臺灣碎末薺

學名：*Cardamine seutata* Thunb. var. *formosana* (Hay.) Liu & Ying

球根性的多年生草本，莖多分枝，高約十五至二十公分，羽狀葉，倒卵形，葉柄長零點二公分，有三至五裂片，前端圓而基部細小。花小形、白色，總狀花序，長約三至六公分，有花梗長約零點一至零點三公分，苞葉鈍形，花萼橢圓形，花瓣倒卵形，前端圓形而基部較尖，花絲長約零點一至零點二公分。長角果線形，種子橢圓形。

產地：本省低到高海拔山區皆有自生。

二十二、臺灣假山葵

學名：*Cochlearia formosana* Hay.

草本，纖細，光滑。單葉或三小葉，紙質，心形，長約三公分，先端凹而基部腎形、全緣或疏齒緣。總狀花