

中國科學院植物研究所編輯

南京民間藥草

周太炎 丁志遵

科 學 出 版 社

453

南宮子

秋曉一月有雨

南宮子

中國科學院植物研究所編輯

南京民間藥草

周太炎 丁志達

科學出版社

1956年11月

內容提要

我國民間的藥草，幾乎到處都有，並對人民醫療上起了一定的作用。但由於以往大家對中藥的認識不足，尤其對民間的藥草，缺少應有的重視和科學的整理，因此在這方面的資料比較缺乏，在藥草名稱和品種方面，也有一定的混亂現象。作者曾就南京民間的藥草，加以調查和整理，一方面為醫藥研究工作者提供研究的資料，一方面想解決市場上一些藥草品種的混亂現象，就寫成了“南京民間藥草”這本小冊子。本書共收載藥草 111 種和變種，屬於 57 科和 102 屬。每種除記述其常用的中名，學生和異名，及南京草藥名（附生藥調查編號）外，對原植物的形態（包括自然生長環境和開花結實時期），藥用部分和民間效用等三項，都加以扼要的敘述，並附有植物圖和商品生藥照片共 221 幅。為了使讀者便於查閱起見，特在正文前面編列科目（依植物分類順序），並在正文末尾編寫了中文索引和學名索引。

本書可供中藥業工作者，高中級醫藥學校師生，醫藥機構工作人員，藥用植物調查工作者，科學普及工作者，以及有關人員在研究和鑑別藥草時的參考資料。

南京民間藥草

著者 周太炎 丁志遵

編輯者 中國科學院植物研究所

出版者 科學出版社

北京朝陽門大街 117 號
北京市書刊出版業營業許可證出字第 061 號

印刷者 上海中科藝文聯合印刷廠

總經售 新華書店

1956年11月第一版

書號：0587 印數：5 21/26

1956年11月第一次印刷

開本：787×1092 1/28

(選)0001—7200

字數：114,000

定價：(10)報紙本 0.85 元

前　　言

我國的藥用植物資源，非常豐富，很多藥物已被收載於歷代本草書籍中；但流行於民間的藥草而還沒有列入本草的，種類也很多；其中確有療效，並且有一定應用基礎的，幾乎是各地都有。但由於以往大家對中藥的認識不足，尤其對民間的藥草，缺少應有的重視和科學的整理，因此在這方面的資料很缺乏，在藥草名稱和品種方面，也有一定的混亂現象。這樣，對於發掘和推廣民間醫藥經驗，會受到一定的影響。為了響應黨和政府重視中藥研究與整理的偉大號召，我們結合工作單位的性質和所在地區的實際情況，把南京民間的藥草，加以調查、鑑別、整理和總結。我們的目的是：一方面為醫藥研究工作者提供研究的資料，一方面想解決市場上一些藥草品種的混亂現象。

二年來，我們在結合南京郊區藥用植物普遍調查的基礎上，又陸續地調查和訪問了南京市較有經驗的一些草藥業同志，如雨花街的張忠林，夫子廟的雷國信和釣魚台的魏文龍等；收購了他們草藥舖裏所經營的商品藥草，調查和記錄下各種藥草的民間用法和效用；同時又參考與實地採集壓製標本，將各藥草分別加以考證和鑑定。我們將所得的材料，經過綜合整理，寫成了“南京民間藥草”這本小冊子。

本書一共收載了藥草 111 種和變種，屬於 57 科 102 屬，插圖共 221 幅。每種除記述其常用的中名、學名和異名及南京草藥名（附生藥調查編號）外，對原植物形態（包括自然生長環境和開花結實時期），藥用部分和民間效用等三項，都加以扼要的敘述。為了使讀者便於查閱和參考起見，特在正文前面編列科目（依植物分類順序），並在正文末尾編寫了中文索引和學名索引。

因限於時間和人力，在藥草種類上和療效上，難免有調查不周或有遺漏的地方；因此希望讀者能多給指示和多提意見（函件請逕函南

京中山門外中國科學院植物研究所南京中山植物園),以便今後修改增訂。

本書編寫過程中,蒙裴鑑和陳封懷二教授校閱;單人驛和徐國鈞二教授提供意見,作者謹此致以衷心的謝意。

目 錄

| | |
|--|----|
| 前言 | i |
| 1. 卷柏科 Selaginellaceae | |
| (1) 卷柏 <i>Selaginella tamariscina</i> (Beauv.) Spring..... | 1 |
| 2. 木賊科 Equisetaceae | |
| (2) 木賊 <i>Equisetum ramosissimum</i> Desf..... | 2 |
| 3. 海金沙科 Schizaeaceae | |
| (3) 海金沙 <i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw..... | 3 |
| 4. 凤尾蕨科 Pteridaceae | |
| (4) 蕨 <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn..... | 4 |
| 5. 水龍骨科 Polypodiaceae | |
| (5) 貫眾 <i>Cyrtomium Fortunei</i> J. Sm..... | 5 |
| (6) 凤尾草 <i>Pteris multifida</i> Poir..... | 6 |
| (7) 石葦 <i>Pyrrosia lingua</i> (Th.) Farw..... | 7 |
| 6. 禾本科 Gramineae | |
| (8) 白茅 <i>Imperata cylindrica</i> (L.) Beauv. var. <i>major</i> (Nees) Hubb. | 8 |
| (9) 蘭葦 <i>Phragmites communis</i> Trin..... | 9 |
| 7. 莎草科 Cyperaceae | |
| (10) 水葱 <i>Scirpus lacustris</i> L. var. <i>Tabernaemontani</i> Trauv.... | 10 |
| 8. 天南星科 Araceae | |
| (11) 魔芋 <i>Amorphophalus konjac</i> K. Koch..... | 11 |
| (12) 掌葉半夏 <i>Pinellia pedatisecta</i> Schott | 12 |
| 9. 百部科 Stemonaceae | |
| (13) 直立百部 <i>Stemona sessilifolia</i> (Miq.) Fr. & Sav..... | 13 |
| 10. 百合科 Liliaceae | |
| (14) 野薑 <i>Allium Bakeri</i> Regel..... | 15 |

| | |
|--|----|
| (15) 天冬草 <i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr. | 16 |
| (16) 白花百合 <i>Lilium Brownii</i> F. E. Br. var. <i>colchestri</i> Wils. | 17 |
| (17) 沿階草 <i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker-Gawl. | 18 |
| (18) 玉竹 <i>Polygonatum officinale</i> All. | 19 |
| (19) 蘭蕪 <i>Smilax china</i> L. | 20 |
| 11. 石蒜科 Amaryllidaceae | |
| (20) 石蒜 <i>Lycoris radiata</i> Herb. | 21 |
| 12. 薦尾科 Iridaceae | |
| (21) 射干 <i>Belamcanda chinensis</i> (L.) DC. | 22 |
| 13. 蘭科 Orchidaceae | |
| (22) 白芨 <i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Reichb. f. | 23 |
| 14. 三白草科 Saururaceae | |
| (23) 蕺菜 <i>Houttuynia cordata</i> Thunb. | 24 |
| (24) 三白草 <i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill. | 25 |
| 15. 殼斗科 Fagaceae | |
| (25) 麻櫟 <i>Quercus acutissima</i> Carr. | 26 |
| 16. 桑科 Moraceae | |
| (26) 桑 <i>Morus alba</i> L. | 27 |
| 17. 蕁麻科 Urticaceae | |
| (27) 荸薺 <i>Boehmeria nivea</i> Gaud. | 28 |
| 18. 馬兜鈴科 Aristolochiaceae | |
| (28) 馬兜鈴 <i>Aristolochia debilis</i> S. et Z. | 30 |
| (29) 純毛馬兜鈴 <i>Aristolochia mollissima</i> Hance | 31 |
| 19. 蓼科 Polygonaceae | |
| (30) 蕎蕎 <i>Polygonum aviculare</i> L. | 32 |
| (31) 虎杖 <i>Polygonum cuspidatum</i> S. et Z. | 33 |
| (32) 何首烏 <i>Polygonum multiflorum</i> Thunb. | 34 |
| 20. 莧科 Amaranthaceae | |
| (33) 牛膝 <i>Achyranthus bidentata</i> Blume | 36 |
| (34) 雞冠花 <i>Celosia argentea</i> L. var. <i>cristata</i> Kuntze | 37 |
| 21. 商陸科 Phytolaccaceae | |

| | | | | |
|----------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|----|
| (35) 商陸 | <i>Phytolacca esculenta</i> | van Houtte..... | 38 | |
| 22. 馬齒莧科 | <i>Portulacaceae</i> | | | |
| (36) | <i>馬齒莧</i> | <i>Portulaca oleracea</i> | L..... | 39 |
| 23. 石竹科 | <i>Caryophyllaceae</i> | | | |
| (37) | <i>瞿麥</i> | <i>Dianthus superbus</i> | L..... | 40 |
| 24. 毛茛科 | <i>Ranunculaceae</i> | | | |
| (38) | <i>烏頭</i> | <i>Aconitum chinense</i> | Paxt..... | 41 |
| (39) | <i>威靈仙</i> | <i>Clematis chinensis</i> | Osbeck..... | 43 |
| (40) | <i>黃藥子</i> | <i>Clematis paniculata</i> | Thunb..... | 44 |
| (41) | <i>禹毛茛</i> | <i>Ranunculus cantoniensis</i> | DC..... | 45 |
| 25. 木通科 | <i>Lardizabalaceae</i> | | | |
| (42) | <i>木通</i> | <i>Akebia quinata</i> | (Thunb.) Decne..... | 46 |
| 26. 防己科 | <i>Menispermaceae</i> | | | |
| (43) | <i>木防己</i> | <i>Cocculus trilobus</i> | DC..... | 47 |
| 27. 景天科 | <i>Crassulaceae</i> | | | |
| (44) | <i>鮮三七</i> | <i>Sedum Aizoon</i> | L..... | 48 |
| (45) | <i>流蘇瓦松</i> | <i>Sedum fimbriatum</i> | (Turcz.) Fr..... | 50 |
| 28. 薔薇科 | <i>Rosaceae</i> | | | |
| (46) | <i>龍牙草</i> | <i>Agrimonia pilosa</i> | Ledeb..... | 51 |
| (47) | <i>野山楂</i> | <i>Crataegus cuneata</i> | S. et Z..... | 52 |
| (48) | <i>枇杷</i> | <i>Eriobotrya japonica</i> | Lindl..... | 53 |
| (49) | <i>委陵菜</i> | <i>Potentilla chinensis</i> | Ser..... | 54 |
| (50) | <i>地榆</i> | <i>Sanguisorba officinalis</i> | L..... | 55 |
| 29. 豆科 | <i>Leguminosae</i> | | | |
| (51) | <i>錦雞兒</i> | <i>Caragana chamaagu</i> | Lam..... | 56 |
| (52) | <i>雞眼草</i> | <i>Kummerowia striata</i> | (Thunb.) Schindl..... | 58 |
| (53) | <i>葛</i> | <i>Pueraria hirsuta</i> | Schneid..... | 59 |
| 30. 蕤藜科 | <i>Zygophyllaceae</i> | | | |
| (54) | <i>蒺藜</i> | <i>Tribulus terrestris</i> | L..... | 60 |
| 31. 芸香科 | <i>Rutaceae</i> | | | |
| (55) | <i>枸橘</i> | <i>Poncirus trifoliata</i> | Rafin..... | 61 |

| | |
|--|----|
| 32. 檵科 Meliaceae | |
| (56) 檫樹 <i>Melia Azedarach</i> L. | 62 |
| 33. 大戟科 Euphorbiaceae | |
| (57) 大戟 <i>Euphorbia pekinensis</i> Rupr. | 63 |
| 34. 冬青科 Aquifoliaceae | |
| (58) 枸骨 <i>Ilex cornuta</i> Lindl. | 65 |
| 35. 衛矛科 Celastraceae | |
| (59) 衛矛 <i>Erythroxylum alata</i> (Thunb.) Sieb. | 66 |
| 36. 葡萄科 Vitaceae | |
| (60) 白蘡 <i>Ampelopsis japonica</i> (Thunb.) Mak. | 67 |
| (61) 烏蘡 <i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagn. | 68 |
| 37. 金絲桃科 Hypericaceae | |
| (62) 湖南連翹 <i>Hypericum Ascyrion</i> L. | 70 |
| (63) 貢葉連翹 <i>Hypericum perforatum</i> L. | 71 |
| 38. 紫草科 Violaceae | |
| (64) 紫花地丁 <i>Viola japonica</i> Langsd. | 72 |
| 39. 瑞香科 Thymelaeaceae | |
| (65) 茄花 <i>Daphne genkwa</i> S. et Z. | 73 |
| 40. 繖形科 Umbelliferae | |
| (66) 蘋香 <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. | 74 |
| 41. 報春花科 Primulaceae | |
| (67) 珍珠菜 <i>Lysimachia clethroides</i> Duby | 75 |
| 42. 夾竹桃科 Apocynaceae | |
| (68) 絡石 <i>Trachelospermum jasminoides</i> Lem. | 76 |
| 43. 蘿藦科 Asclepiadaceae | |
| (69) 飛來鶴 <i>Cynanchum auriculatum</i> Royle | 78 |
| (70) 徐長卿 <i>Pycnostelma paniculatum</i> (Bge.) K. Schum. | 79 |
| 44. 旋花科 Convolvulaceae | |
| (71) 牽牛 <i>Pharbitis nil</i> (L.) Choisy | 80 |
| 45. 馬鞭草科 Verbenaceae | |
| (72) 馬鞭草 <i>Verbena officinalis</i> L. | 81 |

46. 唇形科 Labiateae
- (73) 夏枯草 *Brunella (Prunella) vulgaris* L.....82
 - (74) 益母草 *Leonurus sibiricus* L.....84
 - (75) 薄荷 *Mentha arvensis* L.....85
 - (76) 羅勒 *Ocimum basilicum* L.....86
 - (77) 白蘇 *Perilla frutescens* (L.) Brit.....87
 - (78) 脈紋香茶菜 *Plectranthus nervosus* Hemsl.....88
 - (79) 丹參 *Salvia miltiorrhiza* Bunge.....89
 - (80) 並頭草 *Scutellaria rivularis* Wall.....91
47. 茄科 Solanaceae
- (81) 枸杞 *Lycium chinense* Mill.....92
 - (82) 刺酸漿 *Physalis heterophyllum* (Hemsl.) Mak.....93
 - (83) 酸漿 *Physalis Alkekengi* L.....94
48. 玄參科 Scrophulariaceae
- (84) 陰行草 *Siphonostegia chinensis* Benth.....95
 - (85) 水苦蕡 *Veronica Anagallis-aquatica* L.....96
49. 列當科 Orobanchaceae
- (86) 野菰 *Aeginetia indica* L.....97
50. 爵牀科 Acanthaceae
- (87) 爵牀 *Justicia procumbens* L.....99
51. 車前科 Plantaginaceae
- (88) 車前 *Plantago asiatica* L.....100
52. 茜草科 Rubiaceae
- (89) 茜草 *Rubia cordifolia* L.....101
 - (90) 六月雪 *Serissa serissoides* (DC.) Druce.....102
53. 忍冬科 Caprifoliaceae
- (91) 忍冬 *Lonicera japonica* Thunb.....103
54. 敗醬科 Valerianaceae
- (92) 黃花龍牙 *Patrinia scabiosaeefolia* Link.....104
55. 葫蘆科 Cucurbitaceae
- (93) 條樓 *Trichosanthes Kirilowii* Maxim.....105

56. 桔梗科 Campanulaceae

- (84) 杏葉沙參 *Adenophora stricta* Miq. 106
 (95) 桔梗 *Platycodon grandiflorum* (Jacq.) A. DC. 108

57. 菊科 Compositae

- (96) 黃花蒿 *Artemisia annua* L. 109
 (97) 茵陳蒿 *Artemisia capillaris* Thunb. 110
 (98) 艾 *Artemisia vulgaris* L. 111
 (99) 蒼朮 *Atractylodes lancea* (Thunb.) DC. 112
 (100) 狼把草 *Bidens tripartita* L. 114
 (101) 野菊 *Chrysanthemum indicum* L. 115
 (102) 漏蘆 *Echinops latifolius* Tausch. 116
 (103) 一年蓬 *Erigeron annuus* (L.) Pers. 117
 (104) 漥蘭 *Eupatorium chinense* L. 118
 (105) 鼠麴草 *Gnaphalium multiceps* Wall. 119
 (106) 土三七 *Gynura japonica* (Thunb.) Juel. 120
 (107) 旋覆花 *Inula britannica* L. subsp. *japonica* Kitam. 122
 (108) 山萐苣 *Lactuca indica* L. 123
 (109) 雅葱 *Scorzonera albicaulis* Bunge. 124
 (110) 兔兒傘 *Syneilesis aconitifolia* Maxim. 125
 (111) 蒲公英 *Taraxacum mongolicum* Hand.-Mazt. 126
- 參考文獻 128
 中名索引 129
 學名索引 133

卷 柏

Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring

(*Stachygynandrum tamariscinum* Beauv.)

(*Selaginella involvens* (Sw.) Spring)

(卷柏科 Selaginellaceae)

草藥名：還魂草（143 號）。

多年生隱花植物，常綠不凋。莖葡萄，腹背扁平，葉腹面基部有1小舌狀體，單葉，形小，同型或異型；孢子囊2型，單生在葉軸中，1室，有2瓣；孢子為四面形，外壁平夷或有各式彫紋。（圖1）

多生在山地岩石上，極耐旱；天久不雨，枝葉內卷，濕時再開展。
南京紫金山頂上普遍野生，民間也常盆栽作觀賞用。

藥用部分：全草。（圖2）

民間效用：全草煎水服，有涼血、止血的效能。




圖2 卷柏生藥

木 賊

Equisetum ramosissimum Desf.

(*E. elongatum* H.B.H.)

(木賊科 Equisetaceae)

草藥名:木賊 (104 號)。

多年生草本，高 30—70 厘米，多分枝，枝細長，圓柱狀，生長時呈白綠色，中空，表面粗糙，有縱溝，多節，多含砂質；鱗片狀葉連成硬質鞘，齒片易於失去；孢子葉球頂生，呈筆頭狀，初綠褐色，後變為黃色。

(圖 3)




圖 3 木賊

1. 植株； 2. 地下莖； 3. 孢子葉球； 4. 鱗葉
的一部分 (已剖開)； 5. 孢子葉反面, 示孢子；
6. 孢子葉正面觀。

野生在河邊砂地，或山間較陰濕低凹處。5—6 月間孢子成熟。

藥用部分：全草。(圖 4)




圖 4 木賊生藥

民間效用：全草煎水服，治婦女濕淋症。

海 金 砂

Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.

(*Ophioglossum japonicum* Thunb.)

(海金砂科 Schizaeaceae)

草藥名：海金砂（141 號）。

多年生攀援草本，高達 4 公尺，地下莖細而匍匐，全體具有成節的毛，莖乾草色，具有白色微毛。葉為 1—2 回羽狀複葉，小葉卵狀披針形，邊緣有鋸齒或不規則分裂，上部小葉無柄羽狀或戟形，在下部的有長柄。孢子囊生在葉背面，在 2 回小葉的齒及裂片頂端，穗狀排列；孢子囊橫卵形，環帶側生，聚集一處。（圖 5）

野生在山坡，攀援他物而生



圖 5 海金砂

1. 地下莖；2. 地下莖及生孢子囊葉；3. 不生孢子囊葉；4. 生孢子囊葉放大；5. 生孢子囊葉的一部放大，示孢子囊蓋；6. 孢子囊放大，示環帶的地位；7. 地下莖上所生的節毛。（自藥用植物誌）




圖 6 海金砂生藥

長。孢子囊多在夏秋兩季成熟。

藥用部分：全草。（圖 6）

民間效用：全草煎水服，可以通便。

蕨

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.

(*Pteris aquilina* L.)

(鳳尾蕨科 Pteridaceae)

草藥名：山鳳尾，如意草（51 號）。

多年生草本，地下有長的根狀匍匐莖，外被柔毛。葉為羽狀複葉，革質，多被密毛，葉脈除在葉緣上連接外，都是分離的，孢子囊羣

沿葉緣着生，連續不中斷，生長在葉脈相連的地方，蓋兩層，外層（假囊羣蓋）是由葉緣反卷而成，



圖 7 蕨

1. 穗葉的一部分； 2. 根莖； 3. 小羽片背面，示孢子囊羣沿葉緣着生（放大）。




圖 8 蕨生葉（葉）

內層(真囊羣蓋)發育良好或缺如，不具隔絲；孢子囊有細柄，環帶約具有13個增厚的細胞；孢子長圓狀四面形。平滑。(圖7)

南京附近多生在山野和田邊。

藥用部分：全草。(圖8)

民間效用：全草煎水服治食隔，氣隔。這植物的嫩葉，可供食用；又自根莖採取澱粉，叫做蕨粉，也供食用和糊料用。

貴衆

Cyrtomium Fortunei J. Sm.

(水龍骨科 Polypodiaceae)




圖9 貴衆

1. 植物全形； 2. 小葉； 3. 葉柄基部的鱗片；
 - 3'. 體軸上的鱗片； 4. 孢子囊羣； 5. 孢子囊。
- （自藥用植物誌）

草藥名：貴衆(59號)。

多年生草本；葉由地下莖叢出，葉柄上密被卵形至披針形褐色鱗片，鱗片邊緣呈流蘇



圖10 貴衆生藥(葉)