

續修
古今書



《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

一〇〇九・子部・醫家類

幼幼新書四十卷拾遺方一卷（卷十七至卷四十）〔宋〕劉昉等編.....一

新刊演山省翁活幼口議二十卷〔元〕曾世榮撰.....四〇一

嬰童百問十卷〔明〕魯伯嗣撰.....四九九

幼幼新書二

〔宋〕劉昉等編

據上海圖書館藏明萬曆十四年陳履端刻本影印原書版框
高二〇四毫米寬二六〇毫米

呻喘急煩躁不眠

犀角錢一

白术

桔梗

陳皮錢各一

金銀箔各三片水銀一錢結砂

巴豆三粒裹燒香

研煉蜜丸如小豆服一二丸薄苛水研量增

研量增

張渙消宿食痰滯香橘皮湯

陳橘去白焙

木香各一

草豆蔻

白术炮

牽牛子

薑黃各半

草豆蔻

白术炮

羅末滴水丸如黍葱白湯下十粒大小便澀乳前服

幼幼新書

卷十七

三

保生治膈實氣痞痰盛喘促逍遙丸

半夏七次洗二兩枳實炒

檳榔

赤茯苓各一

細末薑汁麵糊丸菉豆大服二三十丸荆芥湯送下兒小丸
丁時發黑散子治涎壅咳嗽吐逆

天南星半夏

猪牙皂角

巴豆

白礬等分

瓦罐煅存性薑汁調半錢或麥門冬桑皮蜜湯下

鄭愈壞涎丸治咽喉涎鳴如鋸魚傷寒身熱面赤

半夏餅慢火炙

粉霜

鉛白霜

巴豆霜

雄黃

蝎梢錢各半

末麵糊丸如黍服五丸燈心湯化涎未下再投燈心湯即吐如取涎連三服即瀉次補

寒熱往來第二

東氏風邪外客皮膚痰飲內瀆藏府致血氣不和陰陽更相乘則陽勝則熱陰勝則寒陰陽之氣為邪所乘邪與正相干陰陽交爭時發時止故寒熱往來

幼幼新書

卷十二

四

張渙寒熱往來甚者漸羸痰實壯熱不除變驚癲夏傷于暑至秋成瘡

寶鑑歌

邪入皮膚裏還歸藏府巡陰陽多爭鬪寒熱往來頻

千金治乍寒乍熱

細切柳枝煮汁浴若渴絞冬瓜汁服

水鑑石室秘方兒百日內忽寒熱與冷藥即乳寒嘔逆與熱藥病加甚

桃花蔭末一錢	餘甘草充湯力更殊	藍花只消
一兩字	陰灌之入	口立消除
聖惠紫胡散	治寒熱往來	面色癢黃
紫胡	石膏	川大黃
秦艽	常山	麻黃
粗散一錢水一盞	煎五分溫日三服	
醫局小紫胡湯	治傷寒溫熱病身熱惡風頸項強急	
胃滿脅痛嘔噦煩渴寒熱往來身面皆黃	小便不利	
大便秘鞭或過經未解或潮熱不除差後勞復發熱		
幼幼新書	卷十七	五
頭痛婦人傷風頭痛煩熱經血適斷寒熱如瘡發作		
有時及產後傷風頭痛煩熱		
紫胡	黃芩	人參
斤半夏	三兩	甘草
半夏湯培二兩半	各	炙各
粗末三大錢水	蓋半盞五片裏一個擘煎七分稍	
熱不時分二服		
張渙秦艽湯		
秦艽	鱉甲	川大黃
半兩	醋炙各一兩	炒去根各
竹茹		
甘草		
炙各一分		

粗散一錢水一盞葱白二十煎五分溫服	人參	前胡	紫胡	桔梗
			各一兩	
			半夏	洗七次培
			各半兩	
細末一大錢水一盞薑二片煎半盞溫服	地骨皮	甘草		
		炙各		
芍藥湯	赤芍藥	黃芩	當歸	紫胡
	一兩		培	各半兩
細末一錢水八分一盞薑二片裏一枚煎五分去	肉桂	甘草		
		炙各		
細末一錢水八分一盞薑二片裏一枚煎五分去	細末	當歸	紫胡	
		培	各半兩	
細末一錢水八分一盞薑二片裏一枚煎五分去	細末	當歸	紫胡	
		培	各半兩	
寒熱五臟煩滿第三	寒熱	五臟	煩滿	第三
巢氏風客皮膚疾瀆藏府致血氣不和陰陽交爭故				
寒熱往來熱乘五臟氣積不泄而煩滿				
王訣寒熱虛積歌				
頻頻發熱藏中圖有積因傷未退除頰赤口瘡				
多躁渴瘦生不食胃還虛				
先調氣次取虛積下涎後補虛				
先調氣以解虛熱有熱不去真丸取				

真珠丸治五藏煩滿及下風涎積滯驚食病積

南星 半夏

滑石錢各二錢 輕粉四七錢

巴豆霜二粒

末麵糊丸芥子大服一二十九葱湯吞

寒熱腹痛第四

巢氏風客皮膚瘡潰藏府血氣不和則陰陽交爭則發寒熱而藏氣本實後為寒熱所乘則積氣在內使胃脅心腹煩熱而滿大便苦難小便赤澀

寒熱往來而藏虛本挾宿寒邪入于藏與寒相搏而

擊藏氣故腹痛

幼幼新書

卷十七

七

赤芍藥

當歸炒

寒水石

甘草末

黃芩各半

桂心一兩

粗散一錢水一小盞生地黃半分煎五分不時溫服

馬通粟丸治脅下氣塊腹痛喘逆氣息往來寒熱羸

瘦不食

馬通內粟

細辛

杏仁炒紫苑各三分

石膏

五味子

秦艽白茯苓

半夏各一分

羅末煉蜜丸如麻子溫水下五丸日三

寒熱結實第五

巢氏風邪客皮膚瘡潰飲瀆府藏使血氣不和陰陽交爭則發寒熱而藏氣本實後為寒熱所乘則積氣在內使胃脅心腹煩熱而滿大便苦難小便赤澀

千金兒連連壯熱實滯不去寒熱往來微驚悸

大黃一兩

蘇蘿根

甘草炙

黃芩各八錢

滑石兩

桂心

牡蠣

人参

龍骨

凝水石

白石脂

消石兩半

哎咀水四升煮升半服三合一日夜令盡雖吐亦

幼幼新書

卷十七

八

與一紫石英半兩

聖惠紫胡丸治寒熱結實或熱攻衝心腑氣急晝夜有汗日漸消瘦不吃乳食

紫胡

川大黃

鼈甲醋炙淨

赤茯苓半兩

人參

木香

桂心

枳殼

甘草炙各一分

羅末煉蜜丸如麻子溫水下五丸日三

大黃丸治增寒壯熱發歇不定腹中結實不能乳食

川大黃炒

紫胡

檳榔各半

赤茯苓半兩

桃仁	炒各分	人參	木香	桂心	枳殼炒
羅末燒蜜丸如麻子溫水下五丸日三					
鼈甲散					
鼈甲		赤茯苓	枳殼	川大黃	桂心
川朴硝各一兩			麸炒各半兩	炒各半兩	
粗糲一錢水一盞煎五分不時溫服					
寒熱食不消第六					
巢氏邪客皮膚瘡潰藏府使血氣不和陰陽交爭脾 胃之氣宿挾虛冷表雖寒熱內冷發動故食不消					
千金翼治寒熱咳逆膈中有癖吐乳不食					
乾地黃	四兩	麥門冬	五味子	蜜各半斤	
大黃	硝石	各一兩			
咬咀水三升煮一升去滓內硝蜜煮沸服二合日 三有宿乳升許出兒大五合					
聖惠訶梨勒丸治寒熱往來頭疼嘔吐及乳癖					
訶梨勒皮	木香	人參	赤茯苓		
桂心	川大黃	陳皮			
	炒各半兩	去白各半兩			

羅末煉蜜丸如麻子薄荷薑湯下五丸日三四 寒熱能食不生肌肉第七	秉氏胃氣挾熱熱則消穀穀消則引食陰陽交爭為 血氣不和則不能充養身體故寒熱往來雖能食而 不生肌肉
外臺大黃丸	
大黃一兩半米下	桂心
巴豆五十粒	乾薑各二分
巴豆清淨消石三分熬無	桂心
巴豆清淨消石三分熬無	乾薑各二分
幼幼新書	
卷十七	
十	
湯服熱在膈上當吐膈下當利兩食頃不吐下熱 粥飲動之又不動更動更服丸半能藥壯人二丸下多 冷粥解有瘡綿挺如指蜜和一丸塗挺頭旦內瘡 中岡出之不差更作溫病不大便宿食不消亦服 飛尸遁尸搽服半丸日一心腹脹滿痛服一丸瘡 發日宿易食清晨服一丸壯人二丸得吐飢過發 時乃食婦人產後血結中奔走起上下或絕產無 子或月經不調面目青黃服半丸兒淋瀝寒熱體 脹大腹不食食不生肌三四歲如麻子一丸日一	

乘之動前暑熱正邪相擊陰陽交爭陽盛則熱陰盛則寒陰陽更盛更虛故發寒熱陰陽相離則寒熱俱

歇若邪動氣至交爭復發故瘡休作有時發時漸晏

者由邪客風府循督而下衛氣一日夜常大會于風

府其明日日下一節故日晏發早者衛氣行風府日

下一節二十一日至尾骶二十二日入脊上注伏衛

脉其行九日出缺盆內氣既上故發更早間日發者

邪氣內薄五藏橫連募原其道遠其氣深其行遲故

間日蓄積乃發兒未觸暑亦病瘡者乳母抱持解脫

幼幼新書 卷十七 十三 不避風故

聖惠夏傷暑熱客皮膚至秋復為風邪所折陰陽交
爭故發寒熱而成瘡欲解則有汗汗多則津液減耗
又熱乘于藏則生虛躁差後藏府未得復內猶有熱
故渴而引飲引飲不止小便澀者變飲癖

茅先生兇身發寒久後脾熱則身熱渴因傷寒三四
日熱不退誤下冷藥脾氣不順遂至脾寒瘡

患眼春夏蘊積寒暑不常之氣久不宣泄至秋後陰
陽交冷熱乍時故成瘡因宿疾在心脾間須常山飲

水鑑歌

侵早喫吐下黃水後用勻氣散和門胃氣不如此間服便
不吐

寶鑑歌

瘡病是邪成陰陽有競爭早期風府會晏發脊

俞停至速連朝發來遲間日行小兒還見此何

必問神明

水鑑百日內瘡

瘡是邪風寒熱攻宜湏術治免成空常山刻作

人形狀丁釘孩兒生氣宮

幼幼新書 卷十七 十四 孫尚藥治瘡

信砒

二兩

寒水石

三兩

用鐵鉗先鋪石末一半後堆砒末復以石末蓋厚
蓋覆之周圍醋糊紙封固約十重炭一斤燒紙條
黑取出置地冷開蓋淨刮末細研軟米飯丸如梧
子兒服如黍飛辰砂衣發日早晚茶清下一丸一
日不得食熱物合時洒掃淨室勿令婦人貓犬雞
鼠等見婦人患男着在口中男患亦然

聖惠牡蠣散治瘡癰瘍發無時

牡蠣	常山	烏梅肉炒	人參各半
鼈甲分	知母	川升麻	甘草炙
豉心	桃仁炒各一		
細羅溫酒調半錢日二量加減			
升麻散治瘧疾發後煩熱			
川升麻	常山	蜀漆	川大黃炒
姜桂	黃芩	桂心各一	川芎硝半兩
桃仁散瘧疾發歇寒熱小便黃赤			
粗散一錢水一盞煎五分溫服吐利為度量與			
桃仁散瘧疾發歇寒熱小便黃赤			
初初新書卷十七			
桃仁炒	赤茯苓	鱉甲各三	知母
黃芩	川升麻各半	甘草炙一	
粗散一錢水一盞煎五分日三四溫服			
治瘧疾瘧煩悶常山散			
常山	甘草炙	川大黃各半	桂心分一
粗末一錢水一盞煎五分發前溫服吐利為度量減服外臺無大黃酒煎			
大蒜丸	獨顆蒜心去皮	巴豆一枚	一

巴豆內蒜中瀝紙裹煨熟搗丸如麻子醋湯下一丸更量吐利為度端午合	常先生脾寒鬼火散	常山	大腹皮	白茯苓	鼈甲醋
等分前三味不見火末二錢水一盞冬取桃柳枝各二七寸煎五分臨發服吐涎不妨	嬰孺前胡湯治時氣兼瘧	前胡	黃芩	升麻各四	細辛
幼幼新書卷十七		甘草	芍藥各三	大黃	常山各二
水一升六合為四服日二夜一					
吉氏草菓散					
草菓半夏各半					
朱氏	上等臘茶硫黃飛	甘草炙	烏梅	棗各一	常山一分
甲		末二錢水一盞薑三片煎七分服或去紫胡加鹽			

細末服一錢米飲調發日五更服寒多倍疏熱多

倍茶

襍臙灸刺法

千金翼肝瘡色花然太息狀若死刺足厥陰見血
心瘡心煩甚欲得清水寒多不甚熱刺足少陰謂神門

脾瘡病寒腹痛熱則腸鳴已汗出刺足太陰

肺瘡心寒甚熱間喜驚如有見刺手太陰陽明

腎瘡悽悽腰脊痛宛轉大便難目睭睭然手足寒刺

幼幼新書

卷十七

十七

足太陽少陰

胃瘡旦病寒喜飢不能食肢滿腹大刺足陽明太陰
橫脉出血

岐伯曰瘡有十二種瘡鬼得瘡字便愈

寅時發者獄死鬼所為以瘡人着壘上灰火一周不
令火滅差

卯時發者鞭死鬼所為用五白衣燒灰三指撮着酒

中無酒清水服

辰時發者墮木死鬼所為令瘡人上木高處以棘

午時發者燒死鬼所為令瘡人坐篩周匝燃火差

塞木奇間差

巳時發者燒死鬼所為令瘡人坐篩周匝燃火差

午時發者溺死鬼所為臨發時三渡東流水差

未時發者火燒脂香假拾薪去差

申時發者自刺死鬼所為欲發時以刀刺塚上使得姓字祝曰若差我與汝接却差

酉時發者奴婢死鬼所為令瘡人碓稍上捧上卧莫令人道姓字差

幼幼新書

卷十七

十八

戌時發者自絞鬼所為左索繩繫其手脚腰頭差

亥時發者盜死鬼所為以刀一口箭一隻灰一箇刀安瘡人腹上其箭橫着底下差

子時發者寡婦死鬼所為令瘡人脫衣東廂床上左手持刀右持杖打令聲不絕瓦盆盛水着路邊差

丑時發者斬死鬼所為令瘡人當戶前卧頭東向血流頭下差

矣瘡法醫不能救者繩量病人腳圍統足跟及五指一匝訖截斷繩取量繩置項上着反向背上當繩頭

處中脊骨上灸三十壯候復惡寒再灸三十壯至過
發一炊久雖飢勿食盡日此法神驗男左女右

外臺灸諭譖在肩膊內廉夾茅六椎下兩傍各三寸

寒後傷風故先寒後熱先傷風後傷寒故先熱後寒
亦名溫瘡夫瘡六七日但熱不寒者溫瘡也

千金常山湯

常山兩升

小麥合三升

淡竹葉一升

一握

水升半煮五合一日至七日兒一合為三服量加

鹿角末先發時服一錢

燒鼈甲灰酒服一錢七發時服并以火灸身

灸乳下一指三壯

瘡寒而後熱第十一

細新書

卷十七

二十一

手按之痛病者言噫嘻足太陽脉氣所發灸五壯主
液泡攀暴脉急引脅痛內心肺從項引至脊以下至
十二椎應手灸之立已熱病汗不出肩背寒熱症互
引身熱欬嗽上氣虛喘喘逆軌或肩甲內廉痛不可
俛仰眇季脇引少腹而脹痛兒食晦頭痛引頤瘡瘡

風

事物新書

卷十七

十九

寶鑑灸大指次指外

瘡先熱後寒第十

東氏云溫瘡得之冬中風寒寒藏骨髓至春陽氣大
發邪不能出遇大暑腦髓爍脉肉消釋腠理發泄因
用力邪與汗皆出此病藏于腎氣從內出陰虛而陽
盛則病表氣復反入入則陽虛陽虛則寒故先熱後
寒名溫瘡先寒後熱由夏傷暑汗大出腠理開發遇
夏氣滌滌之水寒寒藏腠理皮膚中秋氣傷于風則
病盛亦以時作名溫瘡夫寒陰氣也風陽氣也先傷

寒後傷風故先寒後熱先傷風後傷寒故先熱後寒
亦名溫瘡夫瘡六七日但熱不寒者溫瘡也

寒後傷風故先寒後熱先傷風後傷寒故先熱後寒
亦名溫瘡夫瘡六七日但熱不寒者溫瘡也

秋氣汗出遇風而發及浴水氣舍皮膚內衛氣并居

衛氣者晝日行陽此氣得陽如出得陰如內薄是以

日作間日作者謂氣之舍寫內薄于陰陽氣獨發陰

邪內着陰與陽爭不得出故

千金常山丸治癰瘡

常山 知母 甘草炙 大黃分三

麻黃去根節一兩

未蜜丸如桐子兒如黍三丸熱水下漸加差為度

活人書治癰先寒後熱兼治支結

幼幼新書 卷十七 廿二

柴胡八兩 各

人參炙 半夏次七

黃芩

桂去皮各三兩

卷十八 廿二

桂去皮各三兩

剉如麻豆炒五錢水一盞薑七片棗二個煎八分

溫服日三夜一渴去半夏加入參苦蔴根

癰瘡寒熱更作第十二

巢氏寒并于陰則寒風并于陽則熱陰陽二氣更竇

更虛故寒熱更往來為熱瘡

指迷論寒熱不時腸滿膨脹起則頭暈大便不通或

腹痛胃膈痞滿由宿穀不化結于腸間氣道不舒陰

陽交亂宜備急丸又云久不治成勞

荆芥散

荆芥 人參 白朮 當歸

黃耆

芍藥 桂去皮各半

柴胡二兩

大黃裹根紙一盞煎一盞溫服

當歸

桂去皮各半

柴胡二兩

粗末五錢水二盞煎一盞溫服

備急丸

大黃裹根紙巴豆霜

乾薑皮

等分細末蜜丸如豌豆米飲下一丸羸人一丸如

幼幼新書 卷十八 廿二

卷十九 廿二

桂去皮各半

大黃裹根紙

巴豆霜

乾薑皮

等分細末蜜丸如豌豆米飲下一丸羸人一丸如

幼幼新書 卷十九 廿二

卷二十 廿二

桂去皮各半

大黃裹根紙

巴豆霜

乾薑皮

瘡熱而不寒第十三

瘡熱而不寒第十三

卷二十 廿二

桂去皮各半

大黃裹根紙

巴豆霜

乾薑皮

瘡熱而不寒第十三

卷二十 廿二

桂去皮各半

大黃裹根紙

巴豆霜

乾薑皮

升麻一兩 生地黃三錢 蘭甲半錢 知母各半兩

剉水二盞半煎盞半不時分三服一日盡兒一合

又方

常山一錢 桃仁炒熟各半錢 黃丹炒紫各半錢 香豉炒一合

羅未蜜丸如桐子發日空心煎桃仁湯下十九錢

時再服兒粟大五丸

治瘧熱發瘧知母散

知母一錢 蘭甲醋炙各半兩 牡蠣各半錢 常山各半錢

細羅粥飲調半錢日二

幼幼新書

卷十七

廿三

牛黃丸

杏仁

等分研如膏練蜜丸麻子大溫水下三丸日三量

與

張漢知母丹

知母炒

鱠甲炙

川大黃炒

赤茯苓

朱砂飛各一兩 川苦硝一兩 川升麻各半錢 龍腦一錢

末蜜丸如黍服五七粒薑湯下大便利愈

活人書

知母六兩 糜米合二

剉麻豆大五錢水盞半煎八分服

癰寒而不熱第十四

董氏寒瘻由陰陽相并陽虛則陰勝而寒寒發于內而并于外內外俱寒故病發但戰慄皺額頤也

指迷論瘻寒從背起冷大如手不甚戰慄似欲熱而汗出或即頭痛嘔吐時作脈遲小由脾胃素弱因氣寒而收聚水穀不能剋化變而成瘻伏瘻在內陽為

初幼新書

卷十七

廿四

聖惠確黃丸

陰瘻

故陽作寒逼而成汗宜旋覆花丸半硫丸

確黃

硫黃

朱砂

桂心

乾薑生

巴豆煮去油

各一分

麝半

阿魏半

研細醋煮麵糊丸如桐子未發前綿裹一丸安耳

中男左女右帛繫一粒于臂可治七人

聖惠方

獨顆蒜一個

黃丹半

端午午時擣千杵丸如黑豆發時溫茶下二丸兒

甘草炙二 石膏一斤

桂去皮一

桂去皮半兩