

459

方 驗 祕

除 害 灭 病 专 輯

銅仁专区卫生科学研究所

5
4

銅仁专区人民出版社

全区卫生工作同志们：

专区中西医代表会议胜利闭幕了。~~在这次会议上~~代表們学习了省委召开的电话会议传达中共中央四 ~~防字~~ ~~六~~ 组“上海会议”的精神，并討論制定了我区除害滅病的一年半规划。这个跃进规划，明确的提出了在61年春季在全区范围内滅尽“八害”、“五病”，提前一年半达到中央除害灭病七年规划指标。除害灭病运动各地已经广泛展开。根据规划要求今冬明春将进一步結合兴修水利和积肥运动大规模开展。为适应当前需要，茲將到会代表献方中之有关除害灭病部分，交由专区卫生科学研究所整理印發給你們参考。以促进运动的深入开展。試用时務須灵活掌握，取得經驗应及时告知我局，以資交流推廣。

銅仁专員公署文教局

1959年11月21日

目 录

除八害部分

- 一、消灭老鼠方..... (1)
- 二、消灭麻雀方..... (1)
 附：消灭鼠雀方使用注意事项..... (2)
- 三、消灭蚊子方..... (3)
- 四、消灭蒼蝇方..... (4)
 附：消灭蚊蝇方使用注意事项..... (5)
- 五、消灭蟑螂方..... (5)
- 六、消灭虱子方..... (5)
- 七、消灭跳蚤方..... (6)
- 八、消灭臭虫方..... (6)

滅五病部分

- 一、消灭瘧疾方..... (7)
- 二、消灭鈎虫方..... (10)
- 三、消灭絲虫方..... (14)
- 四、消灭性病(現症梅毒)方..... (19)
- 五、消灭新生儿破伤方..... (23)

消 灭 老 鼠 方

- 一、处方： 狼毒 藤黄 陀参
用法： 共制成粉末和食物拌合毒鼠。
- 二、处方： 信石（即砒霜或人言） 岩馬桑子
用法： 共碾成細末加米面一半，搓成丸，可毒死鼠雀。
陳世珍
- 三、处方： 信石 牛油 米
用法： 共煮熟，搓成丸，晒干，鼠雀吃之即死。
- 四、处方： 信石 米
用法： 碾成粉，成丸，老鼠吃之即死。
- 五、处方： 信石 草烏
用法： 共碾成細末和飯拌合晒干可用。用时周圍撒些谷壳，誘鼠吃后即毒死。
甘克明
- 六、处方： 信石
用法： 碾成細末与食物拌勻即可。
楊秀森

消 灭 麻 雀 方

- 一、处方： 川烏 草烏 生半夏 生南星
馬前子 狼毒等量

用法：加水煨，用此葯水泡米半天，取出此米晒干，即可毒死雀鼠。

左自強

二、处方：馬前子

用法：用水煨軟，取出切成片，再用原水煨，用此葯水泡米半天，用此米即可毒殺麻雀。

三、处方：岩棕 信石

用法：岩棕用酒蒸后，晒干，碾成粉，加上信石粉，用食物拌勻制成丸，毒殺麻雀。

四、处方：翻天印 草烏 馬桑叶 岩馬桑

用法：上葯与食物同煮兩小时后取出，撒在土里种子窩周圍或落雪時撒在土地面上，誘雀毒殺之。

龙治華

五、处方：藜芦

用法：用酒泡，再用此酒泡米，取出来晒干，即可誘殺麻雀。

六、处方：人言 陀參

用法：上葯碾成粉和飯拌好，雀鳥食之即死。

消灭鼠雀注意事項

一、毒殺鼠雀的食物毒性很大，誤食要中毒，重者甚至會危及性命。因此，在开展灭鼠雀运动中，切勿让小孩或鷄鴨誤食。

二、用葯毒殺獲得之鼠雀，决不能食用。亦不能随地亂拋，必須挖坑掩埋，保証安全衛生。

三、毒鼠雀方內过去一般需用大米拌合以誘食。我們应积极响应節約糧食的号召，开动腦筋，利用其他食物代之。

四、放毒鼠葯時，須用碎瓦片一小块，上放米糠，中按成

小窩，窩中放藥丸一粒或二粒；放毒雀藥時，亦須用康壳撒在篩內，此謂先誘之而后殺之。

消 滅 蚊 子 方

- 一、处方：青浮萍四兩 六六六或滴滴涕四兩
用法：混合后与谷壳放在盆內烟熏，熏时必须將室內衣服和食物搬出，熏时緊关門窗，并糊好窗洞，一小時後室內所有蚊子均可被熏滅。
楊科長
- 二、处方：鱧魚骨（即黃鱧骨）
用法：碾成細末加入蚊烟香內烟熏，即可滅蚊。
- 三、处方：六六六四兩 青浮萍四兩
用法：晒干放入火盆內，放一層青浮萍，放一層六六六粉，同时上下各放一層木屑或谷壳糠，燒烟熏之。
- 四、处方：雄黃 硫磺 艾叶 茶油枯
用法：拌木屑燒烟熏室內，即可滅蚊。
何伯勳
- 五、处方：桐子花
用法：放在雜草內燒烟熏能滅蚊。
- 六、處方：矿子石灰（即新出窑的）
用法：配水洒在水溝或潮湿的地方可滅子了，洒在廁所里可滅蛆。

消 灭 蒼 蠅 方

- 一、处方：蚊烟香的灰。
用法：放入米湯內加點糖調勻，蒼蠅吃后即可毒死。
- 二、处方：滴滴涕 紅浮萍
用法：以上两种与木屑或谷糠燒烟熏，可滅蠅、滅蚊。
- 三、处方：馬桑叶 麻柳叶 野棉花 苦楝子叶
用法：捶烂倒入廁所內可以灭蛆。

何伯勸

- 四、處方：紅籐 打破碗花 岩斑棕 岩馬桑
用法：打碎后放在糞坑內，24小时糞蛆即死。

龙治華

- 五、處方：打破碗花
用法：200担糞坑內加25斤可滅蛆。
- 六、处方：茶油枯一斤 鮮麻柳叶五斤
用法：先将茶油枯碾成細末，用桶装好，加入少許开水，待其发酵，麻柳叶煮水10斤与发酵之油枯粉調勻，洒在糞坑周圍土地上及孑孓孳生場所，可滅蠅蛆和孑孓。

楊紹光

- 七、处方：蚊烟草10斤 桐子花半斤 地瓜花四兩
用法：晒干，共碾成細末，做成小根蚊烟香，烟熏室內外和园林中，可滅蚊。此药毒性最大，熏时須將食物藏好。

楊紹光

八、处方： 黄柏一斤 野棉花五斤

用法： 共煮 20 斤水，洒於水沟等处可滅孑孓，洒於室内可滅跳蚤蠅虱等。

楊紹光

消灭蚊蝇注意事项

一、室内烧烟熏时，应特别注意防火。

二、烧烟熏时房屋四壁门窗应密封。室内箱櫃縫隙務須用厚紙封好，勿使通氣。或将衣物搬移室外，免受损坏。食物亦須取出，預防中毒。

消灭蟑螂方

处方： 蚊烟香燃后的灰

用法： 放入米湯內加點糖調勻，可毒殺蟑螂。

消灭虱子方

一、处方： 白果一兩 百部一兩

用法： 碾成細末，加水調成糊用來洗衣，可以滅虱。

邵星明

二、处方： 百部一兩

用法： 煮水 5 斤，用此水洗衣可滅虱。

代義高

消 灭 跳 蚤 方

一、处方：樟腦三錢 信石三錢 鱔魚骨一兩

用法：共碾成細末包放簾下，永無跳蚤。

邵星明

二、处方：广子石灰（即新石灰）

用法：加水調勻，沉淀后洒在房內地板上、床下及一切孳生場所，可滅跳蚤。

消 灭 臭 虫 方

一、处方：野棉花子 硫磺

用法：燒烟熏床下即滅。

邵星明

二、处方：紅浮萍

用法：燒烟熏床下。

三、處方：松針 紅浮萍

用法：燒烟熏床下。

四、处方：紅浮萍 苦楝子叶 海椒

用法：放在火盆內燒烟熏床下。

龙治華

五、处方：紅浮萍 虫木花

用法：混合放在火盆內燒烟熏。

六、处方：

紅浮萍

用法：

碾成粉撒上海水，放在床鋪板上即可滅臭虫。

万亲仁

消 灭 疟 疾 方

一、处方：

柴胡四錢

法下三錢

台參三錢

黃芩三錢

草菓三錢

甘草二錢

用法：

煎水服。

符功膜

二、处方：

野棉花根皮

用法：

用野棉花根皮煨水，待藥水开后，將鸡蛋壳稍打碎，放进同煨，成人吃三个，小兒吃一个即癒。

李国江

三、处方：

宝飲中湯：常山二錢 正樸二錢 青皮二錢
檳榔二錢 草菓仁二錢 陳皮二錢 甘草一錢

用法：

白开水熬一小时，冷后吃以防嘔吐，空服一劑即癒，孕妇禁服。

四、处方：

柴胡三錢

黃芩二錢

茯苓二錢

半夏二錢

猪苓二錢

桂枝二錢

路參二錢

澤泻二錢

白朮二錢

生姜三片

紅棗三个作引

用法：

煎水服。

艾重光

五、处方：

甲珠二錢

用法： 碾碎冲酒服即癒。

艾重光

六、处方： 常山三錢

用法： 煎濃冲酒服即癒。

七、处方： 常山三錢 草薺二錢 法下二錢 陈皮一錢
山楂二錢 青皮一錢 檳榔一錢 厚樸一錢
甘草五分 生姜三片作引

用法： 煎水服。

艾重光

八、处方： 蒼朮三錢 均姜二錢 白朮二錢
茯苓二錢 粉草五分 陈皮五分
丁香八分 姜棗作引

用法： 煎水服。

九、处方： 石燕五錢 黃芩三錢 知母二錢
胆草二錢 枝仁二錢 大黃二錢
黃柏末二錢 川連五分 粉草五分

用法： 煎水服，治溫症。

艾重光

十、处方： 鱉甲一兩

用法： 紅灰燒香碾成粉末，冲酒服即癒。

艾重光

十一、处方： 青皮 郎片各三錢 半夏二錢
茯苓二錢 川樸二錢 黃芩二錢
草薺二錢 白朮二錢 粉草一錢半
姜棗作引

用法： 煎水服。

艾重光

十二、处方：胡桃肉二个 大蒜一个
用法：共捶烂，用消毒的空针在手腕关节刺7个小孔，然后用此藥包刺孔处。

何会文

十三、处方：常山四錢 草菓一錢半 云苓三錢
肉桂一錢 檳榔二錢 甘草一錢
黑豆三錢（若無此藥可用烏梅肉三錢）
柴胡三錢（体弱者用二錢）

用法：煎水服。

李顯榮

十四、处方：常山一兩 龟板五錢 別甲五錢
檳榔三錢 柴胡六錢
用法：共碾粉做成丸，每丸一錢，每次空腹5丸。

李顯榮

十五、处方：生常山一錢半 厚樸二錢 青皮二錢
甘草二錢 柳片三錢 草菓仁三錢
用法：煎水留明晨5时冷服。

李国江

十六、处方：遇仙丹：生軍六兩 檳榔三兩 三稜三兩
荆芥三錢 黑丑三兩 广香二兩
粉草一兩

用法：制成丸，每丸一錢，發症日清晨溫水服，三丸即癒。此方治症特效，服後以米湯补之，禁吃生冷魚腥麵食數日。孕婦禁服。此方治脾脏肿大者較有效。

万亲仁

十七、处方：常山五錢 草菓仁二錢

用法：煎水服。

十八、处方：桂枝白虎湯

用法：煎水服，发作为用。

曾恆三

十九、处方：常山四錢 草薢仁一錢半炒 云苓三錢
狼毒一錢 甘草一錢 黑豆三錢（無有可
改用烏梅） 柴胡三錢 花片二錢

用法：煎水服。

曾恆三

二十、处方：常山一兩 龟板五錢 別甲五錢
花片三錢 柴胡六錢

用法：碾末水洒为丸，早晚各服二錢半。

曾恆三

消灭钩虫病方

一、处方：地肤子二兩 蛇床子二兩

用法：煎水服之可预防。

張羽揚

二、处方：檳榔三錢 川椒一錢 烏梅四錢

用法：煎水服，每日二次，共服二劑。

宋文釗

三、处方：头发灰

用法：先吃香物，待10分鐘再用两个鸡蛋和头发灰調匀用油炒后服。

鄒科长

四、处方： 榧子（去壳）半斤 活虱四兩 冰糖半斤
 佇株米根半斤

用法： 共碾細末，再与糯米粉一兩調勻，开水混合做成丸，每日服3次，每次服三錢，用开水吞下。

五、处方： 當归 郎片 茯苓 陳皮各三錢
 雷丸 大黃各四錢 巴豆五錢
 川芎一錢半 烏梅五个 芹菜7根

用法： 煎水服。上方大黃、巴豆須根据病情不可亂用
 李国江

六、处方： 地肤子二兩 蛇床子二兩

用法： 煎一斤水，可供10人服。

張羽揚

七、处方： 榧子半斤 檳榔半斤 活虱四兩
 糯米麪一斤（炒熟） 佇株米根3斤

用法： 碾細成丸，每人每天飯前服三錢，連服三天見效。

張羽揚

八、处方： 檳榔三錢 川椒一錢 烏梅四錢

用法： 煎水服二劑，每天早晚各一次。

宋文釗

九、处方： 當歸三錢 郎片三錢 茯苓三錢 陳皮三錢
 雷丸四錢 大黃二錢 烏梅五枚
 巴豆霜一錢半 芹菜7—9根

用法： 煎水服。上藥亦可加花生五錢，做成丸子內服。

十、处方： 白朮五錢 當歸四錢 木別子二錢
花柳二錢 雷丸二錢 榧子二錢
石榴壳二錢 大楓子一錢 庄黃一錢
甘草一錢 君子四錢

用法： 煎水服，对馬尿为引。

吳啓強

十一、处方： 皂凡（炒变赤色） 明雄四兩 大黃四兩
雷丸四兩

用法： 細末成麵，成人每天服一兩，分三次服，小兒酌減。

毛文仲

十二、处方： 當歸 陳皮 花柳 烏梅

用法： 煎水服。

十三、处方： 榧子二錢 大楓子（退壳）一錢
木別子一錢 皂角一錢

用法： 共礱为末，做成丸，用白麵五錢化水穿衣，每丸如綠豆大，每日二次，每次2至3片，連服二日，飯前服。

刘長壽

十四、处方： 貫众五錢 土荆芥五錢 川連五錢
柏楊樹皮三錢 番木別（去壳）三錢

用法： 煎水服。上藥为三日量，每次15—30毫升，一日三次。

雷大炳

十五、处方： 貫众湯加 木香三錢 只壳三錢
白部三錢 川椒一錢

用法：煎水，一日三次溫服。

李顯榮

十六、处方：貫眾五錢 鶴虱五錢 雷丸三錢
花片三錢 木別子三錢 荊芥三錢
君子（連壳）五錢 山紫蘇五錢

用法：加二大碗水煎成大半碗藥湯，上午6時下午9時各服一次。

李國江

十七、处方：貫眾湯加 陳皮二錢 川楝子4至5个
用法：煎服2至3劑。

十八、处方：苦楝子皮五錢 柴胡四錢 荊芥三錢
用法：煎水服。

十九、处方：當歸三錢 花片三錢 腹毛三錢
陳皮三錢 大黃四錢 巴豆霜五錢
雷丸四錢 芹菜作引

用法：作成黃豆大丸子，每次3至5粒，一日二次。
大黃巴豆酌病情用。

曾恆三

二十、处方：烏梅三錢 党參三錢 檳榔三錢
當歸三錢 黃柏一錢 芍藥一錢
細辛一錢 黃芩一錢

用法：煎水服，成人一碗，小兒一杯。

黃依全

二十一、处方：丑牛粉二錢 檳榔二錢

用法：煎雞蛋服，小兒減半。

劉長壽

二十二、处方：巴豆（去油）一斤 大黃一斤

雷丸半斤 楊柏樹皮一斤

用法：碾成粉末，做成丸如綠豆大，成人每日4—6个，小兒減半，夜間鸡叫冷开水服。

左自強

消 灭 絲 虫 病 方

一、处方：大腹皮五錢 茯苓皮四錢 戶陳皮三錢
桑白皮二錢 生姜皮五分

用法：煎水服。如头浮腫加秦艽二錢，苏叶二錢，腹
脹加郎片二錢，炒二丑三錢，如單腫脚加木通
二錢，防己三錢，炒赤小豆三錢。不能吃生冷
食物。

游志安

二、处方：糯稻根五斤 魚鳔串五斤 川棟子皮五斤
用法：煎水服。水三斤，濃縮一斤，一日二次，每次
五錢，三日即癒。

張羽揚

三、处方：薄荷三錢 金銀花三錢 烏梅三錢
骨皮三錢 丹皮三錢 生地三錢
黃連二錢 虫脫二錢 紅花二錢
白石英五錢 黃芪五錢 天麻四錢
通草作引

用法：煎水服2至3剂。

李国江