

普濟方

第八冊

婦人

(卷三一六至卷三五七)

明朱橚等編

人民衛生出版社

普 濟 方

第 八 冊

婦 人

(卷三一六至卷三五七)

明 朱 權 等 編

人 民 衛 生 出 版 社

一 九 五 九 年 · 北 京

醫 濟 方

第 八 冊

婦 人

(卷三一六至卷三五七)

開本：850×1168/32 印張：34 1/2 插頁：4 字數：954千字

明 朱 櫛 等 編

人 民 衛 生 出 版 社 出 版

(北京書刊出版業營業許可證出字第〇四六號)

·北京崇文區錢子胡同三十六號·

农 业 杂 志 社 印 刷 厂 印 刷

新华书店科技发行所发行·各地新华书店經售

統一書號：14048·1589

定 價：5.50 元

1959年10月第1版—第1次印刷

(北京版)印數：1—2,000

出版者的話

本書是明代周定王朱櫨所編“普濟方”的婦科部分，原卷次爲316—357卷。內分婦人諸疾、妊娠諸疾、產後諸疾、產難等四門。其主要內容，除了介紹一般婦科常見疾病外，對於中醫婦科四大症——胎、產、經、帶的療法，作了比較全面的敘述，因此，可供中醫婦科療法的參考。

茲因全書卷帙浩大，特按科別予以分釘，以便讀者選購；但爲照顧全書的完整性和各科分類的獨立性，凡有關全書的校勘情況，除了詳見第一冊“出版說明”外，今將本科的必要說明，簡述如下：

1. 本書是據四庫抄本排印的。
2. 本書除了採用二種四庫抄本進行互校外，並部分核對了明、永樂殘刻本和明抄殘卷。其中有一部分藥用量，四庫本與明刻本有異，爲了留供參考，概予并存。凡引據明刻增入的藥用量，加上括弧，以資區別。
3. 本書據本，因係抄本，其中有關本科附圖，原屬輾轉描繪，有失其真，故予刪除。

婦人目次

卷三百十六 婦人諸疾門

中風附論	1
中風口噤附論	14
中風角弓反張附論	16
中風偏枯附論	19

卷三百十七 婦人諸疾門

風痺手足不遂附論	24
風眩頭痛附論	27
風瘙癢疹附論	35
風瘙痒附論	37
風邪顛狂附論	39
血風煩悶附論	43

卷三百十八 婦人諸疾門

血風體痛附論	47
血風走注附論	52
血風驚悸附論	58
血風攻脾胃不能食附論	62
傷寒附論	63
熱入血室附論	70
霍亂附論	73

卷三百十九 婦人諸疾門

客熱附論	76
寒熱附論	77
諸勞	79
勞瘵附論	80
熱勞附論	85
冷勞附論	89
骨蒸附論	92
飛尸血厥附論	97
鼻衄附論	98

卷三百二十 婦人諸疾門

吐血附論	102
咳嗽附論	106
痰飲附論	112
風痰附論	114
喘滿附論	116
嘔吐附論	119
心腹脹滿附論	123
兩脅脹痛附論	126

卷三百二十一 婦人諸疾門

淋瀝附論	129
小便出血附論	132
小便不通附論	135
脬轉附論	137
小便數附論	139
遺失不禁附論	140
大便不通附論	141
痔附論	144
腸風下血附論	146
脫肛附論	149
泄瀉附論	149
下痢附論	152

卷三百二十二 婦人諸疾門

虛損附論	158
------	-----

卷三百二十三 婦人諸疾門

血風勞氣附論	171
風虛勞冷附論	183
與鬼交通附論	188

卷三百二十四 婦人諸疾門

積聚附論	191
------	-----

癥瘕積聚附論	197	卷三百三十三 婦人諸疾門	月水不通附論	420
癥瘕附論	201		月水不通腹臍積聚附論	446
八瘕附論	203		月水不通腹內癥塊附論	449
食癥附論	209		卷三百三十四 婦人諸疾門	
血癥附論	211		月水不利附論	456
疝瘕附論	216		月水不斷附論	464
癥痞附論	218		月水來腹痛附論	474
卷三百二十五 婦人諸疾門		卷三百三十五 婦人諸疾門		
血積氣痛附論	221		血氣心腹疼痛附論	482
瘀血附論	225		血氣小腹疼痛附論	497
痰癖附論	229		血分水腫滿附論	501
乳癰附論	234		卷三百三十六 妊娠諸疾門	
妬乳附論	252		胤嗣附論	508
卷三百二十六 婦人諸疾門			妊娠附論	524
脚氣附論	254		便產須知	528
腰脚疼痛附論	258		卷三百三十七 妊娠諸疾門	
腰痛附論	260		養胎胎教附論	532
下部諸疾附論	261		轉女爲男附論	547
卷三百二十七 婦人諸疾門			惡阻附論	548
雜病附論	275		卷三百三十八 妊娠諸疾門	
卷三百二十八 婦人諸疾門			子煩附論	560
雜病	298		子淋附論	563
卷三百二十九 婦人諸疾門			心腹痛附論	566
崩中漏下附論	319		中惡心腹痛附論	577
卷三百三十 婦人諸疾門			心腹脹滿附論	578
崩中漏下	342		身體腫脹附論	581
血暴下兼帶下附論	356		腰痛附論	585
卷三百三十一 婦人諸疾門			卷三百三十九 妊娠諸疾門	
赤白帶下附論	364		中風附論	589
赤白濁附論	389		傷寒附論	596
卷三百三十二 婦人諸疾門			卷三百四十 妊娠諸疾門	
總論	391		熱病附論	608
月水不調附論	394			

時氣附論 611

煩渴附論 613

霍亂吐瀉附論 615

下痢附論 617

大小便秘瀉附論 623

卷三百四十一 妊娠諸疾門

大便不通附論 627

小便不通附論 628

遺失不禁附論 631

瘧疾附論 632

頭目旋暈附論 635

痰逆不思食附論 636

嘔逆不下食附論 637

咳嗽喘急附論 641

痰飲附論 644

妊娠諸瘧附論 647

卷三百四十二 妊娠諸疾門

安胎附論 650

胎驚附論 667

損胎附論 670

胎冷附論 672

漏胎附論 672

卷三百四十三 妊娠諸疾門

滑胎附論 677

鬼胎附論 681

下胎附論 682

半產附論 785

墮胎附論 688

墮胎後衣不出附論 692

墮胎後血不出附論 694

墮胎後血出不止附論 696

卷三百四十四 妊娠諸疾門

諸血附論 699

坐月方位圖并產婦須
知法附論 709

月空方位 712

逐月安產藏衣忌向方位 712

安產藏衣十三神吉凶方位 713

安床帳藏衣及藏織物法 713

十二月產圖 714

推婦人行年法第一 714

產婦推行年法（十三歲至
四十九歲） 714

入月預備藥物 720

產婦雜要物 720

入月安產圖 721

推日遊法 722

逐日產母生子宜向方 722

逐日日遊神 722

體玄子借地法 722

產婦衣色及首指并起日法 722

釀謝法 723

禁草法 723

日曆法 723

安置產婦法 724

胎殺避忌產前將護法 725

月遊胎殺 725

十干日遊胎殺 725

十二支日遊胎殺 725

六甲旬遊胎殺 725

孕婦藥忌歌 725

禁水法 726

產前將護法 726

產後將護法 726

卷三百四十五 產後諸疾門

產後諸疾附論 727

產後調補附論 741

產後惡露不下附論 747

卷三百四十六 產後諸疾門

產後惡露不盡腹痛附論 751

產後惡露不絕附論 763

產後乳無汗下乳附論 773

產後妬乳附論 783

卷三百四十七 產後諸疾門

吹乳附論 787

產後乳結核附論 793

產後乳結癰附論 795

產後悶煩附論 800

產後煩渴附論 806

卷三百四十八 產後諸疾門

產後血暈附論 808

產後血暈氣攻腹痛附論 826

卷三百四十九 產後諸疾門

產後惡血衝心附論 834

產後積聚癥塊附論 837

產後血風血虛浮腫附論 843

產後兒枕腹痛附論 849

產後羸勞附論 852

產後血邪攻心狂語附論 858

卷三百五十 產後諸疾門

中風附論 861

中風口喎附論 873

中風口噤附論 874

中風筋脈攣急附論 877

中風角弓反張附論 879

中風偏枯附論 882

中風恍惚附論 883

風虛勞損附論 885

卷三百五十一 產後諸疾門

語言妄亂附論 889

頭痛附論 890

心腹痛附論 895

心痛附論 897

腹痛附論 899

兩脅脹滿附論 906

身體腰脚疼痛附論 908

卷三百五十二 產後諸疾門

崩中漏下附論 913

月水不通附論 918

月水不調附論 921

血瘦附論 923

血塊攻築疼痛附論 927

虛羸附論 930

卷三百五十三 產後諸疾門

虛汗附論 943

虛熱附論 947

虛渴附論 949

心虛驚悸附論 953

傷寒附論 958

卷三百五十四 產後諸疾門

寒熱附論 965

瘧疾附論 967

大小便秘澀附論 970

大便不通附論 974

小便不通附論 978

淋瀝附論 980

治產後小便血附論 983

小便頻數不禁附論 984

卷三百五十五 產後諸疾門

咳嗽附論 987

咳逆附論 990

霍亂附論 991

嘔吐附論	905	總論	1035
喘促附論	909	產難附論	1039
短氣附論	1001	數日不產附論	1059
泄瀉附論	1003	逆產附論	1062
下痢附論	1006	卷三百五十七 產難門	
陰脫附論	1020	橫產附論	1066
不語附論	1023	產難子死腹中附論	1068
乍見鬼神附論	1023	胞衣不出附論	1079
諸疾	1024	盤腸產附論	1088
卷三百五十六 產難門		催生附論	109

普濟方卷三百十六

婦人諸疾門

中風附論

夫中風者。虛風中於人也。風是四時八方之氣。常以冬至之日。自坎而起。候其八方之風。從其鄉來者。主長養萬物。若不從其鄉來者。名爲虛風。賊害萬物。人體虛者則中之。當時雖不即發。停在肌膚。後或重傷於風。前後重沓。因體虛則發。人腑臟俞皆在背中。風多從俞入。隨所中之俞而發病。婦人血氣虛損。故令中風也。當察口眼開闔。以別重輕。涎沫有無。以明證治。如眼開口閉。手足不開。涎不作聲者可治。如眼閉口開。聲如鼾睡。遺尿者死。風中之人。虛微則中微。虛甚則中甚。其候或心中恍惚。精神悶亂。或暴不知人。涎液不收。或口眼喎斜。或語言謇澀。或身體強直。或肢體不利。皆中風之證也。

凡中風角弓反張。風痺手足不隨。偏枯口噤。口眼喎斜。風眩頭痛。血風心神驚悸癡狂。骨節疼痛。血風走注瘙癢癰疹。風痰脚氣腰痛。諸疾要先察脈之虛實。辨證之冷熱。相人之強弱。入臟入腑。在經在絡。而施治大抵先宜順氣。然後治風。萬不失一。蓋有中風、中寒、中暈、中痰、中氣。皆能令人涎潮昏塞。如中風若作中氣治之。十愈八九。中氣若作中風治之。十無一生。所以疑惑之間。不問中風中氣。首以蘇合香丸、五積散加麝煎。如中痰則有參蘇飲。如中寒則有理中湯。如中暈則有白虎湯。如的然見得是中風。加三生飲、木香煮散、排風、續命、風引、大小竹瀝、大八風湯、至寶丹、牛黃清心丸。辨其冷熱虛實而投之。未有不安者也。然此疾積襲之久。非一日所能致。令人服藥三五服。便責無效。其責醫者亦速矣。正宜大劑久服。古有其效。尋古治中風方。續命、排風、越婢等悉能除去。而千金多黃。令人不得慮。虛凡以風邪不得汗則不能盡泄也。然此治中爲宜。若治自汗者更用麻黃。則津液轉使脫泄。反爲害大。

中風自汗。仲景雖處以桂枝湯。至於不住發搐。口眼嚙動。遍身汗出。豈勝對治。當此之時。獨活湯、續命煮散、復榮衛。却風邪不可闕也。

夫婦人臂痛。筋脈攣急。不能屈伸。遇寒則劇。由肝虛爲風寒邪氣流於血脈。客於經絡。搏於筋。筋不榮則乾急而痛。其脈緊細。宜服栝子仁丸、舒經湯。若臂痛不能舉。或左或右。時復轉移一臂。由中腕伏痰。脾氣滯而不行。上與氣相搏。四肢皆屬於脾。脾氣滯而氣不下。上攻於臂故痛。其脈沉細。宜服茯苓丸、控涎丹。脾脈絡胃。夾咽連舌本。散舌下。心之別脈系舌本。今心脾二臟受風邪。故舌強不得語也。喉嚨者。氣之所以上下也。會厭者。音聲之戶。舌者。聲之機。唇者。聲之扇。風寒客於會厭之間。故卒然無音。皆由風邪所傷。故謂之中風。失音不語。經云。醉臥當風。使人發瘡。宜服神仙解語丹。偏風口喎者。是體虛受風。風入於夾口之筋也。足陽明之筋。上夾於口。其筋偏虛。風因虛而乘之。使其筋偏急不調。故令口喎僻也。

方

木香煮散出大全良方 治左癱右瘓。并素有風濕。諸藥不效。常服調氣進食寬中。

羌活 麻黃去節各一兩 防風三分 白朮 陳皮 黑附子炮 草豆蔻連皮煨 杏仁去皮尖麸炒 南木香 檳榔 牛膝 川烏炮 人參 白茯苓 川芎 當歸 甘草 桂心各半兩 右咬咀每服四錢重。水一大盞半。生薑五片。煎至八分。去滓熱服。大便不通加大黃心腹脹加葶藶、滑石。膈上壅滯。咳嗽氣促加半夏、川升麻、天門冬、知母。

繆安人年六十五六。忽然中風。不省人事。無汗有痰。已辦後事。衆醫以爲不可治也。召僕診之。六脈浮溢關。此真風脈也。先投參蘇飲六服。先寬氣下痰。次以木香煮散而愈。又享十年之壽。

牛黃散出聖惠方 治婦人中風。精神冒昧。舉體不仁。心胸不利。疾狀如醉。

牛黃半兩細研 龍腦一分細研 硃砂一兩細研 雄黃半兩細研 麝香細研 蟬殼一分 天南星一分炮裂 白附子半兩炮裂 側子半兩炮裂

蛇肉一兩酒浸炙微黃 白僵蠶一分微炒 桑螵蛸一分微炒 芎藭一分 防風半兩去蘆頭 羚羊角屑半兩 赤箭半兩 紫葛半兩剉 乾蝎一分微炒 甘菊花一分 犀角屑半兩 麻黃半兩去根節 蔓荊子一分 天竺黃一分細研 茵芋半兩 牛膝半兩去苗 當歸半兩 藁本一分 右搗細羅爲散。入研了藥都研令勻。每服不計時候。以薄荷溫酒調下二錢。

龍腦散出聖惠方 治婦人中風。身強口噤。四肢不利。言語謇澀。神昏憤。

龍腦 牛黃 雄黃細研 鉛霜各三分 鐵粉一兩 硃砂一兩 麝香三分已上各細研 天南星半兩炮裂 天麻一兩 麻黃一兩去節 莽草三分 白僵蠶半兩微炒 乾蝎半兩微炒 白附子半兩炮裂 桂心半兩 烏蛇肉一兩酒拌炒黃 防風半兩去蘆頭 栝子仁半兩 蟬壳半兩微炒 獨活半兩 白膠香半兩 仙靈脾半兩 天雄半兩炮裂去皮臍 桑螵蛸半兩微炒 羚羊角屑半兩 甘草半兩炙微剉 阿膠三分搗碎炒黃燥 右搗細羅爲散。入研了藥令勻。每服不計時候。以薄荷酒下一錢。

保安丸一名靈蠶丸出御藥院方 治婦人產前產後三十六種冷血風。半身不遂。手脚疼痛諸疾。并宜服之。

赤茯苓去黑皮 白芍藥 牡丹皮各二分 吳茱萸 沉香各一分 人參去蘆頭 桂去粗皮 當歸洗切焙 牛膝酒浸 吳白芷 木香 藁本去蘆 麻黃去根節 川芎 細辛揀淨 黑附子炮去皮臍 蘭香葉炙剉 甘草炙剉 寒水石煨 防風去蘆 桔梗去蘆頭 蟬殼去足翅各半兩 馬鳴退炙 生乾地黃各一兩 右爲末。煉蜜和丸如小彈子大。每日空心用溫酒化下一丸。療八風十二痺。癱瘓中風血淋積聚。并治胎不安。子死腹中。不過三丸生下死胎。胎衣不出。一丸便出。產前產後痢。并赤白帶下。并嘔逆填心。痰氣煩滿。一丸瘥。產前產後。腹中疝痛邊臍下。如刀刺相似者。一丸便止。入臨月便一旦一丸。至產下不覺疼痛。產前傷寒中風。體如板者。以熱煎麻黃湯化下一丸立效。經脈不通。或頻併來。或赤白帶下。吃食無味嘔惡。乍寒乍熱。面赤唇焦。手足煩疼。遍身黑點。生血斑者。一切并服此藥悉愈。每服一丸。細嚼空心溫酒下。

烏犀散出聖惠方 治婦人中風。筋脈攣急。四肢疼。不能行履。神思昏悶。言語謇澀。

烏犀角屑一兩 赤箭三分 附子三分炮裂去皮臍 羌活三分 防風三分
去蘆頭 芎藭三分 羚羊角屑三分 獨活三分 牛膝三分去苗 五加皮三分 黃
芪半兩到 赤茯苓半兩 麻黃半兩去根節 赤芍藥半兩 細辛半兩 當歸三分
剉微炒 枳殼半兩麸炒微黃去蠟 生乾地黄一兩 道人頭一兩 甘草一分炙微
赤剉 酸棗仁三分微炒 桂心三分 右件藥擣篩爲散。每服四錢。水酒各
半中盞。生薑半分。薄荷三七葉。煎至六分。去滓。不拘時候溫服。

丹砂丸出聖惠方 治婦人中風。心神冒悶。言語謇澀。四肢拘急。
口眼喎斜。

辰綿砂一兩細研水飛過 牛黃一分 雄黃一分 龍腦一分 西甘石半兩
麝香一分 天竺黃一分 鉛霜一分已上并細研 犀角屑半兩 天麻半兩 羚羊
角屑半兩 烏蛇肉酒拌炒黃 乾蝸各半兩微炒 桑螵蛸微炒 白附子炮裂 香
附子 獨活 麻黃去根節 防風去蘆頭各半兩 狐肝半具炙令黃燥 右爲末。
入研了藥令勻。煉蜜和擣三五百杵。丸如梧桐子大。每服不計時候。
豆淋酒下七丸。

牛黃散出聖濟總錄 治婦人中風。身強口噤。四肢不利。精神昏
冒。形如醉人。

牛黃研一分 麝香研一錢 雄黃研一分 鉛霜研一分 丹砂研 天南星炮
裂 天麻浸酒炙乾 白附子各半兩炮 麻黃去根節煎掠去沫焙 桂去粗皮 白僵
蠶炒 乾蝸去土炒 防風去蘆頭 獨活去蘆頭 羌活去蘆頭 附子炮裂去皮臍
當歸切炒各一兩 右除研藥外。擣羅爲散。入研藥再研勻。每服一錢。
生薑薄荷酒調下。不拘時候。日三服。

天雄湯出聖濟總錄 治婦人中風。筋脈拘急。肢體疼痛。言語不
利。精神冒悶。

天雄炮裂去皮臍 前胡去蘆頭 芎藭 枳殼去蠟麸炒 細辛去苗葉 黃
芩去黑心 茯神去末 羌活去蘆頭 獨活去蘆頭 防風去叉 桂去粗皮 甘草炙
麻黃去根節煎掠去沫焙 芍藥各一兩 右剉如麻豆。每服三錢。水一盞煎
至七分。去滓溫服。日三。

羚羊角湯出聖濟總錄 治婦人中風。筋脈攣急。肢體疼痛。行履
艱難。神思昏冒。語言不利。

羚羊角銜一分 芍藥 枳殼去蠟麸炒 生乾地黄焙 當歸切焙 桂去粗皮

麻黃去根節煎掠去沫焙 黃耆剉 五加皮剉 牛膝酒浸切焙 獨活去蘆 羌活去蘆頭 附子炮裂去皮臍 防風去叉各一兩 酸棗仁 白殭蠶炒 白附子各半兩 右剉如麻豆。每服三錢。水一盞。生薑三片。薄荷五葉。煎七分。去滓溫服。

羌活散 出聖惠方 治婦人中風。筋脈拘急。肢節痠疼。言語謇澀。頭目不利。

羌活去蘆頭 天麻酒浸焙乾 芎藭 蔓荊子去皮 羚羊角銹 白附子 桂去粗皮 薏苡仁 栝子仁研如膏 牛膝酒浸切焙 烏蛇肉酒浸去皮炒骨炙 當歸切焙各一兩 蟬退炒一分 麝香研一錢 酸棗仁研半兩 右除麝香外。搗羅爲散。入麝香研令勻。每服一錢。豆淋酒調下。日三服。

附子散 出聖惠方 治婦人中風。筋脈拘急。四肢疼痛。言語謇澀。心胸不利。

附子三分炮裂去皮臍 當歸一兩剉微炒 芎藭一兩 前胡一兩去蘆頭 枳殼一兩剉微炒 黃芩一兩 細辛三分 白鮮皮 茯神 羌活 杏仁湯浸去皮尖雙仁炒微黃 漢防己 桂心 甘草炙微赤剉 麻黃各一兩去根節 右爲散。每服四錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分。去滓。不計時候溫服。

狐肝丸 出聖惠方 治婦人中風。卒倒眼黑。頭疼。胸膈多痰。言語謇澀。心神恍惚。皮膚頑麻。

狐肝一具臘月者 老鴉一隻去嘴爪翅尾與狐肝同於瓷瓶內燒令煙盡候冷細研 天麻一兩 天南星一兩半炮裂 白附子炮裂 烏蛇肉酒拌炒黃 乾蝸微炒 桑螵蛸微炒 蟬殼微炒 晚蠶蛾微炒 白殭蠶各一兩微炒 硃砂半兩細研 牛黃一分細研 麝香一分細研 右爲末。入研了藥令勻。煉蜜和搗三五百杵。丸如梧桐子大。每服不計時候。以豆淋酒下七丸至十丸。

白薇丸 出濟生方 治手足搐搦。痰涎壅盛。不省人事。多因血虛七情所感而生。先將蘇合香丸溫酒化開多服。後服此。

白薇 紫石英火煨醋淬七次 琥珀別研 白芍藥 桂心不見火 川續斷酒浸 防風去蘆 山茱萸取肉 當歸去蘆酒浸 栝子仁炒 川烏炮去皮尖 牡丹皮去木各一兩 木香不見火半兩 麝香別研半錢 右爲末。生薑自然汁打米糊丸如梧桐子大。每服七十丸。空心食前溫酒或米飲下。

防風散出聖惠方 治婦人中風。言語謇澀。肢節疼痛。皮膚不仁。口面喎戾。

防風去蘆頭 羌活 當歸剉微炒 天南星炮裂 天麻 白殭蠶微炒各半兩 麻黃三分去根節 桂心半兩 芍藥半兩 烏蛇肉半兩酒拌炒黃 桑螵蛸半兩微炒 麝香一分研入 硃砂一分細研入 右爲散。入研了藥令勻。每服不計時候。以溫酒調一錢。

續命煮散出大全良方 治風氣留滯。心中昏憤。四肢無力。口眼開動。或時搖擗。亡失津液。渴欲引飲。能扶榮衛去虛風。中風自汗。及產後中風自汗。尤宜服之。

防風 獨活 當歸 人參 細辛 葛根 芍藥 川芎 甘草 熟地黄 半夏 遠志去心 荊芥穗各半兩 桂心七錢半 右咬咀。每服五錢。水一盞。生薑三大片。煎至七分。去滓溫服。不拘時候。汗多不止者。加牡蠣粉一分半。

栝子仁丸出大全良方

栝子仁 乾地黄各二兩 茯苓 枳實去瓤麸炒 覆盆子炒 北五味子 附子炮 石斛去根切酒蒸炒 鹿茸 酸棗仁炒 桂心 沉香 黃耆各一兩蜜水炙一方等分 右爲細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。空心酒下三十丸。

烏蛇丸出聖惠方 治婦人中風。牙關緊急。手足頑麻。心膈痰涎壅滯。

烏蛇肉一兩酒拌炒黃 半夏半兩湯洗七遍以生薑半兩去皮同搗炒令乾 天麻一兩 白附子一兩炮裂 烏犀角屑半兩 白殭蠶搗半兩微炒 天南星一兩炮裂 乾蝎半兩微炒 麻黃半兩去根節 獨活半兩 當歸半兩剉碎微炒 晚蠶沙半兩微炒 麝香一分研入 右爲末。煉蜜和丸。如梧桐子大。每服不計時候。溫酒下七丸。

羚羊角湯出聖濟總錄 治婦人中風。不語。心悶恍惚。四肢不舉。風熱壅滯。

羚羊角銹一兩 麻黃去根節煮掠去沫焙三兩 黃芩去黑心一兩 防己一兩 赤芍藥一兩半 羌活去蘆頭一兩 白鮮皮一兩 杏仁去皮尖雙仁炒一兩半 葛根剉一兩 石膏碎三兩 馬牙硝研二兩半 甘草剉炙一兩 右粗搗篩。每服五錢。水一盞半。煎取一盞。去滓溫服。日二。

澤蘭丸出濟生方 治女子血實。七情所感。卒然手足搖擗。狀類癩證。却不可作癩治之。先多以蘇合香丸酒服。却投此立效。

當歸去蘆酒浸 澤蘭葉 琥珀別研 羚羊角鎊別研 牡丹皮去木 防風去蘆各一兩 麝香別研半錢 安息香酒煮去沙 生地黄 赤芍藥各一兩半 鐵粉 橘紅各半兩 右爲末。煉蜜丸。如梧桐子大。每服七十丸。空心食前溫酒或米飲下。

排風湯出大全良方 治男子婦人風虛濕冷。邪氣入臟。狂言妄語。精神錯亂。及肝風發則面青心悶。吐逆嘔沫。昏滿頭眩。重耳不聞人聲。偏枯筋急。曲拳而卧。心風發則面赤翕然而熱。悲恐嗔怒。張口叫喚。脾風發則面黃。身體不仁。不能行步。飲食失味。夢寐倒錯。與亡人相隨。肺風發則目白逆唾膿血。上氣奄然而極。腎風發則面黑手足不隨。腰疼難以俛仰。痺冷骨疼。諸證令人心驚。志意不定。恍惚多忘。服此湯安心定志。聰耳明目。通臟腑。諸風疾入五臟等證。并宜服之。

白鮮皮 白朮 白芍藥 桂心 川芎 當歸 防風 杏仁去皮尖炒 甘草各二兩 白茯苓 麻黃去節 獨活各三兩 右咬咀。每服三錢。水一盞半。生薑四片。煎至八分。去滓溫服。無時候。

昔有一婦人年四十四五。其證說話氣短。足弱難行。口內含霜。七十日內三次經行。遇行則口冷。頭目眩暈。足冷則透心冷痛。每行則口中冷氣若不相續。有時鼻中熱面赤。翕然而熱。身體不仁。手足不隨。冷痺骨疼。有時悲傷。夢與前夫相隨。心驚志意不定。恍惚多忘。却能食。僅一年許。醫者投熱藥則面翕然而熱。氣滿胸中。咽中窒塞悶絕。投冷藥則瀉。又一醫以十全大補湯。服之則發煩躁心驚而跳。醫者以雙和湯。服之則覺得面上與腹中甚如火燂。心愈驚。欲吐之不吐。大腑秘。裏急後重。因診之。六脈弦緩。喜見於春。此是可治之疾。遂與俞山人降氣湯八服。次日診之。脈差有力。云服藥之後。覺鼻中熱。心煩悶絕。齒噤。與參蘇飲八服。黃連丸一兩許。越三日。云服藥之後。其疾如故。與茯苓補心湯。服之皆無效。因以脈證詳之。只有排風湯甚對。或曰。何以見是此證。曰。一能食飲。此風飢也。二七十日三次經行。此是榮經有風。血得風散也。三頭目眩暈。

此肝風也。四面赤翕然而熱。悲傷。此心風也。五身體不仁。不能行步。夢與前夫相隨。此脾風也。六手足不隨。腰痛難以俛仰。冷痺骨疼。此腎風也。有此諸候。令人心驚。志意不定。恍惚多忘。真排風湯證也。或曰。風脈當浮。今脈弦緩微弱。恐非風也。曰。風無一定之脈。大抵此證虛極生風。排風湯所用之藥。有十全大補湯料。亦有平補之意。却遂供十服。越三日。有效。脈亦差勝。只是心中如煙。生似有微熱。大便拘秘。再與排風湯十服。兼牛黃清心丸、皂角丸助之。越三日。云服前藥一二日。諸證悉除。只是足弱不能支持。因與秘傳降氣湯十服。云夢裏虛驚。大便滑泄如食傷。與五積散數服。加入參鹽煎。兼感應丸即愈。後皆無恙。上重頭眩。不能久立久坐。再與排風湯則脫然安矣。以此知要依古法。不可杜撰臆度處方。

羌活散 出聖惠方 治婦人中風。四肢緩弱。身體疼痛。言語響澀。心神昏亂。

羌活一兩 羚羊角屑三分 桂心半兩 赤箭三分 細辛三分 防風三分
去蘆頭 當歸三分剉微炒 赤芍藥半兩 茯神一兩 麻黃三分去根節 甘草半兩
炙微炒剉 黃芩二分 右爲散。每服四錢。以水酒各半中盞。煎至六分。
去滓。不計時候溫服。

加減小續命湯 出大全良方 治卒暴中風。不省人事。漸覺半身不遂。口眼喎斜。手足戰掉。語言響澀。肢體麻痺。精神昏亂。頭目眩重。痰涎併多。經脈拘攣。不能屈伸。骨節煩疼。不得轉側。及治諸風。服之皆驗。若治脚氣緩弱。久服得瘥。久病風人。每遇天色陰晦。節候變更。宜預服之。以防瘡。

麻黃去根節 防己 人參去蘆 黃芩 桂心 甘草 白芍藥 川芎 杏仁各一兩 附子炮半兩 防風一兩半 右咬咀。每服五錢。水一盞半。薑七片。棗兩枚。煎至七分。去滓。不以時候服取汗。隨人虛實與患輕重。有人脚弱。服此六七劑得瘥。精神恍惚。加茯苓、遠志。骨節煩疼。有熱者。去附子倍芍藥。心煩多驚者。加犀角半兩。骨間冷痛者。倍用桂、附。嘔逆腹脹者。倍人參加半夏一兩。躁悶。大便澀者。去附子倍芍藥。入竹瀝一合煎服。臟寒下痢者。去防己、黃芩。倍附子一兩。加白朮一兩。一方有白朮無杏仁。一方無芎藭、杏仁。止十味延