

萬有文庫

第二集七百種

王雲五主編

植物分類

三好學著

沙俊譯

商務印書館發行

植 物 分 類

三 好 學 著
沙 俊 譯

自 然 科 學 小 叢 書

編主五雲王
庫文有萬
種百七集二第
類分物植
究必印翻有所權版

中華民國二十四年九月初版

翁

原 著 者	三 好 學	譯 述 者	沙 俊	發 行 人	王 雲 五	印 刷 所	上 海 河 南 路 商 務 印 書 館	發 行 所	上 海 及 各 埠 商 務 印 書 館
-------------	-------------	-------------	--------	-------------	-------------	-------------	--	-------------	--

萬有文庫

第二集七百種

總編纂者

王雲五

商務印書館發行

目次

第一章	裂藻植物門	一
第二章	接合植物門	三
第三章	綠藻植物門	六
第四章	褐藻植物門	一〇
第五章	紅藻植物門	一四
第六章	真菌植物門	一八
第七章	蘚苔植物門	三一
第八章	羊齒植物門	三四
第九章	種子植物門	四五

植物分類


第一章 裂藻植物門 (Schizophyceae)

(一) 溪苔 (Phyloderna sacrum

Suringar) (球狀藍藻科

Chroococcaceae)


此種植物產於淡水中，爲呈斑點狀而繁殖之稀有藻類。其羣體係暗綠色，大小與拇指相似，呈不規則之膜狀。若以顯微鏡檢視之，則現爲不規則之無數球形細胞，散存



第一圖 水中之球狀藍藻

於膠質之中。五六月間採取瀘過，鋪於板上而乾燥之，則製品呈紫綠色之皮革狀。作爲食用時，應先浸於水中，然後煮食。

最初介紹此種藻類於學界者，爲一千八百七十年荷蘭學者史林格（Suringar）氏，史氏所用學名 Sacrum 一字，含有『神聖的』之意義，蓋史氏最初發現此種藻類於日本之水前寺，水前寺在日人則視爲聖域。



第二圖 在顯微鏡下之球狀藍藻

第二章 接合植物門 (Conjugatae)

(一) 水綿 (*Spirogyra* sp.) (星綠藻科 Zygnemaceae)


繁殖於水田或池沼之藻類，有時充滿於水中，依普通習慣雖可總括生於淡水中之絲狀綠藻，但由植物學之見地觀之，僅包含接合藻之一屬水綿 (*Spirogyra*) 一種及與相近之星綠藻 (*Zygnema*) 等。

水綿屬約七十餘種，適確之總名不易訂定，故所謂水綿者，係一屬之總稱。本草著者稱之曰水綿，然有時以水苔、石髮、水衣等語名之。僅以漢字名植物，極易誤會。高等種子植物亦不能僅以漢字命名；至於顯微鏡下之細小植物，尤屬危險。蓋昔時我國之本草學者李時珍氏，曾否仔細觀察今日之 *Spirogyra*，頗屬疑問？彼之所謂水綿，是否即今日吾人所指之 *Spirogyra*，或指其他淡水綠藻，實無從查考也。

本屬植物爲淡水中接合藻類之最普通者。其體爲單一細胞，排列如絲狀，數十圓筒互相連接，與其他藻類之分枝者不同。細胞狀態雖因種類而異，但其中僅含細胞核與葉綠體。普通植物細胞中之葉綠體均成粒狀，而散存於細胞中。惟水綿之葉綠體則形成美麗之螺旋帶一條，故置於顯微鏡下觀察之，頗呈奇觀。

本屬植物之一種，細胞體內葉綠體之二三條，呈螺旋狀互相絞成。此種現象爲其他植物界所絕無，*Spirogyra* 屬之屬名，卽由此以得（*Spiro* 與英語之 *Spiral* 同意）。且由澱粉形成之小體，分散於螺旋狀之葉綠體中，故置於顯微鏡下觀察之，呈極美麗之現象。

生殖方法普通爲無性的。細胞橫裂，分裂後卽漸次成長繁殖。達一定長度復分裂爲二。但若外界



第三圖 水綿之一種

狀況對於營養或生活上發生不良影響，例如水溫忽高，忽低，或乾燥時，則雌雄二絲互相接近，由各細胞間伸出接合管，一細胞之內容完全移於另一細胞，兩細胞之內容相合而構成一個接合孢子。故此種植物外形上雖無雌雄之分，但構成結合孢子時，於生理上可觀察其雌雄關係。

水綿類除營養體細胞中含有葉綠體之形狀、數目及大小以外，可比較其接合孢子之構成法，接合孢子膜表面凸起之數目、大小等，而分別其種類。現代日本之植物學者中，能用此種方法完全辨別其種類者，亦不過一二人，至於二千年前之本草學者，當然無從辦到。至於利用上，曾擬爲製紙時之原料。但經種種實驗失敗後，即無利用之者。作爲食用，雖無不可，惜土氣極重，殊難入口。

第二章 綠藻植物門 (Chlorophyceae)

(一) 石蓴 (*Ulva pertusa* K. Jellmann) (石蓴科 Ulvaceae)

石蓴爲世界各淺海海岸上之鮮綠色藻類。種類凡二十餘，產於日本之有名種類爲孔石蓴、紐石蓴及網石蓴等，但因向無充分之研究，故往往與乾苔 (*Enteromorpha* Linza, J. G. Ag.) 相混同。至於我國，因本草綱目中有「石蓴生南海，附石而生，似紫菜，色青」之語，故今日仍名之曰石蓴；然反對此說者亦有之。

體呈扁平之葉狀，僅有小圓錐形之根狀部分，而無莖。葉狀體則有現小孔之種類。體大約三釐米內外，大達三十釐米者亦有之。細胞分二層，均係多角形，作扁平組織。細胞間有顯著之中間膜，多數之葉綠粒，分散於各細胞內，核中有澱粉粒一個。


春夏間葉部帶黃色，細胞之內容爲多數之游走子及配偶子。游走子及配偶子有眼點，及鞭毛。

兩根。游泳片刻，即入休眠期而發芽。配偶子則必二個相合，構成接合子，更經過休眠期而發芽。游走子及配偶子之經過如何，至最近方有學者從事研究，其結果如何，需待將來方能明瞭。至於配偶子之雌雄性，則漸次明瞭。此種植物，我國愛爾蘭、阿拉斯加等處作為食用，日本亦間有作為食用者。


(二) 乾苔 (*Enteromorpha* sp.) (石蓴科)

綠藻類中乾苔屬之總稱，為最普通

之綠藻植物，與石蓴等相同，生於乾滿綫之間。湖沼等淡水中，亦間有之。體由一層之細胞組織而成，為中空之圓柱形，帶鮮綠色。葉綠體呈粒狀，散存於細胞之中。游走子及配偶子之形成，與石蓴相同。至於利用方法，或煮熟裝瓶，或炒製，或碎之混於糕餅之中。



第四圖 乾苔



第五圖 溪菜之有性生殖

- 1 大配偶子 2 小配偶子 3 大小配偶子之接合
4 接合子 5 配成嵌木狀之大小配偶子囊堆
6——9 配偶子囊之分裂形成

(三) 溪菜 (*Prasiala japonica* Yatabe) (溪菜科 *Blastosporaceae*)

生於山間急流中巖石上之綠藻，葉狀體之全長普通約十釐米左右，達二十釐米者，亦偶有之。根小，呈圓盤狀，附着於巖石之上，由一層細胞列而成。各細胞均爲圓形，排列整齊。顯明之星形葉綠體與澱粉粒一顆，存於其中。生長期間自七月至十一月，收穫期自九月至翌年之一月。製法與紫菜 (*Porphyra tenera* K. jellm) 相同，炒製而儲藏之，或摘採製成團塊而曬乾，生食者亦間有之。雖各地清流中均能生產，然產量不大，而嗜之者頗衆，故價格頗高。溪菜之有性生殖，如第五圖。

第四章 褐藻植物門 (Phaeophyceae)

(一) 松藻 (*Cladosiphon decipiens* Okamura) (松藻科 Chordariaceae)

松藻有極多細線狀之分歧，附着於他種海藻，如馬尾藻 (*Sargassum enerve* Agard H.)，藤藻 (*Chorda filum*, Stackh) 等。生於內海、海灣等無風浪之海水中。冬季發生長大鬚狀，採收期爲二三月。製成鹹貨，作爲下酒物，味極佳。

(二) 昆布 (*Laminaria* Sp.) (昆布科 Laminariaceae)

昆布種類多至三十餘種，海帶菜或海菜均其別名，產於日本者曰香帶。日本之北海道爲世界第一之產地，生於乾潮線以下五六丈深處，但以深二三丈處，爲最適之生育地。全長達二十五至三十米之眞昆布 (*L. japonica* Areschong) 則繁殖於深二十丈之深處。

昆布屬多堅韌，不適於生食，故宜於曬乾後食之。又本科之槁布、黑菜產量大處多聚而焚之，以

其灰作爲製碘之原料。由海藻中製碘爲日本特有之工業。（歐洲自由智利硝石礦中發見碘酸之鹽類後，從海藻製造者已絕跡。）由海藻製碘時，同時可製成氯化鉀，故以產海藻出名之日本，因廢物利用之碘製造業，此後當更形發達。當此碘療法對於健康生活聲譽極高之今日，其利益當極大也。

（三）裙帶菜（*Undaria pinnatifida* Surinagar）（昆布科）

形態因產地而異；根呈樹枝狀，有直立一條之莖，葉爲披針形而單一，漸長則兩旁生突起，形成羽狀葉。中肋扁平縱走於葉之中央，隆起於葉面之上，可一目了然。上部直達葉尖，下部成莖。葉扁平，兩面圓而隆起，邊緣有狹長之龍骨狀部分，此部生長而漸廣闊，且其生長速度較大於莖，故生褶皺，包圍於莖之表面，形成孢子囊之密集部分。孢子囊中生多數之游走子，六月中旬割開褶皺，而投之於海水中時，可見游走子脫出如煙，游泳於水中。取含有游走子之海水一滴，置於顯微鏡下觀察之，可窺見由腹面生鞭毛二根之游走子。

（四）馬尾藻（*Sargassum enerve* Agard H.）（馬尾藻科 *Fucaceae*）



第六圖 馬尾藻