

編者的話

国务院提出的“就地生产，就地供应和变野生为家种”的国药发展方针，为药草工作者指出了明确的工作方向。切实做好就地生产，就地供应，变野生为家种，是一项比较繁重的工作任务。虽然几年来全国各地在党的领导下，药草的栽培生产工作有了很大的跃进，涌现出一些先进工作者，也总结出了丰富的药草栽培经验，但适应目前生产大跃进的需要，还是很不足的。就一般栽培药草看来，大部还是就几种较有经济价值的来进行栽培，因此，无论在种类上或数量上說，都不能满足整个的药材供应工作。

为了正确贯彻药草就地生产、就地供应、变野生为家种这一方针，克服过去工作上的缺点，一方面要使栽培种类增多，另一方面要使栽培面积扩大。种类加多就要多方面搜集品种，发展本地原有品种和引进外来品种；栽培面积扩大，同时注意提高产量，这样才可能使药草满足医疗工作的需要。要确定药草栽培品种，药草调查工作也必须跟上来。因为数以万计的野生植物，其真具有药效价值的还不在少数。所以今后更需要我們不断努力，加强调查研究工作，使药草栽培更多更有效的为人类健康服务。

“吉林药用植物調查誌要”是就常見的各种药用植物，特别是本省各地出产的編入書內。对各种药用植物註明了所屬科名、药用部分和采集期以及所含主要成分、药用效应等。这些材料，可作药用植物調查工作者从事調查、采集的参考。

本書在編写上，由于限于我們的水平，所以無論在內容方面和形式方面，不妥之处，在所难免，希讀者多提出指導意見，以便研究改进。

吉林特产研究所 張廉賢

1958年12月

植物名称	科名	药用部分及采集期	主要成分	药用	效应
卷柏 (还魂草、 还阳草)	卷柏科	茎叶供药用。三、 四、八、九月采集。	未詳。		为止血药，用于治腸出血、痔出 血及尿血和脱肛等。
石松	石松科	芽胞叶供药用。在 七、八月时采集。	含石松子油酸。	主治皮肤潰爛。	
木贼草	木贼科	全草供药用。九、 十月为采集期。	含无水矽酸及木 贼酸。	为利尿发汗药，并用于治腸出血 及痔出血。	
铁线蕨	蕨科	全草供药用。	含苦味质精油及 鞣酸。	为祛痰药。	l
石长生	蕨科	全草供药用。	未詳。	为祛痰药，并能治妇女产前产后 諸症。	1
綿馬	水龙骨科	根茎及叶柄供药 用。晚秋时采集。	含有綿馬酮等。	有驅除條虫的作用。	

植物名稱	科名	藥用部分及採集期	主要成分	藥用效	應
狗脊 (金毛狗脊)	水龍骨科	根部供藥用。	含有淀粉等。	為緩和強壯、利尿、止痛藥，用於治腰痛、背痛和筋骨痛。	
貫眾 (鳳尾草)	水龍骨科	根莖供藥用。晚秋時採挖。	成分與綿馬同。	為驅除條蟲藥及止血藥，并能治麻疹及預防傳染病。	
石菖蒲 (石蘭)	水龍骨科	葉供藥用。在孢子成熟時採集。	未詳。	為利尿藥，主治急性淋病和尿道炎；外服治疔腫。	
蘇鐵	蘇鐵科	種子（无漏子）供藥用。	含林檎酸及酒石酸。	為收斂性通經藥。	✓
銀杏 (白果)	銀杏科	種仁及果皮供藥用。成熟後採集。	含白果酸等。	種子為鎮咳、祛痰、滋養、強壯藥；果皮可治肺病。	
草麻黃	麻黃科	全草地上部分供藥用。	含麻黃鹼。	為發汗、解熱、鎮咳、止喘藥；并治關節痛。根為止汗劑。	

植物名称	科名	药用部分及采集期	主要成分	药用效能
松	松科	花粉供药用。春季采集其雄球果。	未詳。	治气管炎和补精作用。
黑松	松科	松油脂供药用。春季采自然流出油脂。	含树脂及揮发油。	为制硬膏及軟膏剂用。
侧柏(扁柏)	柏科	叶子及种子供药用。种子成熟时采集。	含脂肪油等。	种子为滋补、强壮、失眠、健胃及收敛、止血药。
五味子	木蘭科	果实供药用。霜降后采集。	含阿拉伯膠糖。	为收敛性鎮咳药，有滋養、强壮作用，能增进精神和体力。
黃連	毛茛科	根茎供药用。栽植需經十年才收获。	含黃連硷等。	为苦味健胃药，用于治腹痛、下痢、疝气、目疾、感冒、食欲不振、消化不良。
烏头(五毒草)	毛茛科	块根供药用。在开花时采挖。	含有烏头硷等。	为鎮痛、鎮痙、解热、发汗、风湿性神經痛药。有烈毒。

植物名称	科名	药用部分及采集期	主要成分	药用效应
白附子 (黄花乌头)	毛茛科	块根供药用。八、九月为采挖期。	含乌头硷及淀粉等。	为镇痛、镇静、镇咳药，有作用于神经的功效。
白头翁 (毛姑花翁草)	毛茛科	根供药用。四至五月为采挖期。	含白头翁脑。	对热性痢疾有效，也可治月经閉止。并有镇痛镇静作用。
升麻	毛茛科	根茎供药用。八、九月采集。	含有升麻苦味素。	为解毒、解热和镇静药，并能治扁桃腺炎等症。
牡丹	毛茛科	根皮供药用。	含有安息香酸。	为镇痛、强壮药，并治妇女病药。
毛茛	毛茛科	茎叶供药用。	含毛茛油、白头翁素及维生素C。	为治齿痛及吸腮药，并能治风湿痛、瘰疾、黄疸症。叶捣碎敷可消腫。
大蓼	毛茛科	花叶供药用。	未詳。	有剧毒。用治疥癬。

植物名称	科名	药用部分及采集期	主要成分	药用	效应
黄药子	毛茛科	根供药用。十月采集。	未詳。	用治惡毒、瘡癰和蛇犬咬毒等。	
白毛茛 (血草)	毛茛科	根莖供药用。	未詳。	为血管收縮药，用于治子宫出血等。	
同同蒜	毛茛科	莖叶果实和液汁供药用。	未詳。	为发泡药。	
獐耳細辛	毛茛科	根莖及根供药用。	未詳。	为强壯、收斂性药。	
牛扁	毛茛科	莖叶根供药用。	含生物硷。	为利尿药，并用治四肢关节痛。	
花木通 (綉球藤、女娄)	毛茛科	莖供药用。	未詳。	为止下痢及消食药。	
威灵仙 (山辣椒、风車草)	毛茛科	根供药用。春四至五月初八至十月采集。	含白头翁素及白头翁醇等。	为利尿通經药，有鎮痛之效，并治偏头痛和顏面神經麻木等症。	

植物名稱	科名	藥用部分及採集期	主要成分	藥用效應
黑 草	毛茛科	種子供藥用。	未詳。	為催乳、解凝及利尿藥。
芍 藥	毛茛科	根供藥用。秋季採集。	含安息香酸等。	為鎮痛、鎮痙、通經藥，及利尿作用。
石 龍 芮	毛茛科	全草供藥用。	未詳。	為治風濕痛及關節痛藥，有明目輕身之效，還能治肺結核等症。
福 壽 草 (側金盞花)	毛茛科	根部或全草供藥用。 花開時為採集期。	含有側金盞草苷等。	為強心、利尿藥，用於治癲癇，并有治療作用。
白蓮及紅蓮	睡蓮科	藕節、葉花及雄蕊蓮子供藥用。秋季採集。	含荷蓮鹼、維生素C、蛋白質和糖。	蓮子、花蕊為滋補強壯藥，藕節、荷葉有止血作用，荷花能消腫毒。
芡 實	睡蓮科	種子供藥用。九至十月為採收期。	含蛋白質、脂肪及糖類。	為滋補強壯藥，有鎮靜收斂之功效。

植物名称	科名	药用部分及采集期	主要成分	药用效应
淫羊藿 (三枝九叶草)	小蘗科	叶莖根及花供药用。	含有淫羊藿素。	为神經强壮药，有滋阴补阳及治神經衰弱等症，对阴萎、健忘亦有效。
木通 (馬木通)	木通科	莖供药用。十月至翌年二月为采集期。	含有木通皂苷。	为消炎性利尿药，并有镇痛、排膿及通經等作用。
山豆根 (蝙蝠葛)	防己科	根莖供药用。春秋均可采挖。	含有山豆根生物硷等。	为解热镇痛药，用于治风湿及泌尿器病和腰痛。
木防己	防己科	根供药用。春秋时采挖。	含有木防己生物硷等。	为治神經痛及解热药。
汉防己 (粉防己)	防己科	根莖供药用。春秋时采集。	含有木防己素等。	为治风湿及神經痛药，并用于治急性多发性关节痛等。
千金藤	防己科	莖及根供药用。	未詳。	为治虛劳及瘰癧药。

植物名称	科名	药用部分及采集期	主要成分	药 用 效 应
三 白 草	三白草科	茎叶供药用。	含有精油等。	为治水肿、脚湿、消炎、破癰、治疗腫症。
蕺 菜 (十药魚腥草)	三白草科	全草有特異之臭气供药用。	含有精油等。	为利尿及解毒药，用治淋疾、尿道炎、子宫病及水腫等症。
四 大 金 剛 (四块瓦、 銀綫草)	金粟蘭科	根供药用。春季时采挖。	未詳。	为治惡瘡疥癬及牛馬等瘡毒并用治头瘡、白禿、皮肤虫痒等症。
接骨金粟蘭 (接骨木、 九节风)	金粟蘭科	茎叶供药用。	未詳。	莖叶捣汁，可治跌打损伤，捣爛敷之，并可接骨。
細 辛	馬兜鈴科	全草帶地下部分供药用。六、七月时采集。	含有精油及軟脂酸等。	为发汗、驅风、鎮痛药，用于治咳嗽、感冒、头痛、牙痛、风湿症，并为祛痰药。

植物名称	科名	药用部分及采集期	主要成分	药 用 效 应
杜 衡 (土 细 辛)	馬兜鈴科	根莖供药用。	含有精油 黄樟油 素等。	为鎮咳、祛痰、利尿药，能治气管炎、喘息、水肿，并能治瘰癧等症。
馬 兜 鈴 (兩 金 藤)	馬兜鈴科	果实供药用。九、十月果实成熟时采集。	含馬兜鈴硷等。	为鎮咳祛痰药，又可治虫毒，但內服不能过量，能刺激泌尿器官。
土 青 木 香	馬兜鈴科	馬兜鈴等之根供药用。春秋季采挖。	含揮发性丁香油。	为治虫毒、蛇毒的解毒药，用其煎剂浸酒服或用粉末貼伤口极效。
金·縷 梅	金縷梅科	叶供药用。	含有鞣酸。	为收斂止血药。
楓 树 (楓 树、 路 路 通)	金縷梅科	果实供药用。	未詳。	为通經利尿除痹药，适于治月經不調，周身痹痛等症。燒炭可外治疥癬。
白楊、青楊	楊 柳 科	枝条供药用。	含有鞣酸等。	为解熱、利尿药。

植物名称	科名	药用部分及采集期	主要成分	药用效应
垂柳	杨柳科	树皮供药用。	含有鞣酸等。	为解热、利尿浴汤药。
水杨	杨柳科	树皮供药用。	含有鞣酸等。	同上。
胡桃	胡桃科	核仁供药用。果实成熟时采收。	含有蛋白质、脂肪、糖类及维生素等。	为滋养强壮药，有缓和镇咳及收敛之效。油为缓下剂，并能驱除蛔虫。
白桦	桦木科	树皮供药用。将割倒桦树取幼嫩树皮。	含水杨酸及葡萄糖等。	为解热药有防腐之效，并用治黄疸伤寒、时行热毒、豌豆疮、乳癌等。
榛子	榛科	果仁供药用。秋季成熟时采集。	含有蛋白质、脂肪及糖类。	为滋养健胃药。
橡树 (柞树、橡树)	山毛榉科	橡实壳斗供药用。果实成熟时采集。	含有鞣酸等。	橡实为健胃药，壳斗为收敛药，用治血痢不止、痔瘡出血、下痢脱肛等。

植物名称	科名	药用部分及采集期	主要成分	药用效果	应
栗 (板栗)	山毛櫸科	果实供药用。	含有淀粉等。	为滋养强壮药。	
榉 (青崗树、大叶櫸)	山毛櫸科	叶及果实供药用。 果实成熟时采集。	叶含鞣酸等。	果实对腺病患者及佝偻病小儿作食品用，叶用治淋疾、尿赤、驅條虫。	
榆	榆科	树皮供药用。名榆白皮即内部幼嫩皮。	含粘液及鞣酸。	为收敛及粘滑性强壮药，为缓和粘滑性利尿药，外用可治皮肤病。	
杜仲	杜仲科	树皮供药用。	含橡皮质。	为治高血压特效药，并用作强壮剂，绝对无毒。	
桑	桑科	嫩枝根皮叶与果实供药用。果熟采集。	根成分未詳。叶含五炭糖，果含琥珀酸。	桑白皮为利尿鎮咳药，对水肿、哮喘、祛痰有效，桑椹为健胃药。	
荻 草	桑科	花球供药用。	含乙种苦味酸。	为治肺結核、急性发熱症有效药。	

植物名称	科名	药用部分及采集期	主要成分	药用效应
无花果	桑科	叶和果实供药用。	含枸橼酸林檎酸。	叶为治痔疾及杀虫药，果为滋养药。
大麻 (藏麻火麻)	桑科	种仁供药用。九至十月为采集期。	含有树脂及挥发油等。	为平抚药，有解热、解痛、解毒、利尿等作用。并用治麻疹、痘疹及各种瘡毒。
忽布 (靈布花)	桑科	花粉及果实供药用。	含甲种蛇麻苦味酸及挥发油等。	为抗生作用药，用于治肺结核病，并用作健胃药。
毒麻	蕁麻科	叶供药用。	含有大量维生素A及维生素C等。	为止血药，用于治血崩、鼻衄、呕血及子宫出血均有特效。
獼猴桃 (圓棗阳桃)	獼猴桃科	果实及茎叶供药用。果实成熟时采集。	未詳。	果实及茎叶汁均可治尿酸和結石症。
木天蓼	獼猴桃科	虫瘻的果实供药用。在成熟时采集。	含挥发性的木天蓼酸。	有温暖身体之效，用治疝气及腰腹痛，并为治猫病特效药。

植物名称	科名	药用部分及采集期	主要成分	药用	效
金 絲 桃 (地 馬 桑)	金絲桃科	全草供药用。	含有精油及鞣酸。	为收敛性止血药。	
小 連 翹 (弟切草、 音切草)	金絲桃科	全草供药用。	全草含鞣质，花含挥发油，呈血红色。	为止血药，用治吐血、咯血、衄血、子宫出血等症。又用治刀伤和跌打损伤。	
黃 蜀 葵 (秋葵、滑药)	錦葵科	花及根供药用。根在秋季时采挖。	种子含维生素C等，根含阿拉伯树胶。	为粘滑药。用于治胃腸炎、淋症、催生和消癰腫及諸惡瘡。	
棉 花 (草 棉)	錦葵科	种子供药用。	含有脂肪油及毒性棉酚。	为催乳药，适用于乳汁分泌过少或缺乏，并略有通經作用。	
錦 葵	錦葵科	花供药用。	含粘液。	为粘滑药。	
苘 麻	錦葵科	果实与根茎供药用。	种子含脂肪、蛋白质。	为腸收敛药，用治赤白痢和治癰瘡。	

植物名称	科名	药用部分及采集期	主要成分	药用效应
冬 葵	锦葵科	圆肾形的种子供药用。成熟时采集。	含脂肪油等。	为利尿药，并为缓下剂，用于治淋疾、妊娠水肿，并有催乳作用。
木 槿	锦葵科	根皮及花供药用。	含粘液等。	根皮治赤白带下、腹痛、疥癣、明目及润燥活血。花能消腫、利尿、除湿热。
檉 柳 (西河柳、 观音柳)	檉柳科	柔嫩的枝条供药用。	含有柳素。	为发汗透疹药，适用于痘疹在将出时，郁于皮肤内身痛烦躁、发热无汗。
絲 瓜 (烏 牛 子)	葫蘆科	絲瓜絡供药用。十月采集去外皮种子。	含皂素粘液、脂肪、蛋白質、維生素等。	为清凉、活血、通經、解毒药，并能通乳汁发痘瘡，又为祛痰、利尿、鎮咳药。
胡 瓜 (黃 瓜)	葫蘆科	种仁及根供药用。	种子含脂肪，根有多量淀粉。	种子用于呼吸器官为解热鎮咳祛痰药，根制天花粉治湿疹。

植物名称	科名	药用部分及采集期	主要成分	药 用 效 应
瓜 (括)	葫蘆科	果实及根供药用。 十至十一月采集。	根含淀粉，种子 含脂肪油。	根有解热、止渴、催乳作用，种 子用治肺燥、镇咳、祛痰等症。
西 瓜	葫蘆科	果皮供药用。七至 九月为采收期。	含转化糖、苹果 酸及瓜素等。	为利尿药，对治高血压、肾脏炎、 膀胱炎有效。
冬 瓜	葫蘆科	果皮及种子供药 用。十月时采集。	种子含脲酶，果 皮含腺素。	为消炎性利尿缓下药，适用于内 脏脓肿如盲肠炎等。
秋 海 棠 (断肠草)	秋海棠科	茎叶供药用。	含有砒酸等。	叶有健胃、杀虫、治疥癣作用，还 可润皮肤、防冻裂，茎可疗喉痛。
仙 人 掌	仙人掌科	全草供药用。	含有粘液等。	为利尿药，并用于治脚气和水腫。
李	蔷薇科	果实供药用。	含林檎酸、琥珀 酸。	为镇咳药，用于治咳嗽和喉痛等。
桃	蔷薇科	成熟种子供药用。 果实成熟采其种 仁。	含有苦杏仁素及 酵素等。	为镇咳药，并且能治疗高血压、 慢性盲肠炎，及妇女子宫血腫等。