



第五集

安徽药材

安徽省卫生厅編

安徽人民出版社

目 录

全 草 类

毛茛.....	(1)
叶下珠.....	(2)
石吊兰.....	(3)
石龙芮.....	(4)
白屈菜.....	(5)
谷精草.....	(7)
虎耳草.....	(8)
问荆.....	(9)
泽漆.....	(10)
薺(附花、子).....	(12)
紫花地丁.....	(13)
葎草.....	(14)

根及根茎类

飞廉.....	(16)
山慈菇.....	(17)
天葵子(附茎叶).....	(18)
木藜芦.....	(20)
四叶对.....	(21)
白英.....	(22)
白玉簪花(附叶).....	(23)
虎杖.....	(24)

沿阶草.....	(26)
苦楝皮.....	(28)
草石蚕.....	(29)
徐长卿.....	(31)
葇蓉根.....	(32)

茎及茎叶类

木通.....	(33)
白木通.....	(35)
龙须草.....	(36)
芙蓉叶.....	(37)
枇杷叶 (附树皮)	(38)
葇蓉叶.....	(40)
臭梧桐.....	(41)
蛇莓.....	(42)
酢浆草.....	(44)
蜀羊泉.....	(45)
蕲艾.....	(46)

花 类

丹桂.....	(49)
芙蓉花.....	(50)
枇杷花.....	(50)
丽春花.....	(51)
桂花.....	(52)
梧桐花.....	(53)

果 实 类

八月札	(54)
女貞子 (附叶)	(55)
枇杷 (附果核)	(56)
苦楝子	(57)
酸漿 (附全草)	(57)

种 子 类

大豆 (附叶、花)	(60)
大豆卷	(61)
芡实 (附茎、根)	(62)
芸苔子 (附茎叶)	(64)
荞麦 (附叶、稽)	(65)
枳椇子	(66)
蓂蓉子	(68)
黑豆衣	(69)
荜茇	(70)
梧桐子 (附树皮、叶)	(71)
蘿藦	(73)
綠豆 (附莢、花、叶、芽)	(74)
綠豆衣	(76)
薯 (附叶、带花全草)	(77)

动 物 类

白殭蚕 (附雄蚕蛾、蚕蛻、蚕連、蚕故紙)	(79)
望月沙	(80)
青娘子	(81)

蚕沙.....	(83)
蛴螬.....	(83)
露蜂房.....	(84)

矿物类


赤石脂.....	(86)
紫石英.....	(87)

全 草 类

毛 茛

毛茛又名“毛堇草”，我省各地均有出产。全草供药用，为强烈的皮肤刺激剂。用新鲜的全草捣烂，贴敷皮肤上，数小时后即发泡。古方及民间单方用以截瘡，或治黄疸、风湿性关节痛等，可作芥子泥代用品。毛茛有毒，不可内服。

毛茛为毛茛科、毛茛属多年生草本植物。高约一尺半左右，全体密被白色长毛。根出叶丛生、有长叶柄；叶片近五角形，深三裂，两边的裂片又二裂；裂片边缘有锯齿。茎生叶没有叶柄，深三裂，裂片狭长。夏季于叶丛中抽长花茎，开黄色五瓣花数朵。花后结卵形瘦果，集生于柱状花托上。



毛 茛

1. 植物全形 2. 花 3. 果实
(据江苏南部种子植物手册38(续))

栽培方法：毛茛野生于山坡、原野、沟边、路旁湿地。性耐涝怕旱，不择土壤，用根及种子繁殖。清明、谷雨間掘取宿根，分株移栽。或于立秋以前采收成熟的种子，留至次年清明播种。将地面鋤松，均匀撒播种子，即自行生长。

采制及貯藏：毛茛用新鮮的全草，一般不加工。

产量：我省产量很大，目前尚未普遍收購。

除四害：全草切碎，撒粪坑中，能灭蛆。全草捣烂泡水，制成2—5%水浸液，噴杀孑孓，其杀虫率达100%。

其他用途：全草捣烂泡水或煮水，制成土农药，噴洒使用，可以防治稻螟、蚜虫等軟體农业害虫。

葉 下 珠



葉 下 珠

(据日本植物圖鑑1143圖)

叶下珠又名“老鴉珠”，我省各地都有野生的。民間以全草入药，能治瘡疾。民間单方用鮮草与鴨肝炖服，治眼紅腫；全草捣烂敷治青竹蛇咬伤。

叶下珠为大戟科、叶下珠属一年生小草本植物。茎直立高三寸至一尺，綠色，老时带紅色。近根处輪生叶片四个，二大二小。茎上部叶橢圓形，密互生，在小枝上分两行排列，很象羽状复叶。小叶上面綠色，

背面灰白色。夏秋間开小形赤褐色的单性花，雌雄同株。花后結扁球形的蒴果，分两行着生在叶下，故名叶下珠。蒴果成熟时裂开，散出卵形或三角形的种子。

栽培方法：叶下珠野生于原野平地、园圃，用种子繁殖，不择土壤，以阴湿地较为适宜。霜降前后采收成熟的种子，收藏至次年谷雨前后，利用荒废土地鋤松土层，点播种子，即自行生长。

采制及貯藏：叶下珠药用新鲜的全草，一般不加工收購。

产量：我省产量估计不多，尚未作药材收購。

石 吊 兰

石吊兰，我省各地山区都有野生的。药用带根的全草，用治跌打损伤、酒病，并有通关节的效用。

石吊兰为苦苣苔科、石吊兰属多年生木質草本植物。生长在山野阴湿处苔藓植物丛中，或大树干上。茎匍匐，分枝少，褐色，高五至六寸，节上有须根。叶輪生有短柄，叶片披针形，叶边有少数的锯齿。叶面綠色，光滑无毛；叶背浅綠色，主脉上密生棕褐色的短毛。夏季于茎頂、叶腋間开美丽的淡



石 吊 兰

(据中国植物圖鑑0252圖)

紅色花。花有短梗，萼五深裂。花冠下部筒狀，上部五淺裂呈唇形。花后結細長的蒴果。

栽培方法：適宜在陰濕、疏松、腐植質多的砂質壤土栽種。用分根及種子繁殖。立夏、夏至間將生有須根的節壓埋土中，一個月后新根扎入土中，即可剪斷，連土挖起，打穴移栽。也可以在秋季采收成熟的種子，于次年春分前后選擇山間蔭蔽、濕潤、有苔蘚的石縫、大樹干，點播種子，即能自行生長。

采制及貯藏：秋季采收，連根挖取全草，抖淨泥沙，晒干即成。用蒲包裝，放干燥通风处保存。注意防止受潮生霉。

收購規格：葉多，帶根，身干，无泥沙雜質。

產量：我省石吊兰產量不多，目前尚未收購。

石 龍 芮

石龍芮又名“水芹”，我省各地均有出產。全草及種子供藥用。全草下瘀血、除煩熱，治瘰癧；搗汁外用，治蛇蝎毒及腫痛。種子能祛風、除煩熱、利關節，治風寒濕痹、滑精。

石龍芮為毛茛科、毛茛屬一年生草本植物。高一尺左右，全体光滑无毛。莖直立，綠色，中空，分枝多。根生葉叢生，有長柄，葉片深三裂，各裂片又二至三裂。莖生葉互生，葉柄短，深三裂，裂片狹長。春末夏初分枝開黃色小花。花萼、花冠各五片。花后結小瘦果，集生于長圓形的花托上，很象未熟的桑椹。

栽培方法：石龍芮野生于沟边、水田旁淺水濕地，適宜在近水的砂質壤土栽種，用種子繁殖。于小暑前后采收成熟的種

子，次年春分前后播种。鋤松土层，撒播种子，即自行生长。

采制及貯藏：春末开花时割取全草，拣除杂草、败叶，晒干。小暑前后种子半熟时，割取果穗，搓下种子，簸净杂质。全草用蒲包装，种子用木箱装，放干燥处保存，注意防止受潮、虫蛀。

收購規格：全草叶多，身干，光滑无毛，无杂质。种子色黄，饱满，身干，无泥沙杂质。

产量：我省产量估计很大，目前尚未收购。

附注：石龙芮与同科、同属植物“毛茛”类似，后者有剧毒，应注意鉴别。毛茛遍体有白色长毛，石龙芮光滑无毛。参看“毛茛”（1页）。



石 龙 芮

1. 植物全形 2. 花 3. 雄蕊群 4. 雌蕊
(据江苏南部种子植物手册441图)

白 屈 菜

白屈菜，我省各地均有出产。药用不带根的全草，为镇痛、消肿药，用作胃脘痛、胃溃疡、胃癌、胆囊病等的镇痛药，为鸦片制剂的代用品。搗汁外用治癣疥、肿毒。白屈菜的制剂治疗皮肤结核效果良好。



白 屈 菜

1. 植物上部 2. 萼片 3. 花瓣 4. 雄蕊 5. 雌蕊 6. 种子

(据中国药用植物 62 图)

白屈菜为罂粟科、白屈菜属多年生草本植物，茎叶有黄色的臭汁液。根粗壮，土黄色。茎直立，高一、二尺，表面有白粉和细毛，叶为羽状复叶，互生，有长叶柄。裂片三至八对，有钝齿。表面绿色，背面有白霜及柔毛。夏季于枝梢开有柄的黄色小花五至七朵，作繖形排列。花萼二片，花瓣四片；雄蕊约三十个，雌蕊一个。花后结细长的蒴果，成熟时由下而上裂开，散出许多暗褐色的细小种子。

栽培方法：白屈菜自生于田野、路旁、沟边，也有当作观赏植物栽种的。不择土壤，用种子繁殖。立秋前后采收成熟的种子，次年清明下种。

先整地，用腐熟的堆肥作基肥，做成平畦，耢沟撒播，复土盖平。出苗后，应适时除草中耕。开花时，追施人粪尿水肥，并适时浇水。病虫害较少。

采制及贮藏：夏季生长旺盛时采收，齐地割下，晒干即成。用蒲包装，放干燥通风处保存。注意防止受潮生霉。

收购规格：枝全不碎，身干，无杂质。

产量：我省产量估计很大，目前尚未普遍收购。

谷 精 草


谷精草又名“谷精珠”，我省各地均有出产。药用不带根的全草，为清凉明目、消炎、利尿药，内服或煎汁洗眼治疗各种炎性眼病；并治鼻炎、鼻出血、感冒头痛、牙痛、小便不利等症。

谷精草为谷精草科、谷精草属一年生草本植物。根须状，叶片丛生短茎上。叶片细长，有尖，长约二至六寸，宽一至二分。秋季于叶丛中生出许多花葶，葶顶着生球状的花头一个，上有白色的小花十余朵。花后，每葶结小果三至五个聚合成半圆形。每个果有细小的种子五至八粒。

栽培方法：谷精草自生

稻田、湿地中，繁殖很快，不用播种。收割后的稻田不需翻犁，如田中水深，应开沟排水；如过于干燥，即须灌水，使土湿润。收获后十五至二十天便长成结珠，可以收获。

采制及贮藏：秋季果实成熟时采收，将花葶拔下，除净泥



谷 精 草

1. 植物全形 2. 花葶和头状花序
3. 雄花 4. 雌花 5. 子房 6. 种子


(据江苏南部种子植物手册214图)

土，晒干，理直，捆成小把即成。用蒲包打件，放干燥通风处保存。注意防止受潮生霉。

收購規格：珠大，莖短，无根，身干，无泥沙杂质。

收購量：我省每年收購量約160,000斤。

虎 耳 草



虎 耳 草

1. 植物全形 2. 花 3. 花萼及雄蕊

(据中国药用植物志115图)

虎耳草，我省各地均有出产，以蕪湖、安庆专区产量較大。根的全草供药用，治吐血；搗汁外用治中耳流脓、皮肤紅疹；烧烟熏治痔疮。

虎耳草为虎耳草科、虎耳草属多年生常綠草本植物。高約一尺左右，細茎匍匐地上，赤紫色。叶丛生，叶柄很长。叶片圓形或扁圓形，肉質肥厚，叶边有浅鋸齒。叶面綠色，有时帶白斑，密生硬毛；叶背紫紅色，光滑无毛。花瓣五片，二片較大向下倒垂，白色；

較小，瓣尖及中部微帶淡紅色，瓣上并有黃色斑點五個。花后結卵圓形的蒴果。

栽培方法：虎耳草野生于陰濕處和石縫中，也有在花圃中或假山上栽培的。適宜在陰濕、疏松的沙質壤土生長，用根繁殖。一年四季都可挖取宿根，分株移栽。栽時不宜過深，淺栽復土，壓實即成。出苗后，細莖匍匐地面，莖端又生新芽，着地即能生根。

采制及貯藏：春夏兩季采收，連根拔出，陰干，去淨泥沙、敗葉即成。用蒲包裝，放于干燥通風處保存，注意防止受潮生霉。


收購規格：葉片肥厚，身干，無泥沙雜質。

產量：我省各地均有出產，目前尚未普遍收購。

問 荊

問荊又名“筆頭菜”，我省蕪湖專區有野生的。用帶根的全草，為收斂、止血、利尿藥，用治咯血、鼻出血、腸出血、痔出血、月經過多、創傷出血、淋病、風濕、結氣等症。

問荊為木賊科、木賊屬多年生草本植物。根莖細長，橫生土中，有黑色的球莖。地上莖分營養莖與孢子莖兩種。春季先生孢子莖，孢子成熟、孢子莖枯萎以后，由同一根莖生出營養莖。孢子莖淡褐色，不分枝，高二寸至一尺，節上有筒狀的葉鞘，齒棕褐色；莖頂着生長圓形的孢子囊穗，穗上有許多六角形的孢子葉，葉下有孢子囊六至八個；孢子有彈絲四條，遇水能夠彈開。營養莖較細，綠色，中空，高一尺至一尺半，有肋稜六至十五條，也有筒狀的葉鞘；分枝很多，輪生節間，小枝



問 荆

1. 有孢子囊穗的植物全形 2、3. 孢子叶与孢子囊 4、5. 带有弹丝的孢子 6. 营养茎

(据药用植物学212圖)

有縱稜四条，不空心。

栽培方法：問荆野生于河滩、溪边湿地，适宜在低湿的沙地栽种，忌粘性土壤，用分株繁殖。清明以后挖取根丛，分成小株移栽，随即浇水。生苗后注意除草、壅土培根。

采制及貯藏：秋冬两季采收，連根拔出，去淨泥沙，晒干。用蒲包装，放干燥通风处保存，注意防止受潮生霉。

收購規格：枝全不碎，身干，无泥沙杂质。

产量：我省产量不少，目前尚未收購。

其他用途：1. 根茎磨粉或泡水制成土农药，噴洒使用，可以防治菜青虫。

2. 嫩枝可以作菜。

泽 漆

泽漆又名“猫儿眼睛草”、“灯台草”，是田野湿地常見的一种野草，我省各地均有出产。药用带根的全草，为解热、利尿药，用治瘧疾、痢疾、四肢浮肿，大腹水肿，咳嗽上气等症。煎汁外用治療瘰、癬疥等。

泽漆为大戟科、大戟属二年生有毒草本植物。高約一尺左右，全体略帶肉質并有白色的乳汁。茎綠色，下部帶淡紫紅色，光滑无毛，通常只在茎部分枝。单叶互生，沒有叶柄。叶片倒卵形，叶边有細鋸齒。夏季于茎頂輪生叶片五个，上面出五个花枝，每枝再分二至三个小枝，枝頂开許多黃綠色的雄花，中央有雌花一朵。花无花萼及花瓣，雄花只有一个雄蕊，雌花只有雌蕊一个。花后結三裂蒴果。

栽培方法：泽漆野生于埂边、路旁、崗脚湿地，用种子繁殖。立秋以前采收成熟的种子，随即利用埂边、路旁空地，鋤松土层、撒播种子，即自行生长。

采制及貯藏：夏季开花时采收，拔取或挖取帶根的全草，晒干即成。用蒲包或篾簍装，放干燥通风处保存，注意防止受潮霉坏。

收購規格：叶多，身干，无泥沙杂质。

收購量：我省产量估計很大，目前每年收購量約 10,000 斤。

除四害：全草切碎泡水，杀灭蝇蛆和孑孓的效果很好。



泽 漆


1. 植物全形 2. 总苞及雌蕊 3. 果实 4. 种子 5. 子房横切面 6. 剖开的总苞示雄蕊 7. 雄蕊

(据中国药用植物志120圖)

其他用途：全草泡水或煮水，制成土农药，可以防治小麦吸浆虫、蚜虫、粘虫、红蜘蛛、豆虫、造桥虫、螟虫，以及小麦稈锈病、赤霉病、小麦叶锈病、甘薯黑斑病、马铃薯晚疫病等。全草晒干磨粉，拌上土粪与种子同播，能防治蛴螬、金针虫。

薺

(附花、子)



薺

1. 植物全形 2. 花 3. 花去花瓣
示雄蕊 4. 开裂的果实 5. 种子
(据江苏南部种子植物手册49图)

薺菜是常見的一种野菜，我省各地均有出产。药用不带根的全草、花及种子。薺菜全草为良好的止血药，治肺出血、子宫出血、流产出血、月经过多等，可用作麦角的代用品；又为降血压、利尿、解热、止泻药，用治头痛、视网膜出血、大腹水肿、火眼赤肿、赤白痢等症。薺菜花止久痢。薺菜子解毒、明目、治腹胀。

薺菜为十字花科、薺菜属二年生草本植物。全体有柔毛及叉状毛。根粗壮，白色。根出叶丛生，伸向四方、平铺地上，茎短，叶片狭长，作羽状深裂。茎生叶箭形，基部抱茎，叶边有浅锯齿。春夏季于茎顶